

ALIBU
ALIBU

کتابا
الروضة الزهرية
في
الاصول الجبرية

893.7195
128

بسم الله المبدى المعيد

الحمد لله الملك الوهاب الذي بيده الجبر والكسر واليه المرجع والمآب . اما بعد
فيقول العبد الفقير الى عفوه تعالى كرنيلوس فنديك الاميركاني هذا كتاب في علم
الجبر الحسابي قد علفت فيه ما امليتُه على بعض التلامذة في مدرسة عبيه احدى
قرى جبل لبنان سنة ١٨٤٨ للتاريخ المسيحي سالنا فيه مسلك بعض العلماء الاميركانيين .
ثم اضفت اليه زيادات اخرى من كتب بعض العلماء الفرنسيين والانكليزيين .
وتركت الكلام على الفقرات الى كتاب اخر اريد ان اعقبه به ان شاء الله . والله
المسأل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعاً بفضلهِ العيم . فانه اكرم مسأل
واعظم مأمول

مقدمة

في العلوم التعليمية بالاجال

١ موضوع العلوم التعليمية الكم وهو كل ما يقبل الزيادة او الانقسام او
القياس . فكل من الخط والوزن والعدد والوقت كم . وليس كذلك الالوان
والافعال العقلية ونحوها

٢ جميع اقسام التعليمات مبني على الحساب والجبر والهندسة . اما الحساب
فهو علم الاعداد . ومعرفته ضرورية لمعرفة ما سواه من هذه العلوم . واما الجبر فهو
طريق للعد بواسطة احرف وعلامات اخرى . ويقال للطبقة العليا منه حساب التمام
والنفاصل . وهو لا يدخل في كتب الجبر لسموه بل يقام علماً بنفسه . واما الهندسة فهي
قسم من التعليمات موضوعه المقدار وهو كم ذو امتداد اي كل ماله واحد من ثلاثة
اشياء وهي الطول والعرض والعمق ويقال لها الابعاد الثلاثة . ولذلك يكون كل من
الخط والسطح والجسم مقداراً دون الحركة فانها وان كانت كما لكنها لا تعد مقداراً اذ

ليس لها شيء من الابعاد المذكورة. واما حساب المثلثات وقطع المخروط فيها علان تستعمل فيها النواعد التعليمية لمعرفة المثلثات والمخروط الحاضلة فمن قطع مخروطاً.

٢ التعاليم نوعان محضة واطافية او ممتزجة. اما المحضة فهي المختصة بالكميات المجردة عن المواد. واما الاطافية فهي استعمال قواعد تعليمية لمعرفة شيء من خصائص الهيولي او لانمام شيء من المصالح اليومية كما في التجارة وعلم المساحة وعلم البصريات وعلم الهيئة ونحو ذلك

٤ ان للتعاليم المحضة مزية على سائر العلوم من حيث وضوح قواعدها وقوة براهينها. حتى ضرب بها المثل في الايضاح والتبيين ومن حيث كثرة استعمالها ولزومها في المصالح والعلوم كافة. وايضاً لسبب تاثيرها في القوى العقلية بتقويتها وتوسيعها. فان درسها يدرّب العقل على الاتجاه بكل قواه نحو امير ما وعلى انحصار في موضوع ما بدون ان يتشتت. ويمنح حذاقة عظيمة في الكشف عن فساد او سفسطة في برهان او قضية. ولذلك تكون معرفتها مفيدة جداً لكل واحد ولو كان غير منفتح الى ممارسة علمائها



الفصل الاول

في الاشارات الجبرية والكميات السلبية والاوليات

٥ الجبر علم يبحث فيه عن نسب الكميات باستعمال احرف واشاراتٍ اخرى. وله مزية على علم الحساب لان مسائله اعم ولانه تستعمل فيه الاحرف الهجائية عوض الاعداد كبيرة كانت ام صغيرة. وايضاً لانه تستعمل فيه كميات مجهولة كانت معلومة. فالاحرف التي تنوب عن كميات عديدة في الجبر ليس لها قيمة في ذاتها ولكن تُفرض لها قيمة معلومة في كل مسألة على مُقتضى شروطها. وقد تكون تلك القيمة معلومة وقد تكون مجهولة كما سترى. فان كانت معلومة يوضع عوضها حرف من حروف الهجاء الأول كالالف والباء والتاء وما يليها. وان كانت مجهولة تستعمل عوضها الحروف الاخرى كالكاف واللام والميم وما يليها

٦ يُبدل على الجمع بخطٍ عرضي يقطعه خط عمودي هكذا + وعلى الطرح بخطٍ عرضي فقط هكذا - فالكميات التي تنفذها العلامة الاولى تسمى ايجابية. والتي

تقدمها الثانية يقال لها سلبية. والتي تقدمها كلها تسمى ملتبسة. فلو وُضِعَت +
 ت - س كان المراد فضلة س ومجموع ت وب ونُفِرَات مع ب الأَس. ولو وُضِع
 ت + ب لُقِرِيَت مع ا أو الأب. والتي لا تقدمها علامة تُقدَّر لها علامة ايجابية اي
 علامة الجمع. ولو وُضِعَت - ب او س - د لكان المراد فضلة ت وب او فضلة س
 ود بدون تعيين اي هو المطروح واي هو المطروح منه. ويدل على المساواة بين
 كيتين بخطين عرضيين متوازيين هكذا = فلو وُضِعَت + ب = س - د لُقِرِيَت
 مجموع ت وب يعدل فضلة س ود. ومثال ذلك في الارقام الهندية $8 + 4 = 12 - 16$
 كمية ت اعظم من كمية ب. وبالعكس ت > ب

٧ متى تقدم كمية رقم هكذا ٣ ت او ٩ ل او ١٠ ك كان المراد تكرار الحرف
 مراراً تماثل الأحاد في ذلك الرقم. فيقرأ ثلث مرات ت وتسع مرات ل وعشر مرات
 ك ويقال لذلك الرقم مُسَمِّي. وهكذا $\frac{1}{3}$ ن. و $\frac{3}{4}$ م فيراد ثلث ن وثلثة ارباع م. وان
 لم يتقدم كمية مُسَمِّي يُقدَّر لها واحد مُسَمِّي. فان ت مثلاً يراد به ا ت. وقد يكون المُسَمِّي
 حرفاً هكذا م ك فيراد تكرار ك مراراً تماثل الأحاد في م اي ميم منج. ولو قيل ٣ ت
 ب لكان ٣ ت مُسَمِّي ب. ولو قيل ٤ ك ل كان ٤ ك ل مُسَمِّي د وقس على ذلك

٨ الكمية المركبة هي التي ارتبطت اجزاؤها بعلامة الجمع او الطرح. مثالها س
 + د و ر + س - ك و ٣ ت + ب. وما سواها بسيطة مثالها ت ورك و ٢ م س ل.
 وان كان لها جزآن سميت ثنائية مثل ت + ب و س - د ويقال للاخيرة فضلية
 ايضاً. وان كان لها ثلاثة اجزاء يقال لها ثلاثية او ذات ثلثة حدود. او اربعة فرباعية
 او ذات اربعة حدود. وهلم جرا. وان اريد معاملة عن اجزاء من كمية مركبة معاملة
 واحدة يجب رسم خط فوقها او حصرها بين قوسين هكذا - د + س او (ت -
 د) + س فيراد اضافة س الى فضلة ت ود وهكذا ت + ب - س + د او (ت
 + ب) - (س + د) يراد به طرح مجموع س ود من مجموع ت وب. ويقال
 لحرف او لعنة احرف مرتبطة على ما تقدم عبارة جبرية

٩ يدل على الضرب بخطين يتقاطعان هكذا \times او بنقطة بين المضروب
 والمضروب فيه. مثاله ت \times ب او ت . ب فيقرأ ت في ب. وهكذا س + د

× ن - م فيقرأ مجموع س ود في فضلة ن وم ويقال للضروب والمضروب فيه اضلاع. فتعمل الكمية الى اضلاعها متى انفكت الى كميات اذا ضرب بعضها في بعض تحصل الاصلية. فان م^٢ م^٢ م^٢ مثلاً فنحل الى ٢ وم وى لان ٢ × م × م = م^٢ م^٢ م^٢ و ٤٨ فنحل الى ٢ و ٢٤ او الى ١٦ و ٢ او الى ٦ و ٨ وهلم جراً

١٠. يُدَلُّ على القسمة بخط عرضي له نقطة من فوقه ونقطة من تحته هكذا ٨ +

٢ اي قسمة ٨ على ٢ او بكتابة المقسوم والمقسوم عليه على هيئة كسر دارجي هكذا $\frac{٨}{٢}$ فيقرأ الخارج من قسمة ت على ب وهكذا $\frac{٨}{٢} = \frac{٤}{١}$ فيقرأ الخارج من قسمة د على م + ت فيقرأ الخارج من قسمة فضلة س ود على مجموع ت وم. واما النسبة في الجبر فيدل عليها كما يدل في الحساب. مثالها
ت ب : س د :: م + ن : ك + ل

١١ اذا تشابهت الاحرف والقوات كانت الكميات متشابهة والا فغير متشابهة. فان ٢ ب وب و ٤ ب كميات متشابهة. وكذلك ٢ م ن و ٦ م ن وم ن و - م ن و - ٨ م ن اما ٢ ت و ٢ م و ٢ ب ك فغير متشابهة ولو كانت المسميات متساوية. وكذلك ب وب و ٢ ب كميات غير متشابهة ايضاً

١٢ مكفوه الكمية هو الخارج من قسمة واحد على تلك الكمية. فمكفوه ت مثلاً هو $\frac{١}{٢}$ ومكفوه ٤ هو $\frac{١}{٤}$ ومكفوه ت + ب هو $\frac{١}{٢+ب}$

١٣ الكمية السلبية هي التي يجب طرحها. ففي التجارة مثلاً يكون الربح ايجابياً والخسارة سلبية. وان كان صعود جسم عن سطح الارض ايجابياً يكون هبوطه سلبياً. وان كان جري مركب الى الشمال ايجابياً يكون جريه الى الجنوب سلبياً. وقد يكون السليبي اكبر من الايجابي الذي يجب الطرح منه كما اذا كان راس مال تاجر ١٠٠٠ والدين عليه ١٥٠٠ دينار

١٤ الاولى قضية واضحة لا تقبل زيادة ابضاح. والاوليات التعليمية التي يحتاج اليها بالاكثري هذه

- ١ اذا اضيفت اشياء متساوية الى اشياء متساوية تكون المجموعات متساوية
- ٢ اذا طرحت اشياء متساوية من اشياء متساوية تكون البقايا متساوية
- ٣ اذا ضربت اشياء متساوية في اشياء متساوية تكون الحواصل متساوية
- ٤ اذا قُسمت اشياء متساوية على اشياء متساوية تكون الخوارج متساوية

- ٥ اذا اضيفت كمية الى اخرى وطُرِحَتْ منها فالثانية لا تتغير
- ٦ اذا ضُرِبَتْ كمية في اخرى وانقسمت عليها لا تتغير
- ٧ اذا اضيفت اشياء متساوية الى اشياء غير متساوية يكون من الاعظم
المجموع الاعظم
- ٨ اذا طُرِحَتْ اشياء متساوية من اشياء غير متساوية يكون من الاعظم
البقية العظمى
- ٩ اذا ضربت اشياء متساوية في اشياء غير متساوية يكون من الاعظم الحاصل
الاعظم
- ١٠ اذا انقسمت اشياء غير متساوية على اشياء متساوية يكون من الاعظم
الخارج الاعظم
- ١١ الاشياء المتساوية لشيء واحد هي متساوية بعضها البعض
- ١٢ الكل اعظم من جزؤه

الفصل الثاني

في الجمع

- ١٥ الجمع هو ربط كميات بواسطة علاماتها. فلو قيل ما هو مجموع ت وب
ون ل قيل ت + ب + ن ولو قيل اضع فضلا ب وس الى د ل قيل ب - س +
د ولو قيل اضع فضلا ب وس الى فضلا ن ود ل قيل ب - س + ن - د وقس
على ذلك
- ١٦ متى كانت الكميات متشابهة تُجمَع الى واحد. مثالة ٢ ت + ٦ ب +
٤ ت + ٥ ب = ٧ ت + ١١ ب فلنا من ذلك القاعدة الاولى للجمع
- متى كانت الكميات متشابهة والعلامات متشابهة فاجمع المسميات
واكتب عن يسار المجموع الاحرف المشتركة واجعل له العلامة
المشتركة. وهذه امثلة للعمل

٧ ب + كى	٢ كى	ب س
٨ ب + ٢ كى	٧ كى	٢ ب س
٢ ب + ٢ كى	كى	٩ ب س
٦ ب + ٥ كى	٢ كى	٢ ب س
<u>٢٢ ب + ١١ كى</u>		<u>١٥ ب س</u>

س د كى + ٢ م	رى + ٢ ت ب ح
٢ س د كى + م	٢ رى + ت ب ح
٥ س د كى + ٧ م	٦ رى + ٤ ت ب ح
٧ س د كى + ٨ م	٢ رى + ت ب ح
<u>١٥ س د كى + ١٩ م</u>	

وهكذا اذا كانت العلامات سلبية. مثالة

٢ ت ب - م	- ن ك	٢ ب س -
- ت ب - ٢ م	- ٢ ن ك	- ب س
- ٧ ت ب - ٨ م	- ٢ ن ك	- ٥ ب س
<u>- ١٠ ت ب - ١٢ م</u>		<u>- ٩ ب س</u>

١٧ لوقيل ما هو مجموع ٦ ب وفضلة ت و ٤ ب ل قيل ت - ٤ ب + ٦ ب اي يسقط ٤ ب من ت ثم يضاف الى الفضلة ٦ ب وذلك كإضافة ٢ ب الى ت ولوقيل ما هو مجموع ٧ ب و- ٢ ب ل قيل ٧ ب - ٢ ب اي ٥ ب فلنا من ذلك هذه

القاعدة الثانية للجمع. وهي متى كانت الكميات متشابهة والعلامات غير متشابهة فاطرح المسمى الأصغر من الأكبر واكتب عن يسار الباقي الاحرف المشتركة واجعل له علامة المسمى الأكبر. وهذه صورة العمل

$٢ح٢$	$٥ب س$	$٤+ ب$	$٦+ ب$
$٢ح٩-$	$٧ب س-$	$٦- ب$	$٤- ب$
$٢ح٧-$	$٢ب س-$		$٢+ ب$

$٢ح - دك$	$٦+ دى - م$
$٤+ ح دك$	$٤ دى - م$
	$٢ دى + م٥$

١٨ الكميّتان المتساويتان اذا كانت احدهما ايجابية والاخرى سلبية تُنفي احدهما الاخرى. مثالة

$$٦+ ب - ٦ ب = ٠ \text{ و } ٢ \times ٦ - ١٨ = ٠$$

لفرض كميّتين اكبرها ت واصغرهما ب فيكون مجموعهما ت + ب وفضلتها ت - ب ومجموع مجموعهما وفضلتها ت + ب اي ت و لنا من ذلك هذه القضية العابة اي

ان جمع مجموع كميّتين الى فضلتهما يكون المجموع مضاعف اكبرها

١٩ ان اريد جمع عدد من الكميّات المشابهة وكان بعضها ايجابياً وبعضها سلبياً فاجمع اولاً الايجابية ثم السلبية حسب القاعدة الاولى (١٦) ثم افعل في المجموعين حسب القاعدة الثانية (١٧) فلو قيل اجمع $١٢ ب + ٦ ب + ب - ٤ ب - ٥ ب - ٧ ب$ لقل

$$\begin{aligned} ١٢ ب + ٦ ب + ب &= ٢٠ ب \\ -٤ ب - ٥ ب - ٧ ب &= -١٦ ب \\ \hline \text{وحسب القاعدة الثانية يكون المجموع} &= ٤ ب \end{aligned}$$

ولو قيل اجمع $٢ ك - كى + ٢ ك - كى + ٧ ك - كى + ٤ ك - كى - ٩ ك$ و $٧ ك - ٦ ك$ لقل

والسلبية - كى	الاجزاء الابدائية هي ٢ كى
٧- كى	٢ كى
٩- كى	٤ كى
٦- كى	٧ كى
٢٢- كى	١٦ كى

والمجموع

و١٦ كى - ٢٢ كى = ٧ كى

اجمع ٢ ث د - ٦ ث د + ٧ ث د - ٢ ث د + ٩ ث د - ٨ ث د - ٤ ث د

اجمع ٢ ث ب م - ٣ ث ب م - ٢ ث ب م + ٧ ث ب م
 اجمع د كى - ٧ د كى + ٨ د كى - د كى - ٨ د كى + ٩ د كى
 ٢٠ اذا كانت الكميات غير متشابهة لا تُجمع الا بكتابتها على التوالي مع

علاماتها. مثاله ٤ ب - ٦ ي + ٣ ك + ١٧ ح - ٥ د + ٦
 وان كانت الكميات التي اريد جمعها بعضها متشابهة وبعضها غير متشابهة نكتب
 المتشابهة بعضها تحت بعض ثم نُجمع على ما تقدم. فلو قيل اجمع ٢ ب س - ٦ د
 + ٢ ب - ٢ ي - ٢ ب س + ك - ٢ د + ٢ ب ع + ٢ د + ٢ ي + ٢ ك + ب
 لكانت صورة العمل هكذا

$$\begin{aligned}
 & ٢ ب س - ٦ د + ٢ ب - ٢ ي + ٢ ك + ب ع \\
 & - ٢ ب س - ٢ د + ب + ٢ ي + ٢ ك \\
 & \hline
 & ٢ د +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & - ٧ د + ٢ ب - ٢ ي + ٢ ك + ب ع
 \end{aligned}$$

اجمع ٣ ب م - ٢ ك + ب م + ي - ك + ٧ + ٥ ك - ٦ ي + ٩
 اجمع ٣ ب + ٨ + س د - ٢ + ٥ ث ب - ٤ م + ٢
 اجمع ك + ٢ ي - د ك - ٧ - ك - ٨ ح م
 اجمع ٢ م + ٦ - ٧ كى + ٨ + ١٠ كى - ٩ + ٥ ث م
 اجمع ٦ ح ي + ٧ د - ١ + م كى + ٢ ح ي - ٧ د + ١٧ م

كى

اجمع ٧ ت د - ح + ٨ ك ي - ت د + ٥ ت د + ح - ٧ ك ي
 اجمع ٢ ت ب - ٢ ت ي + ك + ت ب - ت ي + ب ك - ح
 اجمع ٢ ب ي - ٢ ت ك + ٢ ت + ٢ ب ك - ب ي + ت



الفصل الثالث

في الطرح

٢١ الطرح اسقاط كمية من اخرى ليعرف الفضل بينهما

فلنفرض كمية ت + ب

اطرح منها + ب فيكون الباقي ت

اضف اليها - ب فتصيرت + ب - ب

وبالاولية الخامسة ت + ب - ب يعدل ت

اي طرح كمية ايجابية من عبارة جبرية هو كاضافة سلبية تعادل المطروحة اليها

ولو فرض ت - ب

فان طرح منها - ب بقي ت

وان اضيف اليها + ب صارت ت - ب + ب

ولكن ت - ب + ب يعدل ت

اي طرح كمية سلبية هو كاضافة ايجابية تعادلها. فان كان على احد دين فرفعه

عنه فهو بمثابة اضافة مبلغ الدين الى راس المال. ونرى من الامثلة المتقدمة ان

طرح كمية ايجابية انما يتم بتغيير علامتها. فلنا من ذلك هذه القاعدة للطرح

ابدل علامات الكميات المطروحة من + الى - او عكسه ثم افعل

كما تقدم في الجمع. وهذه امثلة للعلل مع مشابهة العلامات اصلاً

من + ٢٨	ب ١٦	د ١٤	- ٢٨	- ١٦ ب	- ١٤ د
اطرح + ١٦	ب ١٢	د ٦	- ١٦	- ١٢ ب	- ٦ د
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
١٢ +	٤ ب	٨ د	- ١٢	- ٤ ب	- ٨ د

ففي هذه الامثلة قد يتوهم تبديل العلامات الاليجابية الى سلبية وبالعكس.
٢٢ وهكذا متى نشابهت العلامات وكان المطروح اكبر من المطروح منه.

مثالة

$$\begin{array}{r} \text{من} \quad +16 \text{ ب} \quad 12 \text{ ب} \quad 6 \text{ دت} \quad -16 \text{ ب} \quad -12 \text{ ب} \quad -6 \text{ دت} \\ \text{اطرح} \quad +28 \text{ ب} \quad 16 \text{ ب} \quad 14 \text{ دت} \quad -28 \text{ ب} \quad -16 \text{ ب} \quad -14 \text{ دت} \\ \hline -12 \text{ ب} \quad -6 \text{ ب} \quad -8 \text{ دت} \quad +12 \text{ ب} \quad +4 \text{ ب} \quad +8 \text{ دت} \end{array}$$

وهكذا متى اختلفت العلامات. مثالة

$$\begin{array}{r} \text{من} \quad +28 \text{ ب} \quad +16 \text{ ب} \quad +14 \text{ دت} \quad -28 \text{ ب} \quad -16 \text{ ب} \quad -14 \text{ دت} \\ \text{اطرح} \quad -16 \text{ ب} \quad -12 \text{ ب} \quad -6 \text{ دت} \quad +16 \text{ ب} \quad +12 \text{ ب} \quad +6 \text{ دت} \\ \hline +44 \text{ ب} \quad +28 \text{ ب} \quad +20 \text{ دت} \quad -44 \text{ ب} \quad -28 \text{ ب} \quad -20 \text{ دت} \end{array}$$

٢٣ امتحان الطرح في الجبر كما في الحساب يكون باضافة الباقي الى المطروح.
فان وافق المجموع المطروح منه كان العمل صحيحاً والا فهو فاسد
تنبيه. عند الامتحان يجب اعادة العلامات الى اصلها. امثلة

$$\begin{array}{r} \text{من} \quad 2 \text{ كى} - 1 \\ \text{اطرح} \quad - \text{كى} + 7 \\ \hline 3 \text{ كى} - 8 \\ \\ \text{ح} - \text{ح} \quad 2 \text{ ب} + \text{ح} \\ \text{ح} - 6 \text{ ح} \quad \text{ح} - 9 \text{ ب} \\ \hline - \text{ح} + 5 \text{ ح} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{من} \quad \text{ند} - 7 \text{ بى} \\ \text{اطرح} \quad \text{ند} - \text{بى} \\ \hline \text{ند} - 7 \text{ بى} \\ \\ 2 \text{ ت} \text{ ب} \text{ م} - \text{كى} \quad 17 - 4 \text{ ت} \text{ ك} \\ 7 \text{ ت} \text{ ب} \text{ م} + 6 \text{ كى} \quad -20 - \text{ت} \text{ ك} \\ \hline 10 \text{ ت} \text{ ب} \text{ م} - 7 \text{ كى} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{من} \quad \text{ت} \text{ ك} + 7 \text{ ب} \\ \text{اطرح} \quad - 4 \text{ ت} \text{ ك} + 10 \text{ ب} \\ \hline 5 \text{ ت} \text{ ك} - 8 \text{ ب} \\ \\ 2 \text{ ت} \text{ ح} + \text{ت} \text{ كى} \\ - 7 \text{ ت} \text{ ح} + \text{ت} \text{ كى} \\ \hline \end{array}$$

٢٤ متى فرضت عدة كميات متشابهة يجب جمعها اولاً ثم طرحها. مثلاً
 لو قيل من ت ب اطرح ٢ ت م + م + م + ٧ ت م + ٢ ت م + ٦ ت م ل قيل
 ت ب - ١٩ ت م . ولو قيل من ي اطرح - ت - ت - ت - ت - ت ل قيل ي
 + ت + ت + ت + ت = ت + ت + ٤ ت . ولو قيل من ت ك - ب س + ٢ ت
 ك + ٧ ب س اطرح ٤ ب س - ٢ ت ك + ب س + ٤ ت ك فالجواب ٢
 ك + ب س

من ت د + ٢ د س - ب ك اطرح ٢ ت د + ٧ ب ك - د س + ت د
 ٢٥ متى كانت الكميات غير متشابهة تطرح بكتابها على التوالي بعد تبديل
 علاماتها. فلو قيل من ٢ ت ب + ٨ - م ي + د ح اطرح ك - در + ٤ ح ي
 - ب م ك ل قيل ٢ ت ب + ٨ - م ي + د ح - ك - در - ٤ ح ي + ب م ك
 ٢٦ اذا وضعت علامة الطرح قدام كميات محصورة بين قوسين يجب عند
 رفع القوسين تبديل علامات جميع الكميات المنحصنة. فلو وضع ت - (ب - س
 + د) كان المراد ان + ب - و - س + و + د يجب طرحها جميعاً من ت. ويتم العمل
 برفع القوسين وتبديل العلامات فتصير ت - ب + س - د وهكذا

$$١٢ ت د + ك ي + د - (٧ ت د - ك ي + د + ح م - ر ي) = ٦ ت د + ٢ ك ي - ح م + ر ي$$

$$٧ ت ب س - ٨ + ٧ ك - (٢ ت ب س - ٨ - د ك + ر) = ٤ ت ب س + ٧ ك + د ك - ر$$

$$٢ ت د + ح - ٢ ي - (٧ ي + ٢ ح - م ك + ٤ ت د - ح ي - ت د) = (د)$$

$$٦ ت م - د ي + ٨ - (١٦ + ٢ د ي - ٨ - ت م - ي ر) = ٧ ك ي - ٢ ك + ٥ - (٤ + ح - ت ي + ك + ٢ ب) =$$

وبالعكس متى اريد انحصار كميات بين قوسين. مثلاً - م + ب - د ك +
 ح فاذا انحصرت للطرح لتصير - (م - ب + د ك - ح)



الفصل الرابع

في الضرب

٢٧ الضرب اما ان يكون في الصحيح وهو تكرار المضروب مراراً ثمائل الاحاد الموجودة في المضروب فيه واما ان يكون في الكسر وهو اتخاذ جزء مفروض من المضروب مراراً ثمائل اجزاء الواحد الموجودة في المضروب فيه. فان كان المضروب فيه واحداً كان المحاصل مساوياً للمضروب فيه. وان كان اكثر من واحد كان المحاصل اكثر من المضروب فيه. وان كان اقل من واحد كان المحاصل اقل من المضروب فيه

٢٨ لو فرض ان يُضرب ت في ب وفرضت للباء قيمة ثلاثة مثلاً لا فتضى اخذت ثلاث مرات اي ت + ت + ت = ٣ ت اوب ت فنرى ان الاحرف تُضرب بكتابتها متواليه بتوسط علامة الضرب اوب دونها. فيكون ب في س ب × س اوب س وهكذا هما تكاثرت الاحرف. ولا فرق في ترتيبها لان س د م = د م س = م د س كما ان ٣ × ٢ × ٤ = ٤ × ٢ × ٣ = ٢ × ٢ × ٤ = ٤ × ٢ × ٣ وان كان للاحرف مسميات عددية يجب ضربها ايضاً ثم يوضع حاصلها فدام حاصل الاحرف. مثاله ٢ ب × ٢ ب = ٦ ب ب

$$\begin{array}{r} ٢ \text{ ح د ح} \\ \underline{\quad} \\ ٢ \text{ م} \\ \underline{\quad} \\ ٢ \text{ ح د م ي} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ١٢ \text{ ح ي} \\ \underline{\quad} \\ ٢ \text{ ر ك} \\ \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{اضرب ٩ ت ب} \\ \text{في ٣ ك ي} \\ \underline{\quad} \\ ٢٧ \text{ ب ت ك ي} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٢ \text{ ت ي} \\ \underline{\quad} \\ ٨ \text{ م ك} \\ \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٧ \text{ ب د ح} \\ \underline{\quad} \\ \text{ك} \\ \underline{\quad} \\ ٧ \text{ ب ح د ك} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{اضرب ٢ ت د} \\ \text{في ١٢ ح م ع} \\ \underline{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ح ي} \\ \underline{\quad} \\ ٢٤ \\ \underline{\quad} \\ ٢٤ \text{ ح ي} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٢٦ \\ \underline{\quad} \\ ٢ \text{ ك} \\ \underline{\quad} \\ ٧٢ \text{ ك} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{اضرب ٢ ت ب} \\ \text{في ٤} \\ \underline{\quad} \\ ١٢ \text{ ت ب} \end{array}$$

٢٩ اذا كان المضروب كمية مركبة يجب ضرب كل جزء منه في المضروب فيه. مثالة

$\begin{array}{r} ٢ح + ٢ \\ \underline{دي} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{اضرب } د + ٢ \text{ كى} \\ \text{في } ٢ب \\ \hline ٢ب + د + ٢ب كى \end{array}$
$\begin{array}{r} ٢ح + ٢ + ٢در \\ \underline{ب٤} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{اضرب } ٢ح + ٢ + ١ \\ \text{في } م٢ \\ \hline ٢ح + ٢م + م٢ \end{array}$

٣٠ اذا كان كل واحد من المضروب والمضروب فيه كمية مركبة يجب ضرب كل جزء من الواحد في كل جزء من الاخر. مثالة

$\begin{array}{r} ٤ت + ٢ب \\ \underline{٢س + رك} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{اضرب } ٢ك + د \\ \text{في } ٢ت + حم \\ \hline ٦ت + ٢ك + د + ٢ح + ٢م + حدم \end{array}$
	$\begin{array}{r} \text{اضرب } ١ + ت \\ \text{في } ٢ك + ٤ \\ \hline ٢ك + ٢ك + ٤ت + ٤ \end{array}$

اضرب $٢ح + ٢ + ٧$ في $٦ + د + ١$
 الجواب $١٤د + ٢د + ٢ح + ٧ + ٢$
 اضرب $دي + رك + ح$ في $٦ + م + ٤ + ٧$
 اضرب $٦ + ٧ + ٢ب + ت$ في $٢ + ر + ٤ + ٢ح$

اذا كان في الحاصل كميات متشابهة يجب كتابتها بعضها تحت بعض ثم جمعها

وهذه صورة العمل

اضرب ب + ت

في ب + ت

ب ب + ب ت

+ ب ت + ت ت

ب ب + ب ت + ت ت

اضرب ب + س + ٢

في ب + س + ٢

ب ب + ب س + ٢ ب

+ ب س + ٢ ب + س س + ٢ س

+ ٢ س + ٦

ب ب + ٢ ب س + ٥ ب + س س + ٥ س + ٦

اضرب ت + ي + ١ في ٢ ب + ٢ ك + ٧

اضرب ٢ ت + د + ٤ في ٢ ت + ٢ د + ١

اضرب ب + س + د + ٢ في ٢ ب + ٤ س + د + ٧

اضرب ٢ ب + ٢ ك + ح في ت × د × ٢ ك

اضرب ٢ ت × ٤ ب ح × ٥ م × ٦ ي = ٢٦٠ ت ب ح م ي

اضرب ٤ ب × ٦ د في ٢ ك + ١

الجواب ٤٨ ب د ك + ٢٤ ب د

٢١ لا يخفى انه اذا ضرب ٤ × ت يكون ٤ ت واذا ضرب ٤ × - ت

يجب تكرار - ت اربع مرات او - ت - ت - ت - ت = - ٤ ت واذا ضرب

- ٤ × ت يكون المحاصل + ت + ت + ت + ت = + ٤ ت ولكن العلامة

السلبية للاربعه تدل على وجوب الطرح وذلك يتم بتبديل العلامة فتصير - ٤

ت واذا ضرب - ٤ × - ت يكون المحاصل - ت - ت - ت - ت = - ٤

ت ولكن يجب تبديل العلامة فتصير + ٤ ت ولنا من ذلك انه

ان ضرب + في + يكون الحاصل +
 وان ضرب - في - يكون الحاصل +
 وان ضرب + في - يكون الحاصل -
 وان ضرب - في + يكون الحاصل -

ايه متى تشابهت علامات المضروب والمضروب فيه تكون علامة الحاصل ايجابية. ومتى اختلفت تكون علامته سلبية

$$\begin{array}{r} 2 \text{ ت} - 3 \text{ م} \\ 2 \text{ ح} + 3 \text{ ك} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{اضرب ب} - 2 \text{ ت} \\ \text{في} \quad 6 \text{ ي} \\ \hline 6 \text{ ب ي} - 18 \text{ ا ت ي} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \text{ ت} - 7 \text{ د} - 3 \text{ ك} \\ 2 \text{ ب} + 3 \text{ ح} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{اضرب ح} - 2 \text{ د} - 4 \text{ ع} \\ \text{في} \quad 2 \text{ ي} \\ \hline 4 \text{ ح ي} - 6 \text{ د ي} - 8 \text{ ا ي} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \text{ د ي} + 3 \text{ ح} + 2 \text{ ك} \\ 3 \text{ م} - 2 \text{ ت} \text{ ب} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{اضرب ت} + 3 \text{ ب} \\ \text{في} \quad 3 \text{ ب} - 2 \text{ ك} \\ \hline 3 \text{ ب ت} + 3 \text{ ب ب} - 2 \text{ ت ك} - 2 \text{ ب ك} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{اضرب} 2 \text{ ح} + 2 \text{ ح} \\ \text{في} \quad 2 \text{ د} - 6 \text{ ت} \\ \hline 2 \text{ ح د} + 2 \text{ ح د} - 6 \text{ ت د} - 12 \text{ ح ت} - 18 \text{ ح} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{اضرب ت} - 4 \text{ في} 2 \text{ ب} - 6 &= 2 \text{ ت ب} - 6 \text{ ت} - 12 \text{ ب} - 6 \text{ ت} + 24 \\ \text{اضرب} 2 \text{ ت ي} - 6 \text{ في} 6 \text{ ك} - 1 &= 12 \text{ ت ي} - 6 \text{ ك ي} - 6 \text{ ت} + 6 \text{ ك} - 2 \text{ ي} \\ &\text{ت ي} + 6 \end{aligned}$$

$$\text{اضرب} 2 \text{ د} - 4 \text{ ح ي} - 2 \text{ ك في} 4 \text{ ب} - 7$$

اضرب ٢ ث د - ت ح - ٧ في ٤ - د ي - ح ر
 اضرب ٢ ح ي + م ٢ - ا في ٤ د - ٢ ك + ٢

٢٢ قد راينا ان حاصل كمتين سلبيتين ايجابي. فان ضرب هذا الحاصل في كمية سلبية يكون الحاصل سلبياً. وان ضرب الحاصل الاخير في كمية سلبية يكون الحاصل ايجابياً. وعلى الاطلاق ان كان عدد الكميات السليات وتراً يكون الحاصل سلبياً. وان كان شفعاً يكون الحاصل ايجابياً. اما الكميات الايجابية فحوصلها ايجابية ابداً

٢٣ قد يحدث في الضرت ان الكميات الايجابية والسلبية يبغي بعضها بعضاً حتى تخرج من الحاصل بالكلية مثالة

اضرب ت - ب
 في ت + ب
 م م + ي ي
 م م - ي ي

ت ت - ت ت
 + ت ب - ب ب
 ت ت - ب ب

اضرب ت ت + ت ب + ب ب
 في ت - ب

ت ت ت + ت ت ب + ت ب ب
 - ت ت ب - ت ب ب - ب ب ب
 ت ت ت - ب ب ب

٢٤ بكفي احياناً الدلالة على الضرب بعلامته من دون اتمامه حقيقة. فلو قبل اضرب ت + ب + س في ج + م + ي لقبيل (ت + ب + س) × (ج + م + ي)

٢٥ لنا ما تقدم ذكره هذه القاعدة العمومية للضرب

اضرب جميع احرف المضروب ومسمياتها في جميع احرف المضروب
فيه ومسمياتها واجعل لكل جزء من المحاصل العلامة المطلوبة على
القاعدة السابقة ان العلامات المتشابهة يحصل منها ايجاب والمختلفة
يحصل منها سلب. مثالة

$$\begin{aligned} & \text{اضرب ت} + ٢ - \text{ب} - ٢ \text{ في } ٤ - \text{ت} - ٦ - \text{ب} - ٤ \\ & \text{اضرب } ٤ - \text{ت} - \text{ب} \times \text{ك} \times ٢ \text{ في } ٢ - \text{م} - ٣ - \text{ي} - ١ - \text{ح} \\ & \text{اضرب } (٧ - \text{ت} - \text{ح} - \text{ي}) \times ٤ \text{ في } ٤ - \text{ك} \times ٢ \times ٥ \times \text{د} \\ & \text{اضرب } (٦ - \text{ت} - \text{ب} - \text{ح} - \text{د} + ١) \times ٢ \text{ في } (٨ + ٤ - \text{ك} - ١) \times \text{د} \\ & \text{اضرب } ٢ - \text{ت} - \text{ي} + ١ - ٤ + \text{ح} \text{ في } (٤ + \text{ك}) \times (٣ + \text{ي}) \\ & \text{اضرب } ٦ - \text{ت} - \text{ك} - (٤ - \text{ح} - \text{د}) \text{ في } (١ + \text{ب}) \times (١ + \text{ح}) \\ & \text{اضرب } ٧ - \text{ت} - \text{ي} - ١ - \text{ح} \times (٤ - \text{ك}) \text{ في } - (٢ + ٤ - \text{م}) \end{aligned}$$



الفصل الخامس

في القسمة

٢٦ القسمة طريقة لاستخراج عدد من اخر اذا ضرب في المقسوم عليه يحصل المقسوم. وقد يكون المقسوم والمقسوم عليه عددين وقد يكونان حروفا. فلو قسمت ب د على ت لكان الخارج ب د لان ب د \times ت = ت ب د

فترى من ذلك انه متى وجد المقسوم عليه بين اجزاء المقسوم تتم القسمة باخراج ذلك الجزء من الكمية. امثلة

اقسم س ك	د ح	د ر ك	ح م ي	د ح ك ي
على س	د	در	ح	دى
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
الخارج ك		ك	ح	ح ك

$\begin{array}{r} \text{ت ت ب} \\ \hline \text{ت} \\ \hline \text{ت ب} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ت ب ك ي} \\ \hline \text{ت ك} \\ \hline \text{ب ي} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{اقسم ت ب س د} \\ \hline \text{ب} \\ \hline \text{الخارج} \end{array}$
$\begin{array}{r} \text{ت ت م م ي} \\ \hline \text{ت م ي} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ت ت د د د ك} \\ \hline \text{ت د} \\ \hline \text{ت د د ك} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{اقسم ب ب ك} \\ \hline \text{ب} \\ \hline \text{الخارج ب ك} \end{array}$
$\begin{array}{r} \text{ي ي ي} \\ \hline \text{ي ي} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{اقسم ت ت ك ك ح} \\ \hline \text{ت ت ك ك} \\ \hline \text{ت ك ح} \end{array}$	

وعلى الاطلاق مها كانت اجزاء المقسوم يكون اخراج احدها كالقسمة عليه. مثالة

$\begin{array}{r} \text{اقسم ت (ب + د)} \\ \hline \text{ت} \\ \hline \text{الخارج ب + د} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{ت (ب + د)} \\ \hline \text{ب + د} \\ \hline \text{ت} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{(ن + م) ي} \\ \hline \text{ن + م} \\ \hline \text{ي} \end{array}$
---	---	---

$\begin{array}{r} \text{اقسم (ب + ك) (س + د)} \\ \hline \text{ب + ك} \\ \hline \text{س + د} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{(ب + ي) (د - ح) ك} \\ \hline \text{د - ح} \\ \hline \text{(ب + ي) ك} \end{array}$
--	---

٢٧ اذا كان للكليات مسميات عددية يجب ان تُقسَم ايضاً ثم يجعل الخارج قدام الخارج من قسمة الاخرى. مثالة

$\begin{array}{r} \text{اقسم ٦ ت ب} \\ \hline \text{ب ٢} \\ \hline \text{الخارج ٢ ت} \end{array}$	$\begin{array}{r} ١٦ د ك ي \\ \hline ٤ د ك \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} ٢٥ د ح ر \\ \hline د ح \\ \hline ٢٥ ر \end{array}$	$\begin{array}{r} ١٢ ك ي \\ \hline ٦ \\ \hline \end{array}$
---	---	--	---

٢٠ ح ٢

٢

اقسم ٢٤ درك

على ٢٤

درك
الخارج

٢٨ اذا ضربت كمية بسيطة في كمية مركبة تدخل البسيطة في كل جزء من الحاصل (٢٩) فيمكن فكها الى ضلعيه المضروب والمضروب فيه. مثاله

ت ب + ت د تنفك الى ت × (ب + د)

ت ب + ت س + ت ح تنفك الى ت × (ب + س + ح)

ت م ح + ت م ك + ت م ي تنفك الى ت م × (ح + ك + ي)

٤ ت د + د ٨ ت ح + ١٢ ت م + ٤ ت ي تنفك الى ٤ ت × (د + ح + ٣ م + ٢ ي)

(٣ م + ٢ ي)

فان انقسمت الكمية على احد هذين الضلعين يكون الخارج الضلع الآخر. مثاله

(ت ب + ت د) + ت = ت د + ت ب + ت د = ت د + (ت ب + د) + ت = ت

ت ت ح + ت ي

ت

ت ح + ي

اقسم ب د ح + ب د ي

على ب د

الخارج

٦ ت ب + ١٢ ت س

٢ ت

٢ ب + ٤ س

اقسم درك + د ح + ك + د ك ي

على د ك

٢٥ د م + ١٤ ا د ك

٧ د

٨ ح ك + ٤

٤

٢ ح ك + ٢

اقسم ١٠ ا دري + ١٦ ا

على ٢ ا

٥ ر ي + ٨

الخارج

ت م ح + ت م ك + ت م ي

ح + ك + ي

اقسم ت ب + ت س + ت ح

على ب + س + ح

الخارج ت

$$\begin{array}{r} \text{اقسم ٤ ت ب + ٨ ت ي} \\ \text{على ب + ٢ ي} \\ \hline \text{المخرج ٤ ت} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ت ح م + ت ح ي} \\ \text{م + ي} \\ \hline \end{array}$$

٢٦ اذا كان كل من المقسوم والمقسوم عليه ايجابياً او سلبياً يكون المخرج ايجابياً. وان كان احدهما ايجابياً والاخر سلبياً يكون المخرج سلبياً. وذلك واضح مما تقدم ان حاصل المخرج في المقسوم عليه هو المقسوم نفسه (٢٦) فيكون

$$\begin{array}{l} \text{ت ب + ب = ت لان ت} \times \text{ب = ت ب} \\ \text{و- ت ب + ب = - ت لان - ت} \times \text{ب = - ت ب} \end{array}$$

وقس على ذلك

$$\begin{array}{r} \text{اقسم ت ب ك} \\ \text{على - ت} \\ \hline \text{المخرج - ب ك} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{٨ ت - ١٠ ت ي} \\ \text{- ٢ ت} \\ \hline \text{٤ - ٥ + ي} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{٢ ت ك - ٦ ت ي} \\ \text{٢ ت} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{اقسم ٦ ت م} \times \text{د ح} \\ \text{على - ٢ ت} \\ \hline \end{array}$$

$$٢ - ٢ \times \text{د ح} = ٢ \text{ د ح م}$$

٤٠ اذا لم توجد احرف المقسوم عليه في المقسوم يَدُلُّ على القسمة بكتابتها على هيئة كسر دارجي. مثاله ك ي ÷ ت = $\frac{\text{ك ي}}{\text{ت}}$ ود - ك ÷ ح = $\frac{\text{د - ك}}{\text{ح}}$ وان كان المقسوم كمية مركبة يوضع المقسوم عليه تحته جميعاً مرة واحدة او يكرر تحت كل جزء منه. مثاله ب + س ÷ ك = $\frac{\text{ب + س}}{\text{ك}}$ او $\frac{\text{ب}}{\text{ك}} + \frac{\text{س}}{\text{ك}}$ وت + ب ÷ ٢ = $\frac{\text{ت + ب}}{٢}$ او $\frac{\text{ت}}{٢} + \frac{\text{ب}}{٢}$ لان نصف مجموع كيتين او اكثر يعدل مجموع انصافها. وكذلك ت - ب ÷ ٢ = $\frac{\text{ت - ب}}{٢}$ او $\frac{\text{ت}}{٢} - \frac{\text{ب}}{٢}$ لان نصف فضلة كيتين يعدل فضلة نصفهما. وهكذا $\frac{\text{ت - ٢ ب + ح}}{\text{م}} = \frac{\text{ت}}{\text{م}} - \frac{\text{٢ ب}}{\text{م}} + \frac{\text{ح}}{\text{م}}$ وفس على ذلك

٤١ اذا وجد حروف مشتركة في المقسوم والمقسوم عليه تطرح منها. مثالة

$$\frac{ت ب}{ب س} = \frac{ت د ح ك}{س و د ي} = \frac{ح ك}{ي} \text{ و } \frac{ت ح ٢ - ٢ ح ٢ - ٢ ح ٢}{ب} = \frac{٢ ح ٢ - ٢ ح ٢ - ٢ ح ٢}{ب} \text{ وان}$$

وجد المقسوم عليه في بعض اجزاء المقسوم دون البعض نُقسَمُ الأوَّل كما تقدم وتُكتب الأخر على هيئة كسرية كما علت. مثالة (ت ب + د) + ت = $\frac{ت ب + د}{ت} = \frac{ت ب}{ت} + \frac{د}{ت}$

$$\frac{د}{ت} + ب = \frac{د}{ت} +$$

$$\frac{٢ ت ح + ت د + د ك}{ت}$$

اقسم د ك ي + رك - ح د على ك

الخارج د ي + ر - $\frac{د ح}{ك}$

$$\frac{٢ م ي + د ح}{٢ م}$$

اقسم ب م + ٢ ي على ب - ب

الخارج - م + $\frac{٢ ي}{ب}$

٤٢ الخارج من قسمة كيفية على ذاتها هو واحد ابداً. مثالة

$$\frac{ت}{ت} = ١ \text{ و } \frac{٢ ت ك}{٢ ت ك} = ١ \text{ و } \frac{٦}{٢ + ٤} = ١$$

اقسم ٢ ك ي - ٤ ت + ٨ ت د على ٤ ت

اقسم ٢ ك + ك على ك

الخارج ت - ١ + ٢ د

الخارج ت + ١

اقسم ١٢ ت ب ي + ٦ ت ب ك - ١٨ ب ب م + ٢٤ ب على ٦ ب

اقسم ١٦ ت - ١٢ + ٨ ي + ٤ - ٢٠ ت د ك + م على ٤

اقسم (ت - ٢ ح) × (٢ ح - ت) على ك × (٢ ح - ت) × (٢ م + ي)

اقسم ت ح د - ٤ ت د + ٢ ت ي - ت على ح د - ٤ د + ٢ ي - ١

اقسم ت ك - ر ي + ت د - ٤ م ي - ٦ ت على - ت

اقسم ت م ي + ٢ م ي - م ك ي + ت م - د على - د م ي

اقسم ت رد - ٦ ت + ٢ ر - ح د + ٦ على ٢ ت رد
 اقم ٦ ت ك - ٨ + ٢ ك ي + ٤ - ٦ ح ي على ٤ ت ك ي
 واما اذا كان المنسوم عليه كمية مركبة فسياتي ذكره عند الكلام على العاد الاكبر



الفصل السادس

في الكسور

٤٣ اذ كان كثير من خصائص الكسور يُعرَف من علم الحساب اقتصرنا هنا على ما يتعلق منها بالاعمال الجبرية. فنقول

٤٤ قيمة الكسر هي الخارج من قسمة الصورة على المخرج. فقيمة $\frac{٦}{٢}$ هي ٣ وقيمة

$\frac{٢}{ب}$ هي ت فقد وضع اذاً انه مما تغير الكسر فان بقي هذا الخارج على حاله لم تتغير قيمة الكسر. مثاله $\frac{٤}{٢} = \frac{١٠}{٥} = \frac{٤ ت ب}{٢ ت ب} = \frac{٨ درك}{٤ درك} = \frac{٢+٦}{١+٣}$ وهلمَّ جراً لان الخارج من كل هذه الكسور انما هو اثنان

٤٥ اذا بقي مخرج كسر على حاله كان ضرب الصورة في كمية ما كضرب القيمة في تلك الكمية وقسمة الصورة كقسمة القيمة. مثاله $\frac{٢}{ب} \frac{٣}{ت} = \frac{٦}{ت ب}$ و $\frac{١}{٣} ب$ الى اخره

وإذا بقيت صورة كسر على حالها ف ضرب المخرج في كمية ما هو كقسمة القيمة على تلك الكمية وقسمة المخرج كضرب القيمة. مثاله $\frac{٢٤}{ب} \frac{٢٤}{١٢} = \frac{٢٤}{٦}$ فالخارج هي ٤ ت ٢ ت ٨ ت ٢٤ ت

فترى اذا ان قسمة الصورة كضرب المخرج وضرب الصورة كقسمة المخرج

٤٦ نرى ايضاً ما تقدم انه اذا ضربت الصورة والمخرج كلاهما في كمية واحدة او انفسا على كمية واحدة لا تتغير قيمة الكسر. مثاله $\frac{٢}{ب} = \frac{٢ ب ك}{ب} = \frac{١}{٢} ب ك$

$$\frac{١}{٢} ب ك = \frac{١}{ب} ب ك = ك$$

٤٧ ان قيمة $\frac{ت}{ب}$ هي ت وقيمة $\frac{ب}{ب}$ هي - ت وى $+\frac{ت}{ب}$ = ت وى $-\frac{ت}{ب}$ = ت وى - ت وى ان قيمة الكسر تتغير من + الى - وبالعكس بتبديل العلامة المتقدمة على الكسر كله

حسبنا تقدم (٢٩) $\frac{ت}{ب} = + ت$ و $\frac{ت}{ب} = - ت$ و $\frac{ت}{ب} = - ت$ و $\frac{ت}{ب} = + ت$ ولكن $ت - س$ ولكن $ت - س$ و لكن $ت - س$ و لكن $ت - س$

فنى ان قيمة الكسر تتغير من + الى - وعكسه بتبديل جميع علامات الصورة. اذا تغيرت علامات المخرج فلنا ايضاً كما تقدم $\frac{ت}{ب} = + ت$ و $\frac{ت}{ب} = - ت$

فلنا مما تقدم هذه القضية العامة ان قيمة الكسر تتغير من + الى - او عكسه بتبديل العلامة المتقدمة على الكسر. او بتبديل جميع علامات الصورة. او جميع علامات المخرج

ثم ان $\frac{ت}{ب} = + ت$ وى $-\frac{ت}{ب} = - ت$ وى $+\frac{ت}{ب} = + ت$ وى $-\frac{ت}{ب} = - ت$ وى اذا تغيرت العلامات من + الى - او عكس ذلك في موضعين من المواضع المذكورة سابقاً لا تتغير قيمة الكسر. وان تغيرت العلامات في المواضع الثلاثة تتغير القيمة. وذلك حسبنا تقدم في (٢٢) و (٢٩) مثاله $\frac{٦}{٣} = \frac{٦}{٣} = \frac{٦}{٣} = \frac{٦}{٣}$

ولنا من ذلك طرق مختلفة لكتابة الخارج. مثالها (ت - س) + ب = $\frac{ت}{ب} + \frac{س}{ب}$ او $\frac{ت}{ب} - \frac{س}{ب}$ والاخيرة هي الاكثر استعمالاً

نبذة في الاختزال والتجسس

٤٨ الكسر بجنزل اي يُحطُّ بقسمة الصورة والمخرج كليهما على كميّة نعدّها. مثاله

$$\frac{ت}{ب} = \frac{٢٦}{٨١} = \frac{٢٢}{٤١} = \frac{٢٧}{٢٧} \text{ وهكذا } \frac{١}{٢} = \frac{٢٧}{٢٧} \times (ت + ب) = \frac{١}{٢} \text{ و } \frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{٣}{٦} = \frac{٤}{٨} = \frac{٥}{١٠} = \frac{٦}{١٢} = \frac{٧}{١٤} = \frac{٨}{١٦} = \frac{٩}{١٨} = \frac{١٠}{٢٠} = \frac{١١}{٢٢} = \frac{١٢}{٢٤} = \frac{١٣}{٢٦} = \frac{١٤}{٢٨} = \frac{١٥}{٣٠} = \frac{١٦}{٣٢} = \frac{١٧}{٣٤} = \frac{١٨}{٣٦} = \frac{١٩}{٣٨} = \frac{٢٠}{٤٠}$$

اذا وجد حرفاً ما في كل جزء من الصورة والمخرج يمكن اخراجه من الجميع
(٢٨) مثالة

$$\frac{٢ت + ٢ت ي = ٢٢ + ٢ ي}{د + ح} = \frac{د ي + د ي}{د ي + د ي} = \frac{١ + ر}{١ + ح}$$

٤٩ الكسور نحول الى مخرج مشترك بضرب كل صورة في جميع المخارج الا مخرجها لايجاد صورة جديدة والمخرج جميعاً بعضها في بعض لايجاد المخرج المشترك. وهذا العمل يقال له التجنيس. ولا تتغير بذلك قيمة الكسر لان الصورة والمخرج يضربان في كمية واحدة (٤٦)

$$\begin{aligned} & \text{فلوفيل جنس } \frac{٢}{د} \frac{ت}{س} \text{ لتقيل } \frac{ت د ي}{د ي} \text{ و } \frac{ب س ي}{د ي} \text{ و } \frac{ب د ي}{د ي} \\ & \text{جنس } \frac{د ر}{٢٣} \frac{ح ٦}{س} \\ & \text{جنس } \frac{٢ ت}{٣ س} \frac{١ + ر}{د + ح} \\ & \text{جنس } \frac{١}{ت} \frac{١}{ب} \text{ ت - ب} \end{aligned}$$

ثم بعد التجنيس تختزل الكسور ان كان ذلك ممكناً

٥٠ الكمية المختلطة من صحيح وكسر نحول الى كسر غير حقيقي بان نجعل للصحيح مخرجاً هو واحد. ثم تفعل كما تقدم. مثالة ت وس فيقال $\frac{ت ب ت}{س} \frac{ت ب ت}{س} \frac{ت ب ت}{س}$ وكذلك ت وب و $\frac{د}{س}$ فتصير $\frac{ت ي ب ي}{٢ ي} \frac{٢ ي ب ي}{٢ ي} \frac{٢ ي ب ي}{٢ ي}$ والكسر الغير الحقيقي بالعكس نحول الى كمية مختلطة بقسمة الصورة على المخرج

$$\text{مثالة } \frac{د + ٢ ب + ب}{ب} = ت + م + \frac{د}{ب}$$

حوّل $\frac{ت - ٢ ت + ت د ي - ح ر الى كمية مختلطة$

نبذة في جمع الكسور

٥١ تجمّع الكسور بكتابتها على التوالي مع علاماتها حسبما تقدم في جمع الصحيح او بنحوها الى مخرج مشترك. ثم تجعل جميع العلامات المتقدمة عليها ايجابية. ثم تجمع الصور ويوضع المجتمع فوق المخرج المشترك

تنبيه عند تبديل العلامات يجب الاحتراس من تغيير قيمة الكسر (٤٧)

$$\frac{ت د + د ب س}{ب د} \text{ فلو قيل اجمع } \frac{ت س}{ب د} \text{ ل قيل}$$

$$\frac{٢ ح ٢ - ٢ د ر - ٢ د د}{ح د ٢} \text{ الجواب } \frac{٢ + ر ٢}{ح ٢} \text{ اجمع } \frac{٢}{د} \text{ و}$$

$$\frac{ت ي - ب د + د ٢}{د ي} \text{ الجواب } \frac{٢ - ب ٢}{ي} \text{ اجمع } \frac{ت}{د} \text{ و}$$

$$\frac{ت ٢ + د ي او ت ٢ - ٢ د ي}{٢ ي} \text{ الجواب } \frac{ت ٢ - ٢ د ي}{٢ ي} \text{ اجمع } \frac{ت}{ي} \text{ و}$$

$$\frac{ت ت + ب ب}{ت ت - ب ب} \text{ الجواب } \frac{ب}{ب} \text{ اجمع } \frac{ت}{ب} \text{ و}$$

$$\frac{ت - ح}{د - ٢ ر} \text{ اجمع } \frac{ت}{د} \text{ و}$$

$$\frac{١٦ - ٤}{٢ - ٧} \text{ الجواب } ٦ \text{ اجمع } \frac{٤}{٢} \text{ و}$$

$$\frac{ت ٢ + ٢ ب}{٢} \text{ الجواب } \frac{٢}{٢} \text{ اجمع } \frac{ت}{٢} \text{ و}$$

$$\frac{٢ د ٢ + ح د ي - ٢ د ٢}{٢ ي} \text{ الجواب } \frac{٢ د ٢ + ح د ي}{٢ ي} \text{ اجمع } \frac{٢ د ٢ + ح د ي}{٢ ي} \text{ و}$$

$$\frac{١ + ب}{ب} \text{ حوّل } \frac{١}{ب} \text{ الى كسر غير حقيقي الجواب } \frac{١ + ب}{ب}$$

$$\frac{٢ ح - ٢ د + د ح - د د - د د}{ح - د} \text{ الجواب } \frac{٢}{ح - د} \text{ حوّل } \frac{٢}{ح - د} \text{ و}$$

$$\frac{٢}{ب} \text{ حوّل } \frac{٢}{ب} \text{ الى } \frac{٢}{ب} \text{ الجواب } \frac{٢}{ب}$$

$$\frac{٤ - د ٢}{٢ ت} + ٢ \text{ حوّل } \frac{٤ - د ٢}{٢ ت} \text{ الى } \frac{٤ - د ٢}{٢ ت} \text{ حوّل } \frac{٤ - د ٢}{٢ ت} \text{ و}$$

نبذة في طرح الكسور

٥٢ تغير لطح الكسور علامة المطروح من + الى - او عكسه

ثم يفعل كما تقدم في الجمع

تنبيه تارة يجب تغيير علامة الصورة وتارة علامة المتقدمة على الكسر كلو حتى

تكون هذه الاخيرة ايجابية

فلو قيل من $\frac{ب}{ب}$ اطرح $\frac{ح}{م}$ ثقيل $\frac{ب}{ب} - \frac{ح}{م}$ ثم بالتحويل الى مخرج مشترك $\frac{ب}{ب} \frac{م}{م} - \frac{ح}{م} \frac{ب}{ب}$ وبالجمع $\frac{بم - حب}{بم}$

من $\frac{ب}{ب}$ اطرح $\frac{ح}{د}$ الجواب $\frac{ب + د - ح د}{در}$

من $\frac{ب}{م}$ اطرح $\frac{د - ب}{د}$ الجواب $\frac{ب - د + م}{م}$

من $\frac{ب}{م}$ اطرح $\frac{د + م}{د}$ الجواب $\frac{ب - د - م}{د}$

من $\frac{ب}{م}$ اطرح $\frac{د - ب}{د}$ الجواب $\frac{ب - د + م}{د}$

من $\frac{ب}{د}$ اطرح $\frac{د - ب}{م}$ الجواب $\frac{ب - د + م}{م}$

٥٢ نُطرح الكسور ايضاً مثل الصحيح بكتابتها متوالية بعد تبديل العلامة.

فلو قيل اطرح $-\frac{ب}{ب} - \frac{ح}{م}$ من $\frac{ب}{ب}$ ثقيل $\frac{ب}{ب} + \frac{ح}{م}$

اما طرح الكسر من صحيح او عكسه فهو بان نجعل للصحيح مخرجاً هو واحد ثم نفعل كما تقدم

من $\frac{ب}{ب}$ اطرح $\frac{ح}{ب}$ الجواب $\frac{ب - ح}{ب}$

من $\frac{ب}{ب}$ اطرح $\frac{ح}{د}$ الجواب $\frac{ب + د - ح د}{د}$

من $\frac{ب}{ب}$ اطرح $\frac{د - ب}{د}$ الجواب $\frac{ب - د + م}{د}$

من $\frac{ب}{ب}$ اطرح $\frac{د - ب}{د}$ الجواب $\frac{ب - د + م}{د}$

نبذة في ضرب الكسور

٥٤ ضرب الكسور في الجبر كما في الحساب اي تضرب الصور بعضها في بعض لايجاد صورة جديدة. والمخرج بعضها في بعض لايجاد مخرج جديد. مثاله

$$\frac{ب}{س} \times \frac{د}{م} = \frac{ب د}{س م} \quad \frac{ح}{م} \times \frac{د}{ب} = \frac{ح د}{ب م}$$

اضرب $\frac{ت \times (٢ + ح)}{٢}$ في $\frac{٤}{(ت - ن)}$ الجواب $\frac{ت \times (٢ + ح)}{(ت - ن) \times ٢}$

اضرب $\frac{ت + ح}{د + ٢}$ في $\frac{٢ - ٤}{س + ي}$

اضرب $\frac{١}{٢ + ر}$ في $\frac{٢}{٨}$ اضرب $\frac{٢}{م}$ في $\frac{٢ - ح}{ي}$ في $\frac{د}{س}$ في $\frac{١}{س - ا}$

اضرب $\frac{٢ + ن}{س}$ في $\frac{١}{ح}$ في $\frac{د}{٢ + ر}$

اضرب $\frac{ت}{ح}$ في $\frac{٦ - ت}{د + ا}$ في $\frac{٢}{٧}$

٥٥ . يُخَصَّر الضرب بطرح الكميات المتساوية من الصور والمخارج فيستغنى

بذلك عن الاختزال بعد اتمام الضرب . مثالة لو قيل اضرب $\frac{ت}{ر}$ في $\frac{ح}{س}$ في $\frac{د}{ي}$

فلنا ت في احدى الصور واحد المخارج . ولذلك نسقطها منها فيبقى $\frac{د ح}{ري}$

اضرب $\frac{ت}{م}$ في $\frac{٢}{٣}$ في $\frac{٢}{د}$ في $\frac{٢}{٣}$ الجواب $\frac{ت}{٦}$

اضرب $\frac{ت + د}{س}$ في $\frac{٢}{ح}$ في $\frac{٢}{س}$ الجواب $\frac{ت + د}{٢ ح س}$

اضرب $\frac{ت + ٢}{ح}$ في $\frac{٢}{م}$ في $\frac{٢}{٥}$ في $\frac{٢}{٥}$

وهكذا في الكسر والصحيح بضرب الصحيح في صورة الكسر . مثالة $ت \times \frac{٢}{س}$

$\frac{٢ ت}{س} =$

ور $\frac{١ + ح}{٢} \times \frac{ك}{د} = \frac{ح رك + رك}{د ٢}$

وت $\frac{ت}{ب} = \frac{١}{ب} \times \frac{ت}{ب}$

٥٦ الكسر يُضْرَب في كمية مساوية لمخرجه برفع المخرج . مثالة $\frac{ت}{ب} \times ب = ت$

ت وت $\frac{٢}{س - ي} \times (ت - ي) = م^٢$ و $\frac{٢ + ح}{م + ٢} \times (م + ٢) = ح + ٢$

وهكذا اذا ضُرب في ضلع من اضلاع المخرج برفع ذلك الضلع . مثالة $\frac{ت}{ب}$

$س \times \frac{ت}{ب} = ٦ \times \frac{ح}{٢٤} = \frac{ح}{٤}$

٥٧ الكسر الاضافي هو كسر الكسر وهو الحاصل من ضرب كسرين او اكثر.
 مثاله $\frac{٢}{٤} \frac{٢}{ب} =$ اي ثلثة ارباع $\frac{٢}{ب} = \frac{٢}{٤} \frac{٢}{ب}$ فيقول الكسر الاضافي الى بسيط
 بضرب الصور والمخارج حسبما تقدم

$$\text{حوّل } \frac{٢}{٧} \frac{٢}{ب} \text{ الى كسر بسيط } \frac{٢}{١٤ + ب} \text{ الجواب}$$

$$\text{حوّل } \frac{٢}{٣} \frac{٢}{٥} \frac{٢}{٤} \frac{٢}{ب} \text{ الى كسر بسيط } \frac{٢}{٢ + ح} \text{ الجواب}$$

$$\text{حوّل } \frac{١}{٧} \frac{١}{٣} \frac{١}{٨} \frac{١}{د} \text{ الى كسر بسيط } \frac{١}{٢١١ - ١٦٨} \text{ الجواب}$$

$$\text{فترى ان } \frac{٢}{٣} = \frac{٢}{٣} \text{ و } \frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥} \text{ و } \frac{٢}{٧} = \frac{٢}{٧} \text{ و } \frac{٢}{٧} = \frac{٢}{٧} \text{ وقس}$$

على ذلك

نبتة في قسمة الكسور

٥٨ لقسمة الكسور يُقلَبُ المقسوم عليه بان تجعل صورته مُخرجاً

ومخرجه صورةً ثم يفعل كما في الضرب

فلو قيل اقسام $\frac{٢}{ب}$ على $\frac{٢}{د}$ ل قيل $\frac{٢}{ب} \times \frac{د}{د} = \frac{٢د}{ب د}$ وكيفية هذه

القاعدة هي انه اذا ضرب كسر في ذاته بعد قلبه يكون الحاصل واحداً ابداً. واذا
 ضربت كمية في واحد لا تتغير فان ضرب مقسوم اولاً في المقسوم عليه بعد قلبه ثم
 في ذات المقسوم عليه يكون الحاصل الاخير مساوياً للمقسوم. اما القسمة فهي استخراج
 كمية اذا ضربت في المقسوم عليه حصل المقسوم. والكمية الحاصلة من ضرب المقسوم

في المقسوم عليه بعد قلبه مستكلمة الشروط المذكورة. فالقاعدة اذاً صحيحة

$$\text{اقسم } \frac{٢}{د} \text{ على } \frac{٢}{ح} \text{ الجواب } \frac{٢}{٦ د ح}$$

$$\frac{٢}{د} = \frac{٢}{ح} \times \frac{٢}{٦ د ح}$$

$$\text{اقسم } \frac{د + ك}{ر} \text{ على } \frac{د}{٥} \text{ الجواب } \frac{ك + ٥ د}{٥ ر}$$

$$\frac{د + ك}{ر} = \frac{د}{٥} \times \frac{ك + ٥ د}{٥ ر}$$

اقسم $\frac{د ح}{ك}$ على $\frac{ح ر}{ت}$ الجواب $\frac{ت د}{ر ك}$

$$\frac{د ح}{ك} = \frac{ح ر}{ت} \times \frac{ت د}{ر ك}$$

اقسم $\frac{د ٢٦}{٥}$ على $\frac{ح ١٨}{١٠}$ الجواب $\frac{د ٤}{ح}$

اقسم $\frac{ت ب + ١}{٢ ي}$ على $\frac{ت ب - ١}{ك}$

اقسم $\frac{٢ - ح}{م}$ على $\frac{٢}{١ + ت}$

٥٩ يُقسم الكسر على صحيح بضرب المخرج في ذلك الصحيح. مثاله $\frac{ت}{ب} \div م$

$$\frac{ت}{ب} \div م = \frac{ت}{ب} \times \frac{١}{م} = \frac{ت}{ب م}$$

٦٠ قد تقدم الكلام في (١٢) ان مكفوه كمية هو الخارج من قسمة واحد على

على تلك الكمية. فكفوه $\frac{ت}{ب}$ هو $١ = \frac{ت}{ب} \div \frac{ت}{ب}$ فيكون مكفوه كسر هو الكسر

نفسه مقلوبا. فكفوه $\frac{ب}{٢ + ي}$ هو $\frac{٢ + ي}{ب}$ ومكفوه $\frac{١}{٢ ي}$ هو $\frac{٢ ي}{١}$ او $٢ ي$ ومكفوه

$\frac{١}{٤}$ هو ٤

٦١ قد يقع احيانا كسر في صورة كسر اخر. مثاله $\frac{٤ ت}{ب}$ وهذا الكسر يُنقل

من الصورة الى المخرج او بعكس ذلك بقلبه. ولا تتغير القيمة بذلك لان القسمة على

كسر هي كالضرب في ذلك الكسر مقلوبا. وضرب الصورة كقسمة المخرج وقسمة

الصورة كضرب المخرج. ففي $\frac{٤ ت}{ك}$ يضرب ت في $\frac{٢}{٥}$ ولا تتغير القيمة ان قسمنا

المخرج على $\frac{٢}{٥}$ اي ضربناه في $\frac{٥}{٢}$ فاذا $\frac{٤ ت}{ك} = \frac{٤ ت}{٢ ك}$ وهكذا $\frac{٤ ت}{٢ ك} = \frac{٢ ت}{ك}$

$$\frac{٤ ت}{٢ ك} = \frac{٢ ت}{ك} \text{ وقس على ذلك}$$

ثم ان هذا الكسر الواقع في الصورة يمكن ازالته لان ضرب الصورة هو كضرب

القيمة. فاذا $\frac{٤ ت}{ب} = \frac{٢ ت}{٥} \times \frac{٢}{٥} = \frac{٢ ت}{٥} \times \frac{٢}{٥} = \frac{٤ ت}{٥٥}$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{5}{1} = \frac{5}{4}$$

ويعكس العمل $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$

$$\frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

أما الكسر الواقع في المخرج فيزال بالقسمة أي بضرب الكسر الأصلي في ذلك الكسر مقلوباً. مثالة $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

وأيضاً $\frac{7}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{7}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{21}{8}$ وبالعكس $\frac{7}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$

وأيضاً $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

٦٢ قد يكون كلا الصورة والمخرج كسراً. مثالة $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

وأيضاً $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$



الفصل السابع

في المعادلات من الدرجة الأولى وهي البسيطة

٦٣ المعادلة عبارة جبرية دالة على المساواة بين كميتين فأكثر. كقولك $a + b = c$ أي أن مجموع a و b يعدل مجموع c ود المقصود منها أننا هو استعمال كمية مجهولة بواسطة تحويل المعادلة التي فيها تقع المجهولة مرتبطة مع كميات معلومة. وتحويل المعادلات هو نقل المجهولات إلى جانب واحد من علامة المساواة والمعلومات إلى الجانب الآخر منها بدون نزع المعادلة أي المساواة بين الجانبين. ولا يجب أن المعادلة لا تنتزع إذا اضيف إلى الجانبين شيئاً متساوية (أولية أولى) ولا إذا طرح منها شيئاً متساوية (أولية ثانية) ولا إذا ضربا في شيئاً متساوية

(اولية ثالثة) ولا اذا انقسما على اشياء متساوية (اولية رابعة) فلنا ثلث طرق لمعاملة المعادلات بدون نزح المساواة بين الجانبين وهي النقل والضرب والقسمة
 اما النقل فلو فرضنا هذه المعادلة $ك - ٧ = ٧ - ٩$ نضيف الى الجانبين ٧ فنصير
 $ك - ٧ + ٧ = ٧ - ٧ + ٧$ ولكن $٧ - ٧ = ٠$ فيبقى $ك = ٧ + ٩$ فوجدنا قيمة المجهولة
 ك وهي $٧ + ٩$ اي ١٦

نفرض ايضا $ك + ب = ت$

اطرح ب من الجانبين فنصير $ك + ب - ب = ت - ب$ ولكن $ب - ب = ٠$
 فاذا $ك = ت - ب$

فترى ان العمل قد تم بنقل المعلومة من الجانب الواحد الى الاخر مع تبديل علامتها وهذا العمل يقال له المقابلة. ولنا ما سبق هذه القاعدة

متى ارتبطت الكمية المجهولة مع كميات معلومة بعلامة الجمع او الطرح فانقل المعلومات الى الجانب المتقابل وابدل علاماتها

مفروض $ك + ٣ - ب - م = ح - د$

بالمقابلة $ك = ح - د - ٣ + ب + م$

٦٤ متى وقعت كميات متشابهة على جانب واحد يجب جمعها حسب قواعد

الجمع

فلو فرض $ك + ٥ - ب - ٤ = ح = ٧ - ب$

بالمقابلة $ك = ٧ - ب - ٥ + ب + ٤ = ح$

وبالجمع $ك = ٢ + ب + ٤ = ح$

اذا كانت المجهولة على الجانبين يجب نقلها الى جانب واحد

فلو فرض $٢ ك + ح = ٢ ح + د + ٣ ك$

بالمقابلة $٢ ح - ح - د = ٣ ك - ٢ ك$

وبالجمع $ح - د = ك$

٦٥ اذا وقعت كميات متساوية بعلامات متشابهة على الجانبين يمكن طرحها

منها في الحال

فلو فُرض $ك + ٢ = د + ٣ + ح + ٧$ د

اطرح $٢ + ح$ من الجانبين

$$د + ٧ = ب + ٧$$

وبالمقابلة والجمع $ك = ب + ٦$ د

ولا فرق في ترتيب الكميات ولا في الجانب الذي تُنقل اليه. وإذا ابدلت جميع علامات الجانبين لا تتغير المعادلة. مثالة $ك - ب = د - ت$ بالمقابلة لنا $د + ت = ك + ب$ او $ك + ب = د + ت$ وإذا نُقل جميع الكميات الى الجانب الواحد يبقى الاخر صفرًا. فلو فُرض $ك + ب = د$ فحينئذ $ك + ب - د = ٠$

وعلى ما تقدم نفحول هذه المعادلات

$$ت + ٢ - ك = ٨ - ب - ٤ + ك + ت$$

$$٥ - ت - ب - ح = ت + ٢ - ٤ + ت + ب + ح$$

$$٣٠ + ح + ٧ = ك + ٨ - ٦ + ح + ٦ - ك - د + ب$$

$$ب + ح + ٢١ - ٤ = ك + د = ١٢ - ٢ - ك - ٧ + ب + ح + د$$

$$٦٦ \text{ اما الضرب فيستعمل متى انقسمت الكمية المجهولة على معلومة كما في } \frac{ك}{ت} =$$

ب بضرب الجانبين في ت فتصير $ك = ت ب$

ولنا من ذلك هذه القاعدة

متى انقسمت المجهولة على معلومة فاضرب الجانبين في تلك المعلومة

ثم قابل واجمع كما تقدم

$$\frac{ك}{س} + ت = د + ب$$

اضرب الجانبين في س $ك + ت س = ب س + د س$

وبالمقابلة $ك = ب س + د س - ت س$

وهذا العمل يقال له الجبر اي اعادة الكسر صحيحًا

$$\text{مفروض } \frac{ك - ٤}{٦} + ٥ = ٢٠$$

$$\text{بالجبر } ك - ٤ + ٣٠ = ١٢٠$$

$$\text{بالمقابلة } ك = ١٢٠ - ٣٠ + ٤ = ٩٤$$

مفروض $ك = د + \frac{ك}{ت + ب} ح$

بالجبر $ك + ت د + د = د ب + ح + ح$

بالمقابلة $ك = ت ح + ح - ت د - د ب$

وهكذا متى وقعت المجهولة في مخرج كسر يضرب الجانبان في ذلك المخرج

مفروض $٨ = ٧ + \frac{٦}{ك - ١٠}$

اضرب في (١٠ - ك) $٨(١٠ - ك) = ٧(١٠ - ك) + ٦$

بالمقابلة والجمع $٤ = ك$

٦٧ لو فرض $\frac{ح}{س} + \frac{د}{ب} = \frac{ك}{ت}$

فالضرب في ت نصير $ك = \frac{ت د}{ب} + \frac{ت ح}{س}$

وبالضرب في ب نصير $ت ك = د + \frac{ت ب ح}{س}$

وبالضرب في س نصير $ب س ك = ت د س + ت ب ح$

او بالضرب في جميع المخارج دفعة واحدة نصير $\frac{ت ب د س ك}{ب} = \frac{ت ب س ك}{ت} + \frac{ت ب ح س}{س}$

ثم باخراج الاحرف المتشابهة من الصور والمخارج لنا كما في الاول ب س ك = ت س د + ت ب ح ولنا من ذلك هذه القاعدة لازالة الكسور من معادلة اي لجبرها

اضرب كل صورة في جميع المخارج الا مخرجها

مفروض $\frac{ك}{ت} = \frac{ب}{د} + \frac{ح}{ع} - \frac{ي}{ف}$

بالجبر $د ع م ك = ت ب ع م + ت د م ي - ت د ع ح$

مفروض $\frac{ك}{٣} = \frac{٢}{٤} + \frac{٤}{٥} + \frac{٦}{٣}$

بالجبر $٢٠ ك = ٤٠ + ٤٨ + ١٨٠$

٦٨ اذا كانت علامة كسر سلبية وجب تبديلها بدون تغير القيمة كما نقدم في

فصل الكسور (٤٧)

$$\frac{ت-د}{ك} = س - \frac{٢-ب-٢٢-٦}{ر} \quad \text{مفروض}$$

$$\frac{ت-د}{ك} = س + \frac{٦+٢٢+٢-ب}{ر} \quad \text{بتبديل العلامات}$$

ثم بالمجرب ت-ر-د=رس ك-٢ ب ك+٢ ح م ك+٦ ك

٦٩ اما القسمة فتغلّب بها المعدلات متى ضربت المجهولة في المعلومة وذلك

بقسمة جانبي المعادلة على تلك المعلومة. فلو فرضت ك+ب-٢ ح=د

$$\frac{٢+ب-د}{ت} = ك \quad \text{فبالمقابلة تصيرت ك=د-ب+٢ ح وبالقسمة على ت}$$

$$\frac{٢}{ك} = \frac{ت}{س} - \frac{د}{٤} + ب \quad \text{مفروض}$$

$$٢ س ح ك = ت ح - س د + ٤ ب ح س \quad \text{بالمجرب}$$

$$\frac{ت ح - س د + ٤ ب ح س}{٢ س ح} = ك \quad \text{بالقسمة على ٢ س ح}$$

$$٢ ك - ب ك = ت - د \quad \text{مفروض}$$

$$\text{حسب (٢٨) (ب-٢) ك = ت - د}$$

$$\frac{د-ت}{ب-٢} = ك \quad \text{بالقسمة على ٢-ب}$$

$$ت ك + ك = ٤ - ح \quad \text{مفروض}$$

$$\frac{٤-ح}{١+ت} = ك \quad \text{بالقسمة على ١+ت}$$

$$\frac{د+ت}{٤} = \frac{ب-ك}{ح} \quad \text{مفروض}$$

$$٤ ح ك - ٤ ك + ٤ ب = ت ح + ح د \quad \text{بالمجرب}$$

$$\frac{ت ح + ح د - ٤ ب}{٤ - ح ٤} = ك \quad \text{بالمقابلة والقسمة}$$

٧٠ اذا ضرب كل جزء من المعادلة في كمية ما فيجب قسمة المعادلة عليها.

واذا انقسم كل جزء على كمية ما يجب ضرب المعادلة فيها. وهكذا تصير ايسر مما

كانت وتسهل معاملتها حسبما تقدم

مفروض ت ك + ٣ ت ب = ٦ ت د + ت

بالقسمة على ت ك + ٣ ت ب = ٦ + د

بالمقابلة ك = ٦ - ١ + د

$$\frac{د - ح}{ك} = \frac{ب}{ك} - \frac{١ + ك}{ك} \quad \text{مفروض}$$

بالضرب في ك حسب (٤٨) ك + ١ - ب = ح - د

بالمقابلة ك = ح - د + ب - ١

مفروض ك × (ت + ب) - ت - ب = د × (ت + ب)

بالقسمة على ت + ب ك - ١ = د

وبالمقابلة ك = د + ١

٧١ اذا اقتضى كتابة مسئلة على هيئة النسبة فتتحول تلك النسبة الى معادلة بان تجعل حاصل الطرفين مساوياً لحاصل الوسطين كما عرفت في علم الحساب.

فان فرضت : ب :: س : د فاذا ت د = ب س وان فرض ٢ : ٤ :: ٦ : ٨ فحينئذ ٢ × ٨ = ٤ × ٦ وهكذا ك : ب :: س : ح د ثم ت د ك = ب ح س وايضاً ت + ب : س :: ح - م : ي ثم ت ي + ب ي = ح س - م س

٧٢ نتحول معادلة الى نسبة بفك الجانب الواحد الى ضلعين فيجعلان طرفين. والجانب الاخر الى ضلعين فيجعلان وسطين. فلو فرضت ب س = د ي ح فينك الجانب الاول الى ت × ب س اوت ب × س اوت س × ب وهكذا بفك الجانب الاخر الى د × ي ح اود ي × ح اود ح × ي

ولنا من ذلك عدة نسب اي ت : د :: ي : ح ب : س وايضاً ت ب : د ي :: ح : س اوت س : د ح :: ي : ب وهلم جراً لان هذه النسب كلها اذا تحولت الى معادلات نصيرت ب س = د ي ح

فلو فرضت ايضاً ك + ب = د - س ح لانك الجانب الاول الى ك × (ت + ب) والثاني الى س × (د - ح) ولنا ك : س :: د - ح : ت + ب اود - ح : ك :: ت + ب : س وهلم جراً

امثلة

$$(1) \text{ مفروض } 7 + \frac{5}{8} = 6 + \frac{3}{4}$$

$$\text{بالجبر } 224 + 5 = 192 + 3$$

$$\text{بالمقابلة والجمع } 32 = 3$$

$$\text{بالتقسمة على } 8 = 3$$

$$(2) \text{ مفروض } \frac{7}{8} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{3}{4}$$

$$\text{بالجبر } 7 + 5 = 6 + 3$$

$$\text{بالمقابلة والتقسمة على } 8 = 3$$

$$(3) \text{ مفروض } 12 = 14 - 120 = 16 - 6 - 40$$

$$(4) \frac{92}{4} = 23 = \frac{19 - 3}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

$$(5) = 23 = \frac{16}{2} = 8$$

$$(6) = 23 = 8 - \frac{1}{2}$$

$$(7) = 23 = 8 - \frac{1}{2}$$

$$(8) = 23 = \frac{16}{2} = 8$$

$$(9) = 23 = \frac{16}{2} + \frac{1}{2} = 8.5$$

$$(10) = 23 = \frac{16}{2} + \frac{1}{2} = 8.5$$

$$(11) = 23 = \frac{16}{2} + \frac{1}{2} = 8.5$$

$$(12) \frac{27 - 11}{2} + 0 = \frac{16}{2} + 2 = 10$$

$$(13) \frac{4 - 18}{2} + 2 = \frac{14}{2} = 7$$

$$(14) \frac{7 - 97}{2} + \frac{0 - 0}{8} = \frac{11 - 3}{16} + 21 = 20.6875$$

$$\frac{1}{12} - \frac{14 + ك٥}{2} = 4 - \frac{4 - ك}{4} - ك \quad (15)$$

$$\frac{9 + ك٢}{2} = 6 + \frac{ك٤ + 16}{5} - \frac{5 + ك٧}{2} \quad (16)$$

$$\frac{14 + 5٧}{2} + ٧ - 5 = \frac{2 + 5٤}{2} - \frac{5٢ - 1٧}{5} \quad (17)$$

$$\frac{4 - 24}{5} + \frac{8 - 26}{7} - \frac{2 - 20}{2} = 4 + \frac{2 - 22}{5} - ٣ \quad (18)$$

$$\frac{4 + ك٢}{2} = \frac{12 - ك٧}{2 - ك٦} + \frac{٧ + ك٦}{9} \quad (19)$$

$$4 : ٧ :: \frac{ك - 18}{4} : \frac{4 + ك٥}{2} \quad (20)$$

علیّات

(١) سیل رجل عن ثمن ساعته فقال ان ضرب ثمنها في اربعة واضيف الى الحاصل سبعون وطرح المجموع خمسون يكون الباقي ٢٢٠ ديناراً. فكم ثمن الساعة افرض ثمن الساعة ك

واذا ضرب هذا الثمن في ٤ بصير ٤ ك

ثم اصف الى هذا الحاصل ٧٠ فيصير ٤ ك + ٧٠

اطرح من المجموع ٥٠ فيصير ٤ ك + ٧٠ - ٥٠

وهذا الباقي يعادل ٢٢٠ ديناراً اي ٤ ك + ٧٠ - ٥٠ = ٢٢٠

وتحويل هذه المعادلة لنا ك = ٥٠

فقد وجدنا ثمن الساعة خمسين ديناراً. ولا تمنحان العمل توضع قيمة المجهول عوض المجهول في المعادلة الاصلية فان كان الجانبان متساويين كان العمل صحيحاً ولا فلا. مثاله في المسئلة السابقة بالتعويض عن ك بخمسين نصير ٤ × ٥٠ + ٧٠ -

٥٠ = ٢٢٠ وهو صحيح

(٢) اي عدد يضاف اليه نصفه ثم يطرح ٢٠ من المجموع فيكون الباقي ربع

العدد

افرض العدد ك

ثم حسب شروط المسئلة ك + $\frac{ك}{2}$ - ٢٠ = $\frac{ك}{4}$

وتحويل هذه المعادلة نصير ك = ١٦

$$\frac{١٦}{٤} = ٢٠ - \frac{١٦}{٣} + ١٦$$

(٢) رجلٌ قسم مبلغاً بين اولاده الثلاثة فاعطى الاول نصف المبلغ الالف دينار. والثاني ثلث المبلغ الا ٨٠٠ دينار. والثالث ربع المبلغ الا ٦٠٠ دينار. فكم كان المبلغ

$$\text{اذا فرضنا ان المبلغ ك تكون الحصص } \frac{ك}{٣} - ١٠٠٠ - \frac{ك}{٤} - ٨٠٠ - \frac{ك}{٤} = ٦٠٠$$

ومجموع هذه الثلاثة يعادل المبلغ اي $\frac{ك}{٣} + \frac{ك}{٤} + \frac{ك}{٤} = ٢٤٠٠$ ك
وبالتحويل ك = ٢٨٨٠٠

(٤) اقس ٤٨ الى قسمين حتى ينقسم اكبرها على ٦ واصغرها على ٤ ويكون مجتمع الخارجين ٩

ان فرض الاصغر ك يكون الاكبر ٤٨ - ك
وحسب شروط المسئلة $\frac{ك}{٤} + \frac{٤٨ - ك}{٦} = ٩$

وبالتحويل ك = ١٢ اصغرها ٤٨ - ١٢ = ٣٦ اكبرها
(٥) اي عدد اذا اضيف اليه نصفه يكون المجموع اكثر من ٦٠ بفضلة العدد ٦٥

افرض العدد ك فلنا ك + $\frac{ك}{٢} = ٦٠$ - ك
ك = ٥٠

(٦) اقس ٢٢ الى قسمين حتى ينقسم اصغرها على ٦ واكبرها على ٥ ويكون مجتمع الخارجين ٦

لفرض اصغرها ك فيكون اكبرها ٢٢ - ك
وبشروط المسئلة $\frac{ك}{٦} + \frac{٢٢ - ك}{٥} = ٦$

ك = ١٢ اصغرها ٢٢ - ١٢ = ١٠ اكبرها
(٧) اقس ٢٥ الى قسمين يكون اكبرها ٤٩ من اصغرها

لفرض الاصغر ك والاكبر ٢٥ - ك فلنا ٢٥ - ك = ٤٩ ك ك = $\frac{١}{٣}$

اصغرها و $\frac{1}{3}$ اكبرها

(٨) اقسام ٤٨ الى ٩ اقسام حتى يكون كل قسم اكبر من الذي قبله بنصف

ليكن القسم الاصغر ك

فيكون الثاني $\frac{1}{3} + ك$

والثالث $١ + ك$

والرابع $١ \frac{1}{3} + ك$

وهلم جرا $٢ + ك$

$٢ \frac{1}{3} + ك$

$٣ + ك$

$٣ \frac{1}{3} + ك$

$٤ + ك$

تجمع هذه الاقسام $٤٨ = ١٨ + ك \cdot ٩$

$٣ \frac{1}{3} = ك$

والاقسام $٧ \frac{1}{3} + ٦ \frac{0}{7} + ٥ \frac{0}{3} + ٤ \frac{0}{7} + ٤ \frac{1}{3} + ٣ \frac{0}{7} + ٣ \frac{1}{3}$

$٤٨ = ٧ \frac{1}{3} + ٦ \frac{0}{7}$

تنبيه. هذه المسئلة تحل ايضا بقواعد السلسلة الحسابية على اسهل طريقة كما ستعلم

(٩) اي عدد يطرح واحد من مضاعفه ثم يضاعف الباقي ويطرح منه ٢

ويقسم هذا الباقي على ٤ فيكون الخارج اقل من العدد بواحد

لفرض العدد ك فيكون مضاعفه ٢ ك وان طرح منه واحد يكون ٢ ك - ١

ومضاعفه ٤ ك - ٢ ثم يطرح ٢ فيكون ٤ ك - ٢ - ٢ اي ٤ ك - ٤ وبالقسمة

على ٤ يصير ك - ١ وهذا يعادل العدد الا واحدا اي ك - ١ = ك - ١

فلنا ما يسمى معادلة ذاتية. وهذه المعادلة تدل على ان المجهول غير معين فيمكن

ان يفرض اي عددٍ شئت

(١٠) رجل اشترى اذرعاً من القماش. وكان ثمن كل ٥ اذرع ٧ غروش. ثم باع ما اشتراه بثمن ١١ غرشاً لكل ٧ اذرع ورجح ١٠٠ غرش فكم ذراعاً اشترى لنفرض الاذرع ك و $\frac{٧}{٥}$ الغرش ثمن الذراع و $\frac{٧}{٥}$ ك ثمن الاذرع كلها ثم عند البيع كان ثمن الذراع $\frac{١١}{٧}$ من الغرش و ثمن الجميع $\frac{١١}{٧}$ ك وفضلة الشراء والبيع ١٠٠ اي $\frac{١١}{٧} ك - \frac{٧}{٥} ك = ١٠٠$ ك = ٢٥٠٠ ك = ٥٨٢ $\frac{١}{٦}$

(١١) اي عددٍ اذا اضيف اليه ٧٢٠ وقسم المجموع على ١٢٥ يعادل الخارج ٧٣٩٢ مقسوماً على ٤٦٢

الجواب ١٢٨٠

(١٢) احد التجار تاجر في صنفٍ من البضائع فرجح او خسر. وفي صنفٍ اخر ربح ٢٥٠ ديناراً. وفي صنفٍ اخر خسر ٦٠ ديناراً. ورجح من الاصناف الثلاثة ٢٠٠ دينار. فكم ربح او خسر في الاول لنفرض المجهول ك فان حسبنا الربح + تكون الخسارة - فلنا ك + ٢٥٠ - ٢٠٠ = ٦٠ وبالمقابلة ك = ٩٠

فكون الجواب سلبياً يدل على انه خسر في الاول

(١٢) سفينة سافرت الى الشمال ٤° ثم الى الجنوب ١٣° ثم الى الشمال ايضاً ١٧° ثم الى الجنوب ايضاً ١٩° وكان لها حينئذ ١١° من العرض الجنوبي فكم كان عرضها في الاول

لنفرض ك = العرض المطلوب. فان حسبنا الشمال + يكون الجنوب - ولنا ك + ٤ - ١٣ + ١٧ - ١٩ = ١١ ك. اي كانت على خط الاستواء (١٤) اي عددٍ اذا انقسم على ١٢ يكون مجموع الخارج والمقسوم والمقسوم عليه ٦٤

لنفرض ك = العدد. فلنا $\frac{ك}{١٢} + ك + ١٢ = ٦٤$

وبالحجب والمقابلة والقسمة ك = $\frac{٦٢٤}{١٢} = ٤٨$

(١٥) رجل اشترى ١٢ ثوب قماش منها اثنان ابيضان وثلاثة سود وسبعة زرق بثمن ١٤٠ ديناراً. وكان ثمن الثوب الاسود يزيد عن ثمن الابيض دينارين والازرق عن الاسود ثلاثة دنانير فكم كان ثمن كل واحد منها

لنفرض ك = ثمن الابيض فيكون ثمن الثوبين ك + ٢ و ثمن الاسود ك + ٢ فيكون ثمن الثلاثة ك + ٦ و ثمن الثوب الازرق ك + ٥ فيكون ثمن السبعة ك + ٧ + ٢ = ٢٥ والمجموع ١٢ ك + ٤١ فلنا ١٢ ك + ٤١ = ١٤٠ = ٤١ ك + ٨ = ثوباً ابيض

$$\frac{1}{4} = 10 \text{ ثوباً اسود} \quad \frac{1}{4} = 12 \text{ ثوباً ازرق}$$

(١٦) مبلغ اتقسم بين اربعة وراث فكان للاول ٢٠٠ دينار زيادة عن $\frac{1}{4}$ المبلغ. وللثاني ٢٤٠ زيادة عن $\frac{1}{5}$ المبلغ. وللثالث ٣٠٠ دينار زيادة عن $\frac{1}{6}$ المبلغ. وللرابع ٤٠٠ دينار زيادة عن $\frac{1}{8}$ المبلغ. فكم كان ذلك المبلغ الذي اتقسم

الجواب ٤٨٠٠ ديناراً

(١٧) مطلوب عدد اقل من ٥٠٠ بمقدار زيادة خمسو على ٤٠

الجواب ٤٥٠

(١٨) ما عددان فضلتهما ٤٠ ونسبة احدهما الى الاخر كسبة ٦ الى ٥

الجواب ٢٤٠ و ٢٠٠

(١٩) مزيج من النحاس والقصدير والرصاص كان فيه النصف الا ١٦

رطلاً نحاساً. والثالث الا ١٢ رطلاً قصديراً. وكان الرصاص اكثر من الربع باربعة ارطال. فكم رطلاً من كل صنف كان في ذلك المزيج

الجواب كان النحاس = ١٢٨ رطلاً. والقصدير = ٨٤ رطلاً. والرصاص =

٧٦ رطلاً

(٢٠) مركبان بينها ١٨ ميلاً. والمتاخر منها يجري ١٠ اميال في الساعة

والمتقدم ٨ اميال فكم ميلاً يجري المتقدم قبل ان يلحقه المتاخر

الجواب ٧٢ ميلاً

(٢١) ما عددان مجتمعهما سدس حاصلها ونسبت احدها الى الاخر كسبة

٢ الى ٢

الجواب ١٥ و ١٠

(٢٢) كلب وارنب بينهما ٥٠ قفزة. وكلما قفز الكلب ٢ قفزات يقفز الارنب ٤ غير ان الفئزين من الكلب تساويان ٢ قفزات من الارنب. فكم قفزة يقفز الكلب قبل ان يدرك الارنب

الجواب ٢٠٠

(٢٣) ثلثة شعرة مدحوا ملكاً. فجعل الملك جازبة الاول ٢٠٠ دينار. و جازبة الثاني كالأول وثلث الثالث. و جازبة الثالث كججمع الجازبتين الأولين. فكم مجتمع الجوايز الثلاث

الجواب ١٢٠٠ دينار

(٢٤) اي عددٍ نسبته الى ١٢ مع ثلاث مرات العدد كسبة ٢ : ٩

الجواب ٨

(٢٥) زورق تقدم عن مركب ١٢ ميلاً وكان يجري ٢ اميال كلاً جري المركب ٥ اميال. فكم ميلاً يجري المركب قبل ان يدرك الزورق

الجواب $٢٢ \frac{1}{3}$ ميل

(٢٦) اي عددٍ فضلة سدسو وثمنه ٢٠

الجواب ٤٨٠

(٢٧) اقسام ٢٠٠٠ الى قسمين بحيث تكون نسبة احدها الى الاخر :: ٧ : ٩

الجواب ١١٢٥ و ٨٧٥

(٢٨) اي عددٍ مجتمع ثلثو وربعو وخمسو ٩٤

الجواب ١٢٠

(٢٩) بين زيد وعمرو مسافة ٣٦٠ ميلاً فسافرا حتى التقيا. اما زيد فسار كل ساعة ١٠ اميال واما عمرو فثمانية اميال في الساعة. فكم قطع كل واحدٍ من المسافة قبل ان التقيا

الجواب زيد = ٢٠٠ ميل وعمرو ١٦٠ ميلاً

(٣٠) رجلٌ عاش ثلث عمره في القسطنطينية ورُبعة في دمشق والباقي وهو ٢٠ سنة في مصر فكم سنة عاش

الجواب ٤٨ سنة

(٣١) اي عددٍ فضله ربعه وخمسه ٩٦

الجواب ١٩٢٠

(٣٢) عمودٌ في بركة خمسة في الارض و $\frac{٢}{٣}$ منه في الماء و ١٢ قدماً فوق الماء فكم قدماً طول العمود

الجواب ٢٥ قدماً

(٣٣) اي عددٍ اذا اضيف اليه ١٠ يكون $\frac{٢}{٥}$ المجمع ٦٦

الجواب ١٠٠

(٣٤) بستان كان فيه $\frac{٢}{٤}$ الاشجار تفاحاً و $\frac{١}{١٠}$ كمثري والبقية وهي ٢٠ شجرة أكثر من ثمن الجميع سفرجلاً فكم شجرة في البستان

الجواب ٨٠٠

(٣٥) رجلٌ اشترى ارطالاً من الخمر بثمن ٩٤ غرشاً وشرب منها سبعة ارطال ثم باع ربع الباقي بعشرين غرشاً على سعر مشتراه فكم رطلاً اشترى

الجواب ٤٧ رطلاً

(٣٦) لزيد وعبيد ايرادٌ واحدٌ سنوياً. اما زيدٌ فانفق كل سنة فوق ايراده مبلغاً يساوي $\frac{١}{٧}$ ايراده. واما عبيدٌ فانفق كل سنة $\frac{٢}{٥}$ ايراده. وبعد ١٠ سنين حصل عنده مبلغٌ يساوي المال الذي انكسر على زيد مع زيادة ١٦٠ ديناراً. فكم كان الايراد

الجواب ٢٨٠ ديناراً

(٣٧) رجلٌ عاش ربع عمره بتولاً. ثم تزوج وبعد ذلك بمدة ٥ سنين أكثر من $\frac{١}{٧}$

عمره وولد له ابنٌ. ثم مات الابن قبل ابيه بمدة ٤ سنين وهو قد بلغ نصف عمر ابيه. فكم سنة عاش الرجل

الجواب ٨٤ سنة

$$(٣٨) \text{ ابّے عددٍ مجموع } \frac{1}{3} \text{ و } \frac{1}{4} \text{ و } \frac{2}{7} \text{ منه } ٧٣$$

الجواب ٨٤

(٣٩) رجلٌ انفق ١٠٠ ديناراً أكثر من $\frac{1}{10}$ ابراده فبقي ٣٥ ديناراً أكثر من نصفه

فكم كان الايراد

الجواب ٤٥٠

(٤٠) مقدارٌ من البارود كان فيه الملح ١٠ ارطال أكثر من $\frac{2}{3}$ الجميع والكبريت

$\frac{1}{4}$ رطل اقل من $\frac{1}{6}$ الجميع. والنعم اقل من $\frac{1}{7}$ الملح برطلين. فكم رطلاً كان البارود

الجواب ٦٩ رطلاً

(٤١) وعاءٌ يسع ١٤٦ رطلاً امتلاً بهنج من سمنٍ وعسلٍ وماء. وكان العسل

أكثر من السمن بخمسة عشر رطلاً والماء بقدرها جميعاً. فكم رطلاً كان فيه من كل

صنفٍ

الجواب كان السمن ٢٩ رطلاً والعسل ٤٤ والماء ٧٣

(٤٢) اربعة اشخاص اشتركوا في شراء بستانٍ ثمنه ٤٧٥٥ ديناراً. فدفع

زيدٌ من الثمن ثلثة اضعاف ما دفعه عمروٌ. ودفع عبيدٌ بقدر ما دفعها كلاهما. ودفع

عبدالله بقدر ما دفع زيدٌ وعبيدٌ معاً. فكم دفع كل واحدٍ منهم

الجواب دفع زيد = ٩٥١ وعمرو = ٣١٧ وعبيد = ١٢٦٨ وعبدالله

= ٢٢١٩

(٤٣) اقسام ٩٩ الى خمسة اقسام يكون الاول أكثر من الثاني بثلثة واقل من

الثالث بعشرون وأكثر من الرابع بتسعة واقل من الخامس بستة عشر

لفرض ك = الاول ك - ٣ = الثاني ك + ١٠ = الثالث ك - ٩ =

الرابع ك + ١٦ = الخامس ك + ٥ + ١٤ = ٩٩ = ك + ٨٥ = ك + ١٧ =

(٤٤) رجلٌ قسم ما لآبين اولاده الاربعة فاعطى الثالث ٩ غروش زيادة عن

الرابع. والثاني ١٢ غرشاً زيادة عن الثالث. ولأول ١٨ غرشاً أكثر من الثاني.

وكان الجميع يزيد ٦ غروش عن حصة الرابع سبع مرات فكم كان المال
الجواب ١٥٢ غرشاً

(٤٥) كان لرجل قطيعان من الغنم متساويين في عدد الرؤوس فباع من
القطيع الواحد ٢٩ رأساً ومن الاخر ٢٣ رأساً فكان الواحد مضاعف الاخر في
العدد. فكم رأساً كان كل قطيع

الجواب ١٤٧

(٤٦) ساع سعي خمسة ايام وكان يقطع كل يوم ٦٠ ميلاً. ثم تبعه اخر وكان
يقطع كل يوم ٧٥ ميلاً ففي كم يوم يدرك الاول

الجواب في ٢٠ يوماً

(٤٧) كان عمر زيد مضاعف عمر عبيد. وعمر عبيد بقدر عمر عبدالله ثلث
مرات. ومجموع اعمار الثلاثة ١٤٠ سنة فكم عمر كل واحد منهم

الجواب عمر زيد ٨٤ وعبيد ٤٢ وعبدالله ١٤

(٤٨) ثوبان قيمة الذراع من كليهما واحدة ولكن الواحد اطول من الاخر فيبلغ
ثن الواحد ٥ دنانير والاخر $\frac{1}{3}$ دينار. فان اضيف الى كل واحد منها ١٠ اذرع
كان الواحد الى الاخر :: ٦ : ٥ مطلوب طول كل ثوب

الجواب ٢٠ و ٢٦ ذراعاً

(٤٩) تاجر ان راس مال الواحد منها كراس مال الاخر. وفي السنة الاولى
ربح احدها زيد ٤٠ ديناراً وخسر احدها عبيد ٤٠ ديناراً. وفي السنة الثانية خسر
زيد $\frac{1}{3}$ ما كان له في نهاية السنة الاولى وربح عبيد ٤٠ ديناراً اقل من مضاعف ما
خسره زيد. وكان لعبيد حينئذ مضاعف ما كان لزيد فكم كان راس المال

الجواب ٢٢٠ ديناراً

(٥٠) اي عدد اذا اضيف الى ٢٦ ثم الى ٥٢ تكون نسبة المجموع الاول الى
الثاني :: ٣ : ٤

الجواب ١٢

(٥١) رجل اشترى جملاً وفرساً وحلاً بثلاثمائة وستين ديناراً. وكان ثمن الفرس

مضاعف ثمن الحمار وثن الجمل مضاعف ثمن الفرس والحمار كليهما. فإذا كان ثمن كل واحدٍ من الثلاثة

الجواب ثمن الجمل = ٢٤٠ والفرس = ٨٠ والحمار = ٤٠ ديناراً

(٥٢) أنا أناءً امتلاً خمرًا ثم رشع منه ثلث ما فيه ثم أخذ منه ٢١ رطلاً وبقي نصف ملء الأناة فكم رطلاً كان فيه أولاً

الجواب ١٢٦ رطلاً

(٥٣) رجل كان له ستة بنين كل واحدٍ منهم أكبر من الذي يليه بأربع سنين وعمر الأكبر ثلاثة أضعاف عمر الأصغر. فما هو عمر كل واحدٍ منهم

الجواب ١٠ ١٤ ١٨ ٢٢ ٢٦ ٣٠

(٥٤) اقسام ٤٩ الى قسمين تكون نسبة الأكبر مع ستة الى الأصغر ١١

كسبة ٩ : ٢

الجواب ٣٠ = الأكبر = ١٩ = الأصغر

(٥٥) ما عددان نسبة اصغرها الى الأكبر :: ٢ : ٣ وان اضيف اليها ٤ تكون

النسبة :: ٥ : ٧

الجواب ١٦ و ٢٤

(٥٦) رجل اشترى زقين من الخمر ملوؤين احدهما يسع ملّ الاخر ثلاث مرات

فاخذ من كل واحدٍ اربعة ارطال وبقي في الواحد قدر ما بقي في الاخر اربع مرات فكم رطلاً كان فيها

الجواب ١٢ و ٣٦

(٥٧) اقسام ٦٨ الى قسمين تكون فضلة اكبرها و ٨٤ بقدر ثلاث مرات

فضلة اصغرها و ٤٠

الجواب ٤٢ و ٢٦

(٥٨) اربعة اماكن على ترتيب ب ت ث ج وبين ب و ج ٣٤ ميلاً وبعده ب

عن ت الى بعد ث عن ج :: ٢ : ٣ واذا اضيف ربع بعد ب عن ت الى نصف بعد

ث عن ج يكون المجموع ثلاث مرات بعد ت عن ث مطلوب بعد كل واحدٍ عن

الاخر

الجواب ب الى ت = ١٢ من ت الى ث = ٤ من ث الى ج = ١٨
 (٥٩) اقسام ٢٦ الى ٣ اقسام بحيث يكون نصف الاول و $\frac{1}{3}$ الثاني و $\frac{1}{٤}$

الثالث متساوية

الجواب ٨ و ١٢ و ١٦

(٦٠) تاجر عاش ثلاث سنين على ٥٠ ديناراً كل سنة . وفي نهاية كل سنة كان يضيف الى ما بقي من ماله مبلغاً يساوي ثلث تلك البقية . وعند نهاية السنة المذكورة كان راس ماله قد تضاعف فكم كان راس المال

الجواب ٧٤٠ ديناراً

(٦١) قائد جيش بعد وقعة انكسر فيها وجد نصف جيشه و ٢٦٠٠ نفر يصلحون لوقعة اخرى و $\frac{1}{٨}$ الجيش و ٦٠٠٠ نفر مجارح . والبقية اي $\frac{1}{٥}$ الجميع قتلى فكم كان عدد الجيش اولاً

الجواب ٢٤٠٠٠



الفصل الثامن

في الترقية والقوات

٧٢ اذا ضربت كمية في ذاتها سي الحاصل قوة . مثاله $٢ \times ٢ = ٤$ اي مربع اثنين او مال اثنين او القوة الثانية من اثنين و $٢ \times ٢ \times ٢ = ٨$ اي كعب اثنين او القوة الثالثة من اثنين و $٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ١٦$ اي مال مال اثنين او القوة الرابعة من اثنين و $ت \times ت =$ مربع ت او مال ت او قوة ت الثانية وقس على ذلك . والكمية الاصلية التي بتكرار ضربها حصلت قوة ما هي جذر تلك القوة ويقال لها الجذر المائى والمربع والثاني او الجذر الكعبى والثالث او الرابع او الخامس بالنسبة الى القوة . فاثان مثلاً هو جذر اربعة المائى او للمربع او الثاني لان $٢ \times ٢ = ٤$ وجذر ثمانية الكعبى او الثالث لان $٢ \times ٢ \times ٢ = ٨$ وجذر اربعة المائى لان $٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ١٦$ وقس على ذلك

٧٤ يُدَلُّ على القوت برقم صغير عن يسار الكمية مرتفع عنها قليلاً. مثاله
 ت^١ و ب^٢ وس^٣ ويقال لهذا الرقم دليل القوة. وإن لم يكن للكمية دليل يُقدَّر لها واحدٌ
 دليلاً. فان ت^١ = ت اي قوة ت الاولى. واذا انحصرت كمية ووضِع لها دليلٌ مثل
 (ك + ب - س)^٢ اوت^٣ + م + ن^٤ فيراد ان الكمية كلها يجب ترقيتها الى القوة
 المدلول عليها. وقد يكون الدليل حرفاً متى كانت القوة مجهولةً مثل ب^١ اي القوة
 النونية من ب

تنبيه. يجب ان يميز بين المسميات والدلائل. فان ت^٤ مثلاً يراد بها ت + ت
 + ت + ت ولكن ت^٤ يراد بها ت × ت × ت × ت

٧٥ اذا نظرنا الى سلسلة قوت نرى ان الادنى يحدث من قسمة الاعلى على
 الكمية الاصلية. مثاله ت^١ + ت = ت^٢ وت^٢ + ت = ت^٣ وت^٣ + ت = ت^٤ وت^٤ + ت = ت^٥
 + ت = ت وت + ت = ت^١ و ا + ا = ت^١ و $\frac{1}{ت} + \frac{1}{ت} = \frac{1}{ت}$ و $\frac{1}{ت} + \frac{1}{ت} = \frac{1}{ت}$
 ت = $\frac{1}{ت}$ وهلمَّ جزءاً. فالواقعة بعد الواحد هي مكفوءة التي قبل الواحد (١٢)
 ونسى قوت مكفوءة. وهكذا في الكميات المركبة. مثاله (ت + ب)^٢ (ت + ب)^٣
 (ت + ب) ا ت + ب $\frac{1}{ت + ب}$ $\frac{1}{ت + ب}$ $\frac{1}{ت + ب}$ الى اخره. ولاجل سهولة
 الكتابة يُدَلُّ على القوت المكفوءة بدلائل سلبية. مثاله $\frac{1}{ت}$ اوت^١ = ت^{-١}
 وت^٢ = $\frac{1}{ت}$ وت^{-٢} = $\frac{1}{ت}$ فتكون السلسلة ت^٤ ت^٣ ت^٢ ت^١ ت^{-١} ت^{-٢}
 ت^{-٣} ت^{-٤} الى اخره. اما جميع قوت الواحد فهي واحد لان ١ × ١ × ١ الى اخره
 ١ =

نبذة في الترقيّة

٧٦ اذا اردت ترقيّة كمية الى قوة مفروضة فاضربها في ذاتها مراراً تماثل
 الاحاد في دليل القوة المفروضة. فقوة ت^٤ الرابعة هي ت × ت × ت × ت = ت^٤
 وقوة س^٦ السادسة = س س س س س س = س^٦ وهكذا في الكمية المضلعة مثل ب س
 فان مربعها اي (ب س)^٢ = ب^٢ س^٢ لان ب س × ب س = ب^٢ س^٢ = ب^٢ س^٢
 فنرى في كل كمية مضلعة او ذات اجزاء ان قوة حاصل الاجزاء تعادل حاصل

قواتها. وهكذا (ب م ك) = ^٢ب ^٢م ^٢ك و (د س ي) = دن سن ين وقوة دح
 ي الرابعة هي (د ح ي) ^٤او د^٤ ح^٤ ي^٤ وقوة ٤ ب الثالثة هي (٤ ب) ^٢او ٤^٢ ب^٢ او
 ٦٤ ب^٢ وقوة ٦ ت د النونية هي (٦ ت د) او ٦^٢ ت^٢ د^٢ وقوة ٢ م ٢ ^٢او ٢^٢ م^٢ ^٢او
 الثالثة هي (٢ م ٢) ^٢او ٢^٢ م^٢ ^٢او ٨^٢ ي^٢

٧٧ الكمية المركبة ابي المرتبطة اجزاؤها بعلامات المجمع او الطرح تنرفي
 بضرب اجزاها حسب قواعد الضرب. مثالها

$$(ت + ب) = ١ \text{ اي القوة الاولى}$$

$$\frac{ت + ب}{ت + ت + ب}$$

$$+ ت + ب + ب$$

$$(ت + ب) = ٢ \text{ = ت}^٢ + ٢ ت ب + ب^٢ \text{ = القوة الثانية}$$

$$\frac{ت + ب}{ت^٢ + ٢ ت ب + ب^٢}$$

$$+ ت^٢ ب + ٢ ت ب^٢ + ب^٣$$

$$(ت + ب) = ٣ \text{ = ت}^٣ + ٣ ت^٢ ب + ٣ ت ب^٢ + ب^٣ \text{ = القوة الثالثة}$$

$$+ ت + ب$$

$$\frac{ت^٣ + ٣ ت^٢ ب + ٣ ت ب^٢ + ب^٣}{ت^٣ + ٣ ت^٢ ب + ٣ ت ب^٢ + ب^٣}$$

$$+ ت^٤ + ٤ ت^٣ ب + ٦ ت^٢ ب^٢ + ٤ ت ب^٣ + ب^٤$$

$$(ت + ب) = ٤ \text{ = ت}^٤ + ٤ ت^٣ ب + ٦ ت^٢ ب^٢ + ٤ ت ب^٣ + ب^٤ \text{ = القوة الرابعة}$$

وهكذا الى اية قوة فُرِضَتْ

$$\text{مربع ت - ب هوت} - ٢ ت ب + ب^٢$$

$$\text{كعب ت + ١ هوت} + ٣ ت^٢ + ٣ ت ب + ١$$

$$\text{مربع ت + ب + ح هوت} + ٢ ت ب + ٢ ت ح + ٢ ب ح + ح^٢$$

$$\text{ما هو كعب ت + د} + ٣ ت + ٣ د$$

$$\text{ما هي القوة الرابعة من ب} + ٣$$

ما هي القوة الخامسة من ك + ا

ما هي القوة السادسة من ا - ب

٧٨ مربعات الكميات الثنائية والفضلية كثيرة الوقوع في الاعمال الجبرية فيجب على المتعلم ان يعرف كيفية ترتيبها معرفة جيدة. فاذا ربعنا ت + ب وت - ب يكون لنا

$$ت + ب \quad ت - ب$$

$$ت + ب \quad ت - ب$$

$$\frac{ت + ب}{ت - ب}$$

$$+ ت ب + ب^2 \quad - ت ب + ب^2$$

$$\frac{ت^2 + ٢ ت ب + ب^2}{ت^2 - ٢ ت ب + ب^2}$$

فترى في كليهما الجزء الاول والثالث مربعي ت وب والجزء الثاني مضاعف حاصل ت في ب فلنا من ذلك هذه القاعدة لترتيب هذه الكميات بدون الاستعانة بالضرب وهي

مربع كمية ثنائية كلا جزئيهما الجايبان يعدل مربع الجزء الاول مع مضاعف حاصل الجزئين مع مربع الجزء الثاني

مربع كمية فضلية يعدل مربع الجزء الاول الا مضاعف حاصل الجزئين مع مربع الجزء الثاني

$$\text{فمربع } ٢ ت + ب = ٤ ت^2 + ٤ ت ب + ب^2$$

$$\text{ومربع } ح + ا = ح^2 + ٢ ح ا + ا^2$$

$$\text{ومربع } ت ب + س د = ت^2 ب + ٢ ت ب س + س^2 د$$

$$\text{ومربع } ٦ ي + ٢ = ٢٦ ي^2 + ٢٦ ي + ٩$$

$$\text{ومربع } ٢ د - ح = ٩ د^2 - ٤ د ح + ح^2$$

$$\text{ومربع } ت - ا = ت^2 - ٢ ت ا + ا^2$$

اما كيفية ترقية هذه الكميات الى القوت العليا فسياتي الكلام عليها في محله

٧٩ يكفي احياناً ان يدل على الترقية بدليل القوة المفروضة . فيقال في مربع
 ت + ب (ت + ب) وفي القوة النونية من ب س + ٨ + ك (ب س + ٨ +
 + ك) او ب س + ٨ + ك^٢ بحصر الكمية بين قوسين او تحت خط كما رايت .
 وان كان الجذر مضلعاً مُحَصَّر الضلعان معاً او كل ضلع على حدته حسبما يُسْتَحْسَن .
 فيقال في مربع ت + ب × س + د

(ت + ب) × (س + د) او ت + ب × س + د لان حاصل مربعي كمتين
 يعدل مربع حاصلهما (٧٦) ومتى انبسطت كمية محصورة برفع عنها القوسان او الخط .
 فان (ت + ب) اذا انبسطت نصيرت^٢ + ٢ ت ب + ب^٢

٨٠ اذا كان الجذر ايجابياً تكون القوات جميعها ايجابية واذا كان سلبياً تكون
 القوات الشفعية ايجابية والوترية سلبية كما يتضح مما قيل سابقاً في فصل الضرب
 (٢٢) مثاله

ت +	القوة الثانية من - ت هي
- ت	القوة الثالثة
+ ت	الرابعة
- ت الى اخره	الخامسة

اي كل قوة وترية لها علامة جذرها وكل قوة شفعية هي ايجابية ان
 كان جذرها سلبياً او ايجابياً

٨١ كل قوة تترقى الى قوة اعلى بضرب دليلها في دليل القوة المفروضة
 مثاله كعب ت^٣ = ت^٣ × ت^٢ = ت^٥ لان ت^٢ = ت × ت وكعب ت^٣ هو ت^٥ ت × ت
 ت × ت = ت^٥ ت ت ت ت ت = ت^٥ ت ت ت ت ت = ت^٥ ت ت ت ت ت = ت^٥ ت ت ت ت ت
 الثالثة من ت^٥

القوة الرابعة من ت^٢ = ت^٢ × ت^٢ = ت^٤ ت^٢ = ت^٦ ب
 القوة الثالثة من ت^٤ = ت^٤ × ت^٢ = ت^٦ ك
 القوة الرابعة من ت^٢ × ت^٢ = ت^٤ د = ت^٦ ٨١ ك د

القوة الجامسة من ${}^2(ب + ت) = {}^1(ب + ت)$

القوة النونية من ${}^2ت = {}^1ت$

القوة النونية من ${}^2(ك - ي) = {}^1(ك - ي)$

${}^2(ب + ت) = {}^1(ب + ت) + {}^2ت + {}^1ت$

${}^2ت \times {}^1ب = {}^1ت \times {}^2ب$

${}^2(ب + ت) = {}^1(ب + ت) + {}^2ت + {}^1ت$

وهكذا في القوات التي دلائلها سلبية. مثالة القوة الثالثة من ${}^2ت = {}^1ت \times {}^2$

القوة الرابعة من ${}^2ت = {}^1ت + {}^2ب = {}^1ت + {}^2ب$

كعب ${}^2ك = {}^1ك + {}^2ي = {}^1ك + {}^2ي$

مربع ${}^2ب = {}^1ب + {}^2ك = {}^1ب + {}^2ك$

القوة النونية من ${}^2ك = {}^1ك + {}^2ن = {}^1ك + {}^2ن$

٨٢ متى كانت العلامة المتقدمة على نفس الكمية سلبية يجب ان تجعل ايجابية
كلما صار الدليل شفعاً حسباً تقدم (٨٠) مثالة مربع $-ت = +ت$ وكعب $-ت = +ت$
ومربع $-ك = +ك$

والقوة النونية من $-ت = +ت$ اي $+ت = -ت$ متى كانت ن دالة على عدد
شفع و $-ت = +ت$ متى دلت على عدد وتر

٨٣ الكسر يترقى بترقية صورته ومخرجه معاً. فمربع $\frac{ت}{ب} = \frac{ت}{ب}$ لان
 $\frac{ت}{ب} \times \frac{ت}{ب} = \frac{ت ت}{ب ب} = \frac{ت}{ب}$

القوة الثانية من $\frac{1}{ت} = \frac{1}{ت}$ وقوته الثالثة $= \frac{1}{ت}$ وقوته النونية $= \frac{1}{ت}$

كعب $\frac{٢ك}{٢ي} = \frac{٢ك}{٢ي}$

القوة النونية من $\frac{ك}{٢ي} = \frac{ك}{٢ي}$

$$\frac{ت^٢ \times (م + د) \times (١ + ك)}{٢(١ + ك)} = \frac{(م + د) \times ت^٢}{٢(١ + ك)} \text{ مربع}$$

$$\frac{ت^٢ - ت^١}{٢ - ك} = \frac{ت^١ - ت^٠}{٢ - ك} \text{ كعب}$$

ومن امثلة الكميات الفأية التي احد جزئها كسرٌ هذ

$$\frac{\frac{١}{٣} - ك}{\frac{١}{٣} - ك} = \frac{\frac{١}{٣} + ك}{\frac{١}{٣} + ك}$$

$$\frac{\frac{١}{٣} - ك}{\frac{١}{٣} - ك} = \frac{\frac{١}{٣} + ك}{\frac{١}{٣} + ك}$$

$$\frac{\frac{١}{٤} + ك}{\frac{١}{٤} + ك} = \frac{\frac{١}{٤} + ك}{\frac{١}{٤} + ك}$$

$$\frac{٤}{٩} + \frac{ت}{٣} + ت^٢ = \frac{٢}{٣} + ت \text{ مربع}$$

$$\frac{٢}{٤} + ك + ب = \frac{٢}{٣} + ك \text{ مربع}$$

$$\frac{٢}{٣} + \frac{٢ ب ك}{٣} - ك = \frac{٢}{٣} - ك \text{ مربع}$$

١٤ قد علت آنفًا (٦١) ان المسمى الكسري يمكن نقله من صورة كسر الى مخرجه او عكسه. واذا راجعنا ما قيل في القوت المكفوة (٧٥) نرى ان اي ضلع كان يمكن نقله من الصورة الى المخرج او عكسه اذا تغيرت علامة دليله. مثالة في $\frac{ت - ك}{٢ - ك}$ يمكن نقل الكاف الى المخرج بدون تغيير قيمة الكسر اذا جعلت علامة

دليلها ايجابية. لأن $\frac{ت - ك}{٢ - ك} = \frac{ت}{٢ - ك} \times \frac{١}{٢ - ك} = \frac{ت}{٢ - ك} \times \frac{١}{٢ - ك}$ وفي

$\frac{ت}{٢ - ك}$ ننقل الياء الى الصورة لأن

$$\frac{ت}{٢ - ك} = \frac{ت}{٢ - ك} \times \frac{١}{١} = \frac{ت}{٢ - ك} \times \frac{١}{٢ - ك} = \frac{ت}{٢ - ك} \times \frac{١}{٢ - ك} = \frac{ت}{٢ - ك} \times \frac{١}{٢ - ك}$$

وهكذا $\frac{ت - ك}{٢ - ك} = \frac{ت}{٢ - ك} - \frac{ك}{٢ - ك}$

وهكذا اذا كانت العلامة في الصورة ايجابية وفي المخرج سلبية مثاله $\frac{٢ك}{ب} =$

$$\frac{٢ك}{ب} = \frac{٢ك}{ب} \frac{١}{١} = \frac{٢ك}{ب} \frac{١}{١} = \frac{٢ك}{ب} \frac{١}{١} = \frac{٢ك}{ب}$$

$$\frac{٢ك}{ب} = \frac{٢ك}{ب}$$

فاذا يمكن ان يُرْفَع مخرج كسرٍ بالكلمة او ان نجعل الصورة واحداً بدون تغيير

قيمة العبارة. مثاله $\frac{١}{ب} = \frac{١}{ب} \frac{١}{١} = \frac{١}{ب}$ اوت $\frac{١}{ب}$

$$\frac{٢ك}{ب} = \frac{١}{ب} \frac{٢ك}{١} = \frac{٢ك}{ب}$$

$$\frac{٢ك}{ب} = \frac{١}{ب} \frac{٢ك}{١} = \frac{٢ك}{ب}$$

نبذة في جمع القوات وطرحها

١٥ تجمع القوات بكتابتها متوالية مع علاماتها. فجمع ت و ب هوت +
ب وجمع ت - ب و ح - ذ هوت - ب + ح - ذ

واذا كانت الاحرف والقوات متشابهة تجمع مسمياتها او تُطْرَح حسب قواعد

الجمع (١٦ و ١٧) مثاله

مجمع ٢ ت و ٢ ت هوت

$$\frac{٢ ت}{ب} + \frac{٢ ت}{ب} = \frac{٤ ت}{ب}$$

$$\frac{٢ ت}{ب} - \frac{٢ ت}{ب} = \frac{٠ ت}{ب}$$

$$\frac{٢ ت}{ب} + \frac{٢ ت}{ب} = \frac{٤ ت}{ب}$$

$$\frac{٢ ت}{ب} + \frac{٢ ت}{ب} = \frac{٤ ت}{ب}$$

$$\frac{٢ ت}{ب} - \frac{٢ ت}{ب} = \frac{٠ ت}{ب}$$

$$\frac{٢ ت}{ب} + \frac{٢ ت}{ب} = \frac{٤ ت}{ب}$$

ولكن الاحرف الغير المتشابهة او القوات الغير المتشابهة من حرف واحد لا تجمع الا بكتابتها متوالية مع علاماتها كما تقدم. فجمع ت و ت هوت + ت

ومجموع ت^١ ب^١ و ٢ ت^١ ب^١ هو ت^١ ب^١ + ٢ ت^١ ب^١

١٦ طرح القوت كجمعها غير انه يجب تبديل علامة المطروح من + الى - او عكسه حسبما تقدم في باب الطرح. مثاله

من	٢ ت ^١	- ٢ ب ^١	٢ ح ^١ ب ^١
اطرح	- ٦ ت ^١	٤ ب ^١	٤ ح ^١ ب ^١
الفضلة	٨ ت ^١		- ح ^١ ب ^١

من	ت ^١ ب ^١	٥ (ت - ح)
اطرح	ت ^١ ب ^١	٢ (ت - ح)
		٢ (ت - ح)

نبذة في ضرب القوات

١٧ نضرب القوات بكتابتها متوالية حسبما تقدم في فصل الضرب. فمخاض

ت^١ في ب^١ هو ت^١ ب^١ وك^١ × ت^١ = ك^١ ت^١ و ٢ ت^١ ي^١ × - ٢ ك^١ = - ٦ ت^١ ي^١ ك^١

١٨ قوات الجذر الواحد نضرب بجمع دلالتها. مثاله

ت^١ × ت^١ = ت^١ ت^١ لان ت^١ ت^١ × ت^١ ت^١ = ت^١ ت^١ ت^١ ت^١ = ت^١ ت^١ ت^١ ت^١ وهكذا
 ت^١ × ت^١ = ت^١ ت^١ وك^١ × ك^١ = ك^١ ك^١ وك^١ × ت^١ = ت^١ ك^١ و ٤ ت^١ × ٢ ت^١ = ٨ ت^١ و ٢ ك^١ × ٢ ك^١ = ٤ ك^١ و ٦ ك^١ × ٢ ك^١ = ١٢ ك^١ و ٦ ك^١ × ٢ ت^١ = ١٢ ت^١ ك^١ و ٢ ت^١ × ٢ ت^١ = ٤ ت^١ و (ب + ح - ي) × (ب + ح - ي) = (ب + ح - ي)^٢

اضرب ك^١ + ك^١ ي^١ + ك^١ ي^١ + ي^١ × ك^١ - ي^١

الجواب ك^١ - ي^١

اضرب ٤ ك^١ ي^١ + ٢ ك^١ ي^١ - ١ × ٢ ك^١ - ك^١

اضرب ك^١ + ك^١ - ٥ × ٢ ك^١ + ك^١ + ١

وهكذا ان كانت الدلائل سلبية. مثاله

ت^١ × ت^١ = ت^١ ت^١ و ي^١ × ي^١ = ي^١ ي^١ و - ت^١ × - ت^١ = ت^١ ت^١ و - ت^١ × ي^١ = - ت^١ ي^١

$$\text{وت}^{\text{ء}} \times \text{ت}^{\text{ء}} = \text{ت}^{\text{ن}} \times \text{ت}^{\text{ء}} = \text{ت}^{\text{م}} - \text{ن}^{\text{ء}} \quad \text{وي}^{\text{ء}} \times \text{ي}^{\text{ء}} = \text{ي}^{\text{ء}} = \text{ي}^{\text{ء}} = 1$$

٨٩ اذا ضربت + ب في ث - ب يكون الحاصل ت - ب ولنا من

ذلك قضية عمومية وهي

ان حاصل مجتمع كيتين في فضلتهما يعدل فضلا مربعيها

$$(\text{ت} - \text{ي}) \times (\text{ت} + \text{ي}) = \text{ت}^{\text{ء}} - \text{ي}^{\text{ء}}$$

$$(\text{ت} - \text{ي}^{\text{ء}}) \times (\text{ت}^{\text{ء}} + \text{ي}^{\text{ء}}) = \text{ت}^{\text{ء}} - \text{ي}^{\text{ء}}$$

$$(\text{ت} - \text{ت}^{\text{ء}}) \times (\text{ت}^{\text{ء}} + \text{ت}^{\text{ء}}) = \text{ت}^{\text{ء}} - \text{ت}^{\text{ء}}$$

نبتة في قسمة القوات

٩٠ نقسم القوات مثل ما سواها من الكميات. اي بان يخرج من المقسوم

كمية تماثل المقسوم عليه او بكتابتها على هيئة كسرٍ درجي. مثالة

$$\text{ت}^{\text{ء}} \text{ب} \div \text{ت}^{\text{ء}} \text{ب} = \text{ت}^{\text{ء}} \text{ب} \text{ او } \frac{\text{ت}^{\text{ء}} \text{ب}}{\text{ت}^{\text{ء}} \text{ب}}$$

$$\frac{\text{ت}^{\text{ء}} \text{ب} + \text{ت}^{\text{ء}} \text{ت}^{\text{ء}} \text{ي}^{\text{ء}}}{\text{ت}^{\text{ء}} \text{ب}} = \text{ت}^{\text{ء}} \text{ب} + \text{ت}^{\text{ء}} \text{ي}^{\text{ء}}$$

$$\frac{12 \text{ ب} \text{ ك} \text{ ن}}{2 \text{ ب}} = 6 \text{ ك} \text{ ن}$$

$$\frac{9 \text{ ت}^{\text{ء}} \text{ ي}^{\text{ء}}}{2 \text{ ت}^{\text{ء}}} = \frac{9}{2} \text{ ت}^{\text{ء}} \text{ ي}^{\text{ء}}$$

$$\frac{\text{اقسم} \text{ د} \times (\text{ت} - \text{ح} + \text{ي})^{\text{ء}}}{\text{على} \text{ (ت} - \text{ح} + \text{ي})^{\text{ء}}} = \text{الخارج} \text{ د}$$

٩١ القسمة عكس الضرب. وعلى ذلك نقسم قوات جذرٍ واحدٍ بطرح دليل

المقسوم عليه من دليل المقسوم. مثالة

$$\text{ت}^{\text{ء}} \div \text{ت}^{\text{ء}} = \text{ت}^{\text{ء}} \text{ لان } \frac{\text{ت}^{\text{ء}}}{\text{ت}^{\text{ء}}} = \frac{\text{ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}}}{\text{ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}}} = \text{ت}^{\text{ء}} \text{ ت}^{\text{ء}} = \text{ت}^{\text{ء}} \text{ و} \text{ت}^{\text{ء}} +$$

$$\text{ت}^{\text{ن}} = \text{ت}^{\text{م}} - \text{ن}^{\text{ء}} \quad \text{وي}^{\text{ء}} + \text{ي}^{\text{ء}} = \text{ي}^{\text{ء}} \quad \text{وت}^{\text{ن}} + \text{ت}^{\text{م}} = \text{ت}^{\text{ن}} + \text{ت}^{\text{م}} - 1 + 1 = \text{ت}^{\text{ن}} \text{ وك} \text{ن} +$$

$$\text{ك} \text{ ن} = 1$$

اقسم ٢ على ١	٦	٨	$٢+٣$	١٢
المخرج ١	٦	٤	٢	٤
	٢	٢	٢	٢

وهكذا ان كانت الدلائل سليمة. مثالة

$$\begin{aligned}
 & ٢-٣+٤=٢-٣+٤ \quad \text{و-ك}^٢+٠-ك^٢=٢-ك^٢-ك^٢ \\
 & ٦+٧+٨=٢+٣+٤ \quad \text{ب}^٢+٣+٤=٢+٣+٤ \quad \text{ب}^٢+٣+٤=٢+٣+٤ \\
 & ٢+٣=٣+٢ \quad \text{و(ت}^٢-٣+٤) + (٢+٣) = ٢+٣+٤ \\
 & (ب+ك) = (ب+ك) + ١-٢
 \end{aligned}$$

امثلة

الجواب $\frac{٥}{٣}$	اختزل $\frac{٥}{٣}$
الجواب $\frac{٢}{١}$	اختزل $\frac{٦}{٣}$
الجواب $\frac{٣+٤}{٥}$	اختزل $\frac{٣+٤}{٥}$
اختزل $\frac{٨-١٢+٦}{٦+٤}$	

فبالقسمة على ٢ تصير $\frac{٤-٦+٣}{٢+٣}$

حوّل $\frac{٢}{٢}$ ون $\frac{٢}{٢}$ الى مخرج مشترك

الصورة الاولى $٢ \times ٢ = ٤ = ٢-٣$

الصورة الثانية $٢ \times ٢ = ٤ = ٢-٣$

المخرج المشترك $٢ \times ٢ = ٤ = ٢-٣$

فيكون الجواب $\frac{٢}{٢}$ ون $\frac{٢}{٢}$

حوّل $\frac{٢}{٢}$ ون $\frac{٢}{٢}$ الى مخرج مشترك

ك^١ و م^١ و (د + م) و (س × ت - م) وهكذا في الدلائل السليبه . مثاله
 ت^١ = ت^١ - ت^١ و ت^١ = ت^١ - ت^١ و ت^١ = ت^١ - ت^١ وقس على ذلك . اما جذور الواحد
 فهي واحد ابدأ كما راينا في قوائمه (٥٧)

٩٣ اذا رقبنا جذراً الى قوة مفروضة يكون لنا قوة جذر او جذر قوة . مثاله
 ت^١ × ت^١ × ت^١ = ت^١ × ت^١ + ت^١ + ت^١ = ت^١ ابي مكعب ت^١ ابي القوة الثالثة
 من الجذر الثاني من ت وهكذا ك^١ = القوة الخامسة من جذر ك السادس او الجذر
 السادس من قوة ك الخامسة . وهكذا س^١ = القوة الميمية من جذر س النوني او
 الجذر النوني من قوة س الميمية . فاذا قوة جذر وجذر قوة هـ سياتان

٩٤ جذور حرف واحد تُضرب مثل القوات بجمع ذلائلها . مثاله ت^١ × ت^١
 ت^١ = ت^١ + ت^١ + ت^١ حسبما تقدم (٨٨)

٩٥ اذا جعل لكمية دليل مخرجه وصورته متساويان لا تتغير قيمتها . مثاله
 ت = ت^١ × ت^١ × ت^١ = ت^١ × ت^١ و ك^١ = ك^١ ولا تتغير القيمة اذا ابدل دليل
 كسري باخر بعادله . مثاله ت^١ = ت^١ = ت^١ الى اخره . وهكذا ك^١ = ك^١
 ك^١ = ت^١ الى اخره

٩٦ الدليل الكسري يمكن تحويله الى كسر عشري . مثاله ك^١ = ك^١ و ت^١
 ت^١ = ت^١ و ت^١ = ت^١ و ت^١ = ت^١ و ت^١ = ت^١ و ت^١ = ت^١ و ت^١ = ت^١ ولكن
 احياناً يكون الكسر العشري تقريباً فقط . مثاله ت^١ = ت^١ تقريباً و ت^١ = ت^١
 اكثر تقريباً . وهكذا تعدد منازل الكسر العشري حتى تعادل قيمته قيمة الكسر
 الدارجي الا بما لا يعتد به . مثاله ت^١ = ت^١ و ك^١ = ك^١

وهذه الدلائل العشرية يقال لها لغرثات او انساب . وكثيراً ما تُعتبر في
 الاعمال التعليمية كما ستعلم في غير هذا الكتاب

٩٧ يُدلّ ايضاً على قوة جذر او جذر قوة بعلامة الجذر مع دليله فوق الكمية
 مع دليل القوة او بمصر الكمية مع دليل القوة بين قوسين او تحت خط . ويكتب

$$\begin{aligned} & \text{دليل الجذر خارج القوسين او فوق الخط. مثالة } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \\ & (\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \\ & \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

نبذة في التجذير

٩٨ اذا اردت ان نجد جذر كمية فاقسم دليلها على دليل الجذر المطلوب او

$$\text{اجعل علامة الجذر مع دليله فوق الكمية. مثالة جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ هو } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ ب الخامس } = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ النوني } = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ الكعي } = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ الرابع } = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ الكعي } = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جذر } \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ النوني } = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

٩٩ حسب القاعدة السابقة نجد الجذر الكعي للجذر المائي بقسمة ٣ على ٣

وذلك مثل الضرب في $\frac{1}{3}$ حسبما تقدم في فصل ضرب الكسر (٥٤) لان $\frac{1}{3} \div \frac{1}{3} = 1$

$$\frac{1}{3} \div \frac{1}{3} = 1 \text{ وهكذا } \frac{1}{3} \div \frac{1}{3} = 1 \text{ فاذا الجذر المهي}$$

للجذر النوني من $\sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ اي $\sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ فقد

نحوّل الدليلان الى واحد

وبالعكس يمكن تحويل الدليل الواحد الى اثنين. مثالة $\sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

كـ اي الجذر الثامن يعدل الجذر الثاني من الجذر الرابع. وهكذا + ب | ان

$$(ت + ب) \sqrt[8]{\frac{1}{ن}} = \sqrt[8]{\frac{1}{ن}} \times (ت + ب) = \sqrt[8]{\frac{1}{ن}}$$

١٠٠ جذر حاصل عدة كميات يعدل حاصل جذورها. مثاله ١٠٠ ب =

$$١٠٠ \times ١٠٠ ب = ١٠٠ ب \times ١٠٠ ب = ١٠٠ ب$$
 (٧٢) و (ت ب) = ت ب = ت ب = ت ب
 تعددت اضلاع كمية يمكن تجذير الجميع دفعة واحدة او تجذير كل ضلع بمفرده مثاله
 جذر كى الكعبي = (ك ي) ك ي او ك ي ك ي
 جذر ٢ ي الخامس = (٢ ي) ٢ ي او ٢ ي ٢ ي

جذرت ب ح السادس = ١٠٠ ب ح او ١٠٠ ب ح او ١٠٠ ب ح
 جذر ٨ ب الكعبي = (٨ ب) ٢ ب او ٢ ب ٢ ب
 جذر ك نى النوني = (ك ن ي) ن او ك ي ن

١٠١ جذر الكسر يعدل جذر الصورة على جذر المخرج. مثاله الجذر المالى

$$\frac{١٠٠ ك}{١٠٠ ب} = \frac{١٠٠ ك}{١٠٠ ب} \times \frac{١٠٠ ب}{١٠٠ ب} = \frac{١٠٠ ك}{١٠٠ ب}$$

$$\frac{١٠٠ ك}{١٠٠ ب} = \frac{١٠٠ ك}{١٠٠ ب} \times \frac{١٠٠ ب}{١٠٠ ب} = \frac{١٠٠ ك}{١٠٠ ب}$$

١٠٢ لكي نعرف العلامة التي نتقدم على جذر مالنا هذه القواعد الثلاث.

الاولى كل جذر وتري لكمية ماله علامة الكمية ذاتها

الثانية كل جذر شفعي لكمية ايجابية ملتبس

الثالثة الجذر الشفعي لكمية سلبية مستحيل

اما الاولى فواضحة ما تقدم (٨٠) واما الثانية فلأن الكمية الايجابية تحصل من

+ في + او من - x - على حد سوى. ف جذرت ٢ هو + ت او - ت فيوضع للجذر
 علامتان للدلالة على الالتباس هكذا ١٠٠ ب و ١٠٠ ك ويرفع هذا الالتباس متى

حصلت القوة من ضرب كميات معروفة علاماتها. واما الثالثة فلانه لا يمكن استخراج جذرٍ شفعيٍ لقيمةٍ سلبية. فـجذر- ت ليس هو + ت ولا - ت لان + ت × + ت = + ت و - ت × - ت = + ت فسمي الجذر الشفعي لقيمةٍ سلبيةٍ كميةً وهميةً او محالية. ولكن قد تستعمل هذه الكميات الوهمية في الاعمال الجبرية لانها ببعض المعاملات تصير ممكنة. مثالة $\sqrt{-6} \times \sqrt{-6} = -6$ ت وهي ممكنة. ويجب هنا ان يُعتبر في الجذور الوهمية ان علامة السلب واقعة تحت علامة الجذر كما مثلنا. ولكن $\sqrt{-6} \times \sqrt{-6} = -6$ ت ومن فوايد هذه الكميات الوهمية ايضاً الدلالة على فساد مسئلة. فلو قيل اقسام ١٤ الى قسمين حاصلها ٦٠ قيل ليكن احدهما ك والاخر ١٤ - ك فلناك $\times (١٤ - ك) = ٦٠$ اي ١٤ ك - ك^٢ = ٦٠ وتحويل هذه المعادلة حسب القواعد الاتية لنا ك = $\frac{7 \pm \sqrt{11}}{11}$ وهذه كمية وهمية غير ممكنة. فالمسئلة فاسدة اي لا يمكن انقسام ١٤ الى قسمين حاصلها ٦٠ وقس على ذلك

١٠٣ كيفية تجدير الكميات المركبة سيأتي الكلام عليها في بعض الفصول الاتية. واما هنا فلاننظر الا الى كيفية استعمال الجذر المالمالي لمربعات الكميات الثنائية والفضلية وهذه المربعات لا يكون لها اكثر من ثلاثة اجزاء كما راينا (٧٨) مثالها ت^٢ + ت ب + ب^٢ وفي الفضلية ت^٢ - ت ب + ب^٢ فحيثما راينا كمية مثل هذه جزءان منها قوتان تامتان والاخر حاصل جذري هاتين القوتين علنا انها مربع كمية ثنائية او فضلية. ولنا لاستعلام جذرها هذه القاعة

خذ جذر الجزء الاول والثالث واربطها بعلامة الجزء الاوسط

فلو قيل ما هو جذر ك^٢ + ٢ ك + ١ لقبيل جذر الجزء الاول اي ك^٢ = ك وجذر الجزء الثالث اي واحد = ١ وعلامة الجزء الاوسط هي + فاذا الجذر ك + ١

$$\text{جذر ك}^{\text{٢}} - ٢ ك + ١ = \text{ك} - ١$$

$$\text{جذر ت}^{\text{٢}} + ت + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + ت$$

$$\text{جذر ت}^{\text{٢}} + ت + \frac{4}{9} = \frac{2}{3} + ت$$

$$\sqrt[3]{\frac{b}{t}} + t = \sqrt[4]{\frac{b}{t}} + t + b$$

$$\sqrt[3]{\frac{b}{s}} + t = \sqrt[4]{\frac{b}{s}} + \frac{t^2}{s} + \frac{t}{s}$$

١٠٤ كل جذر لا يمكن ان يُبدل عليه تمامًا بالاعداد يقال له اصم. مثاله $\sqrt[3]{6}$ فهذا لا يمكن الوصول اليه تمامًا وهو بالكسر العشري ١٢٥٦١٤٢١٤١ تقريبًا. وكل جذر ليس اصم فهو منطوق ولكن في ما يأتي تُطلق هذه اللفظة على كل كمية ليس لها علامة الجذر ولا دليل كسري

نتيجة في تحويل الجذور

١٠٥ اولاً اذا اردت تحويل كمية منطقة الى هيئة كمية جذرية فرقها الى قوة من اسم الجذر المفروض ثم اجعل لها علامة الجذر مع دليله.

فلو قبل حوّل ت الى هيئة الجذر النوني لتقبل قوتها النونية = t^n ثم انها بوضع علامة الجذر والدليل نصير t^n فنحوّل الى هيئة كمية جذرية بدون تغيير قيمتها لان $t^n = t^n = t^n$

حوّل ٤ الى هيئة الجذر الكعبي الجواب $\sqrt[3]{64}$ او $\sqrt[3]{(64)}$

حوّل ٣ ت الى هيئة الجذر الرابع الجواب $\sqrt[4]{٨١ ت}$

حوّل $\sqrt[3]{t}$ الى هيئة الجذر المائى الجواب $\sqrt[100]{t^3}$

حوّل $٣ \times ت - ك$ الى هيئة الجذر الكعبي الجواب $\sqrt[3]{٢٧ ت^٣ - (ت - ك)^٣}$

حوّل t^2 الى هيئة الجذر الكعبي الجواب $\sqrt[3]{t^6}$

حوّل t^2 الى هيئة الجذر النوني

١٠٦ ثانياً لكي نُحوّل كميات دلائلها مختلفة الى دلائل مشتركة بدون تغيير

القيمة

(١) حوّل الدلائل الى مخرج مشترك

(٢) رَقِّ كُلِّ كَمِيَّةٍ إِلَى الْقُوَّةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِصُورَةٍ دَلِيلِهَا بَعْدَ

تَحْوِيلِهِ

(٢) اجْعَلِ لِلْجَمِيعِ عِلَامَةَ الْجِذْرِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْمَخْرَجِ الْمَشْتَرِكِ

مِثَالُهُ لَوْ قِيلَ حَوْلَ تَبَّ بَ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ لَقِيلَ ٤ و١ بِالْتَحْوِيلِ إِلَى مَخْرَجٍ مَشْتَرِكٍ = ٢٢ و٢٢ ثُمَّ بِتَرْقِيَةِ تَ إِلَى الْقُوَّةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِصُورَةِ الدَّلِيلِ نَصِيرِ تَ وَهَكَذَا بَ نَصِيرِ بَ وَالْجِذْرُ دَلِيلُهُ ٢٢ فَلِنَا تَ ٢٢ وَبَ ٢٢ وَالْقِيَمَةُ لَمْ تُتَغَيَّرْ لِأَنَّ تَ ٢٢ = تَ ٢٢ = تَ ٢٢ وَهَكَذَا بَ ٢٢ = بَ ٢٢ = بَ ٢٢

حَوْلَ تَ ٢٢ بَ كَ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ الْجَوَابُ تَ ٢٢ وَ (بَ ٤ كَ ٤) ٢٢

حَوْلَ تَ ٢٢ وَبَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ الْجَوَابُ تَ ٢٢ وَبَ ٢٢

حَوْلَ كَ ٢٢ وَبَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ الْجَوَابُ كَ ٢٢ وَبَ ٢٢

حَوْلَ ٢٢ وَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ الْجَوَابُ ٢٢ وَ ٢٢

حَوْلَ (تَ + بَ) ٢٢ وَ (كَ - يَ) ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ الْجَوَابُ (تَ + بَ) ٢٢

وَ (كَ - يَ) ٢٢

حَوْلَ تَ ٢٢ وَبَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ

حَوْلَ كَ ٢٢ وَهَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ مَشْتَرِكٍ

١٠٧ إِذَا أُرِيدَ تَحْوِيلُ كَمِيَّةٍ إِلَى ذَاتِ دَلِيلٍ مَفْرُوضٍ فَاقْسِمِ دَلِيلِهَا

عَلَى الدَّلِيلِ الْمَفْرُوضِ وَ اَكْتُبِ الْخَارِجَ عَنِ يَسَارِ الْكَمِيَّةِ ثُمَّ اجْعَلِ فَوْقَ

الْكُلِّ الدَّلِيلَ الْمَفْرُوضَ

فَلَوْ قِيلَ حَوْلَ تَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ لَقِيلَ ٢٢ + ٢٢ = ٢٢ فَلِنَا تَ ٢٢

حَوْلَ تَ ٢٢ وَكَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ ٢٢ الْجَوَابُ (تَ ٢٢) ٢٢ وَ (كَ ٢٢) ٢٢

حَوْلَ ٢٢ وَ ٢٢ إِلَى دَلِيلٍ ٢٢ الْجَوَابُ (٢٢) ٢٢ وَ (٢٢) ٢٢

١٠٨ ثالثاً اذا اردت ان تخرج بعض كمية من تحت علامة الجذر فحلّ الكمية الى ضلعين احدهما قوة تامة من اسم الجذر وخذ جذر هذا الضلع واكتبه قدام الضلع الاخر وعلامة الجذر بينهما. وهذه القاعدة مبنية على ما تقدم (١٠٠) من ان جذر حاصل كميتين يعدل حاصل جذريهما. وان لم يمكن حل الكمية الى ضلعين احدهما قوة تامة من اسم الجذر فلا يمكن اخراج شي منها من تحت علامة الجذر.

فلو قيل اخرج بعض $\sqrt{6}$ من تحت علامة الجذر ل قيل $\sqrt{8}$ ينحل الى ضلعين $\sqrt{4}$ و $\sqrt{2}$ واحدهما قوة تامة من اسم الجذر اي $\sqrt{4} = 2$ مربع $\sqrt{2}$ خذ جذر $\sqrt{4} = 2$ فلنا $\sqrt{6} \sqrt{2}$ وعلى هذه الكيفية نتحول هذه الامثلة

$$\sqrt{6} \sqrt{2} = \sqrt{12}$$

$$\sqrt{6} \sqrt{3} = \sqrt{18}$$

$$\sqrt{6} \sqrt{4} = \sqrt{24}$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{6} \sqrt{2} = \sqrt{12}$$

$$\sqrt{6} \sqrt{3} = \sqrt{18}$$

$$\sqrt{6} \sqrt{4} = \sqrt{24}$$

$$= \sqrt{12}$$

$$= \sqrt{18}$$

١٠٩ ثم بعكس هذا العمل يدخل مسمى كمية جذرية تحت علامة الجذرابي يترقى الى قوة من اسم الجذر ثم يضرب في الاجزاء الواقعة تحت علامة الجذر

$$\sqrt{6} \sqrt{2} = \sqrt{12}$$

$$\sqrt{6} \sqrt{3} = \sqrt{18}$$

$$\sqrt[3]{(216)} = \sqrt[3]{(2^3 \cdot 3^3)} = 2 \cdot 3 = 6$$

$$\sqrt[3]{\left(\frac{2^3 \cdot 3^3}{2^3 + 3^3}\right)} = \sqrt[3]{\left(\frac{2^3 \cdot 3^3}{2^3 + 3^3}\right)}$$

نبذة في جمع الجذور وطرحها

١١٠ نجمع الجذور ونغيرها من الكميات بكتابتها متوالية مع علاماتها. فنجتمع

٢٠٠ و ٢٠١ هو ٢٠٢ + ٢٠٣ وان تشابهت الكميات والدلائل فاجمع المسميات واكتب الاجزاء الجذرية عن يسار المجتمع. مثالة

$$\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$$

$\sqrt[3]{200}$	$\sqrt[3]{(200)}$	$\sqrt[3]{201}$	
$\sqrt[3]{201}$	$\sqrt[3]{(201)}$	$\sqrt[3]{202}$	
$\sqrt[3]{202}$	$\sqrt[3]{(202)}$	$\sqrt[3]{203}$	المجتمع
$\sqrt[3]{203}$	$\sqrt[3]{(203)}$	$\sqrt[3]{204}$	

$\sqrt[3]{200}$	$\sqrt[3]{(200)}$	$\sqrt[3]{201}$
$\sqrt[3]{201}$	$\sqrt[3]{(201)}$	$\sqrt[3]{202}$
$\sqrt[3]{202}$	$\sqrt[3]{(202)}$	$\sqrt[3]{203}$
$\sqrt[3]{203}$	$\sqrt[3]{(203)}$	$\sqrt[3]{204}$

١١١ في بعض الاحيان يجب اخراج بعض الكميات من تحت علامة الجذر لكي نجمع. مثالة $\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$

$$\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$$

اجمع $\sqrt[3]{200}$ و $\sqrt[3]{201}$ الجواب $\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$

اجمع $\sqrt[3]{200}$ و $\sqrt[3]{201}$ الجواب $\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$

$\times \sqrt[3]{200}$

اجمع $\sqrt[3]{200}$ و $\sqrt[3]{201}$ الجواب $\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$

اجمع $\sqrt[3]{200}$ و $\sqrt[3]{201}$ الجواب $\sqrt[3]{200} + \sqrt[3]{201} = \sqrt[3]{200 + 201}$

ثم اذا اختلفت الكميات الجذرية او كانت دلائلها غير متشابهة فلا تجمع الا بكتابتها متواليه. مثاله مجتمع $\sqrt{2} + \sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{2}$ وجمع $\sqrt{2}$ و $\sqrt{2}$ = $\sqrt{2} + \sqrt{2}$

١١٢ اما طرح الجذور فهو مثل جمعها غير انه يجب تبديل علامة المطروح كما علت في فصل الطرح البسيط

$\sqrt[4]{3}$	$\sqrt[4]{2+ك}$	من $\sqrt{2}$ ي
$\sqrt[4]{5}$	$\sqrt[4]{2+ك}$	اطرح $\sqrt[4]{2}$ ي
$\sqrt[4]{8}$		الباقى $-\sqrt[4]{2}$ ي

$\frac{1}{2}$ - ت	من ت (ك + ي)
$\frac{1}{2}$ - ت	اطرح ب (ك + ي)
$\frac{1}{2}$ - ت	الباقى

من $\sqrt{5}$ اطرح $\sqrt{8}$ الجواب $\sqrt{5} - \sqrt{8}$

من $\sqrt[4]{2}$ ي اطرح $\sqrt[4]{2}$ ي الجواب (ب - ي) $\times \sqrt[4]{2}$ ي

من $\sqrt[4]{2}$ ك اطرح $\sqrt[4]{2}$ ك

نبذة في ضرب الجذور

١١٢ تُضرب الجذور مثل غيرها من الكميات بكتابتها متواليه بتوسط علامة الضرب او بدونها كما علت في فصل الضرب البسيط. مثاله $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$ و $\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2}$ و $\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2}$ و $\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2}$ و $\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{2}$

ت ^٢	<u>دك</u>	اضرب م ^٢ + ت ^٢
ك ^١	<u>ح ي</u>	في م ^٢ - ت ^٢
<u>ت^٢ ك^١</u>		الحاصل م ^٢ - ت ^٢ - ٢م ^١ - ٢ت ^١

ت ^١		اضرب (ت + ي) ن
ك ^١		في (ب + ح) ن
<u>ت^١ ك^١ م^١ ن</u>		الحاصل

اضرب م^١ ك^١ ب في م^١ ك^١ ب الجواب م^١ ك^١ ب = ٤ ك ب
 (ت^١ ي^١) × (ت^١ ي^١) = (ت^١ ي^١) = ٤ ت ي

١١٤ نُضْرَبُ جذور كمية واحدة بجمع دلائلها بعد تحويلها الى مخرج مشترك.

مثال ت^١ × ت^١ = ت^٢ = ت^١ × ت^١ = ت^١ × ت^١ = ت^١ + ت^١ = ت^١ ت^١ = ت^١ ن^١ ن^١ × ت^١ ن^١ ن^١ = ت^١ ن^١ ن^١ × ت^١ ن^١ ن^١ = ت^١ ن^١ ن^١ ن^١ ن^١

ت ^١ (ت + ب)	ت ^١ × ت ^١	اضرب ٢ ي ^١
<u>ت^١ (ت + ب)</u>	<u>ت^١</u>	في ي ^١
<u>ت^١ (ت + ب)</u>		الحاصل ٢ ي ^١

ك ^١		اضرب (ت - ي) ن
ك ^١		في (ت - ي) ن
<u>ك^١ ن</u>		الحاصل

ي^١ × ي^١ = ي^٢ = ي^١ - ي^١ = ي^١ - ي^١ = ي^١

ي^١ × ي^١ = ي^١ - ي^١ = ي^١ - ي^١ = ي^١ = ١

ك^١ - ك^١ × ك^١ = ك^١ - ك^١ + ن - ن = ك^١ - ك^١ = ك^١ = ١

١١٥ وهكذا نُضْرَبُ القوت في الجذور. مثال ت^١ × ت^١ = ت^٢ × ت^١

$$ت \frac{1}{3} = ت \frac{1}{4} \cdot ي \frac{1}{2} \times ي \frac{1}{3} = ي \frac{1}{6} + ي \frac{1}{3} = ي \frac{1}{2} . ك \frac{1}{3} \times ك \frac{1}{3} = ك \frac{1}{9} + ك \frac{1}{3} = ك \frac{4}{9}$$

ومنى حدث من هذا الضرب ان صورة الدليل تماثل مخرجه نصير الكمية

منطقة. مثاله $ت \frac{1}{3} \times ت \frac{1}{3} = ت \frac{1}{9} = ت \frac{1}{3} = ت \frac{1}{3}$

$$(ت + ب) \frac{1}{3} \times (ت + ب) \frac{1}{3} = (ت + ب) \frac{1}{9} = (ت + ب) \frac{1}{3} - (ت + ب) \frac{1}{3} = ت \frac{1}{3} \times ت \frac{1}{3} = ت \frac{1}{9}$$

١١٦ بعد تحويل الدلائل الى دليل مشترك ان كان للكيميات الجذرية مسميات منطقة فاجعل حاصل هذه المسميات قدام حاصل الاجزاء الجذرية. مثاله

ت ماب في س ماب فحاصل المسميات = ت س ثم اجعل هذا الحاصل

قدام حاصل الاجزاء الجذرية فتصيرت س ماب د $ت \frac{1}{3} \times ب \frac{1}{3} = د \frac{1}{9}$

$$(ك \frac{1}{3}) \times ب \frac{1}{3} = ت ب (ك \frac{1}{3}) \frac{1}{3}$$

	اضرب	ت (ب + ك) $\frac{1}{3}$
ت ماب ك	في	ي (ب - ك) $\frac{1}{3}$
ب ماب ك	الحاصل	ت ي (ب - ك) $\frac{1}{9}$
<hr/>		
ت ب ماب ك = ت ب ك		

	اضرب	ت ك $\frac{1}{3}$
ك ماب ك	في	ب ي $\frac{1}{3}$
ي ماب ك	الحاصل	٢ ك ي
<hr/>		

١١٧ متى ارتبطت الاجزاء المنطقية بالجذرية بواسطة علامة الجمع او الطرح

يجب ان يضرب كل جزء من المضروب في كل جزء من المضروب فيه مثاله

$$\begin{array}{r} ت + ماب \\ س + ماب \\ \hline ت س + س ماب \\ ت ماب + ماب د \\ \hline ت س + س ماب + ت ماب + ماب د \end{array}$$

$$ت + م٢ \times ١ + ر م٢ = ت + م٢ + ت ر م٢ + ر ي$$

اضرب م٢ في م٢ الجواب م٢ م٢ ب

اضرب ٥٥ في ٨٢ الجواب ١٠٦٢٠

اضرب ٢٢ في ٤٢ الجواب ٦٤٣٢

اضرب د في م٢ ت ب الجواب م٢ ت ب د

اضرب م٢ م٢ ب في م٢ ت د الجواب م٢ م٢ ب ت د

اضرب ت ت - ك في م٢ في (س - د) \times (ت ك) م٢

الجواب (ت س - ت د) \times (ت ك - ت ك) م٢

نبذة في قسمة الجذور

١١٨ بدل على قسمة الجذور بكتابتها على هيئة كسرٍ درجي. مثالة

الخارج من قسمة م٢ م٢ على م٢ م٢ = م٢ م٢ / م٢ م٢ او بوضع علامة واحدة للصورة والمخرج

مثالة م٢ م٢ / م٢ م٢

واذا كان جذر المقسوم والمقسوم عليه من اسم واحد تم القسمة كما في غيرها

وبوضع الخارج تحت علامة الجذر المشترك. مثالة

$$\begin{aligned} \frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢} \text{ على م٢ م٢} &= \frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢} \text{ و(ك ي) م٢ على ي} = \frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢} \text{ على (ك ي) م٢} \\ \frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢} &= \frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢} = \frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢} \end{aligned}$$

$$\frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢}$$

$$\frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢}$$

$$\frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢}$$

$$\frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢}$$

$$\frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢}$$

$$\frac{م٢ م٢ ب}{م٢ م٢}$$

اقسم م٢ م٢ ت ك

على م٢ م٢ ك

الخارج م٢ م٢ ت ك

$$\frac{1}{4} (ت^2 ي^2)$$

$$\frac{1}{4} (ت ي)$$

$$\frac{1}{4} (ت ي)$$

$$\frac{1}{4} (ت^2 ح)$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

١١٩. نُقسَم جذور كثيرة واحدة بطرح دليل المقسوم عليه من دليل المقسوم.

$$\text{مثالة } ت^2 + ت - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} ت^2 - \frac{1}{4} ت + \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} (ت^2 + ت)$$

$$\frac{1}{4} ت$$

$$\frac{1}{4} ت$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

$$\frac{1}{4} (ت^2)$$

$$\frac{1}{4} ت$$

$$\frac{1}{4} (ت^2)$$

$$\frac{1}{7} (ر^2 ي)$$

$$\frac{1}{7} (ر ي)$$

$$\frac{1}{7} (ر ي)$$

$$\frac{1}{7} (ت + ب ي)$$

$$\frac{1}{7} (ت + ب ي)$$

$$\frac{1}{7} (ت + ب ي)$$

وهكذا في قسمة الجذور على القوت او عكسها. مثالة $ت^2 + ت - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} ت^2 - \frac{1}{4} ت + \frac{1}{4}$

$$= \frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4} ت + \frac{1}{4}$$

١٢٠. بعد تحويل الجذور الى دليل مشترك ان كان لها مسميات منطقة نُقسَم

اولاً وبوضع الخارج قدام الخارج من قسمة الجذور. مثالة $ت^2 + ت - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$ على

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت$$

$$\frac{1}{4} ت$$

$$\frac{1}{4} ت$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} ت^2 + \frac{1}{4} ت - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} (ت^2 ك)$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

$$\frac{1}{4} (ت ك)$$

$$ت ب (ك^٢ ب) + \frac{1}{٤} (ك) = \frac{1}{٢} ت ب (ك^٢ ب) + \frac{1}{٤} ت (ك^٢) = ب$$

$$\frac{1}{٤} (ب) = \frac{1}{٤} (ب^٥)$$

اقسم $\sqrt[٢]{٢٢٢٢}$ على $\sqrt[٢]{٢٢٢}$ الجواب $\sqrt[٢]{٢٢}$

اقسم $\sqrt[١٠]{١٠٨١٠}$ على $\sqrt[١٠]{٤٢٥}$ الجواب $\sqrt[١٠]{٢٧٢٢} = ٦$

اقسم $\sqrt[١٠]{٢٧٢٢}$ على $\sqrt[١٠]{٢٢٢}$ الجواب ١٥

اقسم $\sqrt[١٠]{١٠٨١٠}$ على $\sqrt[١٠]{٢٢٢}$ الجواب $\sqrt[١٠]{٢٢١٢}$

اقسم $(ت^٢ ب^٢ د^٢)$ على $\sqrt[٢]{٢}$ الجواب $(ت ب)^٢$

اقسم $(١٦ ت^٢ - ١٢ ت^٢ ك) \sqrt[٢]{٢}$ على $\sqrt[٢]{٢}$ الجواب $(٤ ت - ٣ ك) \sqrt[٢]{٢}$

نبذة في ترقية الجذور

١٢١ الجذور تترقى مثل القوت اي بضرب دلائلها في دليل القوة المفروضة
 مثاله مربع $ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} \times ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$ والقوة النونية من $ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$ والقوة
 الخامسة من $ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$ او بالتحويل الى دليل مشترك $(ت^٢ ي^٢) \times \sqrt[٢]{٢}$
 $(ت^٢ ي^٢) = \sqrt[٢]{٢}$

١٢٢ كل جذر يترقى الى قوة من اسمه برفع علامة الجذر. مثاله مكعب
 $ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$ والقوة النونية من $ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$

ومكعب $\sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢ + س$

واذا كان للجذور سميات منطقفة يجب ترفيقها ايضا. مثاله مربع $\sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$

$\sqrt[٢]{٢} ت^٢$ ومربع $\sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢ \times (ك - ي)$

ومكعب $\sqrt[٢]{٢} ت^٢ = \sqrt[٢]{٢} ت^٢$

واذا ارتبطت المنطقفة بالجذور بعلامة الجمع او الطرح تترقى بالضرب كما علت

فما تقدم (٧٧) مثاله لو قيل ما هو مربع $\sqrt[٢]{٢} ت + \sqrt[٢]{٢} و ت - \sqrt[٢]{٢}$

$\frac{\begin{array}{c} \text{ت} - \text{ت} \\ \text{ت} - \text{ت} \\ \hline \text{ت} - \text{ت} \end{array}}{\text{ت} - \text{ت}}$	$\frac{\begin{array}{c} \text{ت} + \text{ت} \\ \text{ت} + \text{ت} \\ \hline \text{ت} + \text{ت} \end{array}}{\text{ت} + \text{ت}}$
$\frac{\text{ت} - \text{ت} + \text{ت}}{\text{ت} - \text{ت} + \text{ت}}$	$\frac{\text{ت} + \text{ت} + \text{ت}}{\text{ت} + \text{ت} + \text{ت}}$

ما هو مكعب ت - ت

ما هو مكعب ت + ت

١٢٣ الجذور نجد حسب تقدم (٩٨) اي بقسمة دلائلها على دليل الجذر المفروض او بوضع علامة الجذر مع دليله فوق الكمية. مثال الاول الجذر المربع من $\text{ت}^2 = \text{ت} + \text{ت} = \text{ت}^2$ والجذر الكعبي من $\text{ت}^3 = \text{ت}^2 + \text{ت} = \text{ت}^3$ ومثاله الثاني الجذر النوني من $\text{ت}^6 = \text{ت}^3 + \text{ت}^3 = \text{ت}^6$

١٢٤ اذا ضربت كمية جذرية في اخرى تشابهها وكان المضروب فيه قوة دليلها اقل من دليل المضروب بواحد يكون المحاصل كمية منطقة. مثاله

$$\text{ت}^{\frac{1}{2}} \times \text{ت}^{\frac{1}{2}} = \text{ت}^{\frac{1+1}{2}} = \text{ت}^1 = \text{ت}$$

$$\text{ت}^{\frac{1}{2}} \times \text{ت}^{\frac{1}{4}} = \text{ت}^{\frac{1+\frac{1}{2}}{2}} = \text{ت}^{\frac{3}{4}}$$

$$\text{ت}^{\frac{1}{2}} \times \text{ت}^{\frac{3}{4}} = \text{ت}^{\frac{1+\frac{3}{2}}{2}} = \text{ت}^{\frac{5}{4}}$$

١٢٥ كل كمية جذرية ثنائية ليس فيها غير الجذر المربع نصير منطقة اذا ضربت في نفسها بعد تبديل العلامة المتوسطة بين الجزئين من + الى - او عكسه وهذا واضح مما تقدم (٨٩) اي ان حاصل مجموع كيتين في فضلتهما = فضلة مربعيهما.

مثاله $\text{ت}^2 + \text{ت} = \text{ت}^2 - \text{ت} \times \text{ت} = \text{ت}^2 - \text{ت} = \text{ت}^2 + \text{ت} - \text{ت} + \text{ت}$

$$1 = \text{ت}^2 - 1 = \text{ت}^2 - 1 = 1 - 1 + 2 = 1 - 2 + \text{ت}^2 + 2 = \text{ت}^2 + 1$$

وان كانت الكمية ثلاثية فصاعدًا نتحول بالضرب اولًا الى ثنائية ثم الى منطقة. مثاله $1 - \text{ت}^2 = 1 - \text{ت}^2 = 1 - \text{ت}^2 + \text{ت}^2 = 1 - \text{ت}^2 + \text{ت}^2 = 1$

١٢٦ اذا اردت ازالة الجذور من صورة كسرٍ او مخرجه بدون تغيير القيمة فاضرب الصورة والمخرج في كمية تجعل احدها منطوقاً حسب المراد. فاذا اردت ازالة

الجذور من صورة هذا الكسري $\frac{\sqrt{a}}{b}$ فاضرب الصورة والمخرج في \sqrt{a} فتصير

$$\frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot b} = \frac{a}{\sqrt{a} \cdot b}$$

وفاذا ضربت الصورة والمخرج في \sqrt{a} يصير المخرج منطوقاً بـ a وقس على ذلك هذه الامثلة

$$\frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot b} = \frac{a}{\sqrt{a} \cdot b}$$

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{c} = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{c \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{a - b}{c \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})}$$

$$\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{c} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})}{c \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{a - b}{c \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})}$$

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{c} = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{c \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{a - b}{c \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})}$$

$$\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{c} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})}{c \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{a - b}{c \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1 \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{1 \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

حوّل $\frac{٢}{٣٦}$ الى كسري مخرجه منطقي

حوّل $\frac{٣ - ٦}{٦ + ٦}$ الى كسري مخرجه منطقي

١٢٧ نرى ما تقدم ان استخراج جذر كمية صماء كسراً يسهل بتحويل الصورة او المخرج الى كمية منطقة. فلا يلزم حينئذ سوى استخراج جذر احدهما اذ يكون الاخر

منطقاً. مثاله جذر $\frac{٣}{٦}$ المالّي $= \frac{٦}{٦} = \frac{٣}{٦}$ او $\frac{٦}{٦} = \frac{٣}{٦}$

جذر $\frac{٢}{٧}$ المالّي $= \frac{٣٦}{٧} = \frac{٣٦ \times ٧}{٧ \times ٧}$

امثلة

- (١) ما هو الجذر الرابع من ٨١ ت^٢
- (٢) ما هو الجذر السادس من (ت + ب)^٢
- (٣) ما هو الجذر الثبوني من (ك - ي)^١
- (٤) ما هو الجذر الكعبي من - ١٢٥ ت ك^٢
- (٥) ما هو الجذر المالّي من $\frac{٤ ت}{٩ ك ي}$
- (٦) ما هو الجذر الخامس من $\frac{٢٢ ت ك}{٢٤٣}$
- (٧) ما هو الجذر المالّي من ك^٢ - ٦ ب ك + ٩ ب^٢
- (٨) ما هو الجذر المالّي من ت^٢ + ت ي + $\frac{٢ ي}{٤}$
- (٩) حوّل ت ك الى هيئة الجذر السادس
- (١٠) حوّل - ٢ ي الى هيئة الجذر الكعبي
- (١١) حوّل ت^٢ وت^١ الى دليل مشترك
- (١٢) حوّل $\frac{٤}{٣}$ و $\frac{١}{٤}$ الى دليل مشترك

- (١٢) حوّل $\frac{أ}{ب}$ و $\frac{ب}{أ}$ الى دليل $\frac{أ}{ب}$
- (١٤) حوّل $\frac{أ}{ب}$ و $\frac{ب}{أ}$ الى دليل $\frac{أ}{ب}$
- (١٥) اخرج بعض $\frac{أ}{ب}$ من تحت علامة الجذر
- (١٦) اخرج بعض $\frac{أ}{ب}$ - $\frac{ب}{أ}$ من تحت علامة الجذر
- (١٧) ما هو مجتمع $\frac{أ}{ب}$ و $\frac{ب}{أ}$ و $\frac{أ}{ب}$ و $\frac{ب}{أ}$ و فضلتهما
- (١٨) ما هو مجتمع $\frac{أ}{ب}$ و $\frac{ب}{أ}$ و $\frac{أ}{ب}$ و $\frac{ب}{أ}$
- (١٩) اضرب $\frac{أ}{ب}$ في $\frac{ب}{أ}$ في $\frac{أ}{ب}$
- (٢٠) اضرب $\frac{أ}{ب}$ + $\frac{ب}{أ}$ × $\frac{أ}{ب}$ - $\frac{ب}{أ}$
- (٢١) اضرب $\frac{أ}{ب}$ (ت + $\frac{أ}{ب}$) × $\frac{ب}{أ}$ (ت - $\frac{ب}{أ}$)
- (٢٢) اضرب $\frac{أ}{ب}$ (ت + $\frac{ب}{أ}$) × $\frac{ب}{أ}$ (ت + $\frac{ب}{أ}$)
- (٢٣) اقسّم $\frac{أ}{ب}$ على $\frac{ب}{أ}$
- (٢٤) اقسّم $\frac{أ}{ب}$ على $\frac{ب}{أ}$
- (٢٥) اقسّم $\frac{أ}{ب}$ على $\frac{ب}{أ}$
- (٢٦) اقسّم $\frac{أ}{ب}$ على $\frac{ب}{أ}$
- (٢٧) ما هو مكعب $\frac{أ}{ب}$
- (٢٨) ما هو مربع $\frac{أ}{ب}$ + ٥
- (٢٩) ما هي القوة الرابعة من $\frac{أ}{ب}$
- (٣٠) ما هو مكعب $\frac{أ}{ب}$ - $\frac{ب}{أ}$
- (٣١) بماذا تصير $\frac{أ}{ب}$ منطقة
- (٣٢) بماذا تصير $\frac{أ}{ب}$ - $\frac{ب}{أ}$ منطقة
- (٣٣) حوّل $\frac{أ}{ب}$ الى مخرج منطوق $\frac{أ}{ب}$

(٢٤) حوّل $\frac{٦٦}{٣٦ \times ٧٦}$ الى مخرج منطقي



الفصل العاشر

في حل المعادلات بالترقية والتجذير

نبذة

في الترقية

١٢٨ لو فرض $\sqrt{ك} = ت$ لكان بتربيع جانبي هذه المعادلة $ك = ت^٢$ فإذا ان وقعت الكمية المجهولة تحت علامة الجذر فنحل المعادلة بترقية جانبيها الى فوق من اسم ذلك الجذر

تنبيه قبل الترقية ينبغي مقابلة المعادلة حتى تكون الكميات المنطقه وحدها على جانب واحد والجذرية وحدها على الجانب الاخر

فلنرض هذه المعادلة $٩ = ٤ + \sqrt{ك}$

ثم بالمقابلة $٥ = ٤ - ٩ = \sqrt{ك}$

بترقية الجانبيين $٢٥ = ٢٥ = ك$

مفروض $ت + \sqrt{ك} = ب - د$

بالمقابلة $\sqrt{ك} = د + ب - ت$

بالترقية $ك = (د + ب - ت)^٢$

مفروض $٤ = \sqrt{ك + ١}$

بترقية الجانبيين الى القوة الثالثة $٦٤ = ١ + ك$

وبالمقابلة $٦٣ = ك$

$$\frac{1}{3} + 7 = \sqrt{4 - 2k} + 4 \quad \text{مفروض}$$

$$12 = \sqrt{4 - 2k} + 8 \quad \text{بالجبر}$$

$$\frac{0}{6} = \sqrt{4 - 2k} \quad \text{بالمقابلة والقسمة على 6}$$

$$2 + \frac{20}{36} = \sqrt{4 - 2k} \quad \text{بالتربيع} \quad \frac{20}{36} = 4 - 2k$$

$$\frac{2+2}{\sqrt{4-2k}} = \frac{2+2}{\sqrt{4-2k}} \quad \text{مفروض}$$

$$2+2 = \sqrt{4-2k} \quad \text{بالجبر}$$

$$4 = \sqrt{4-2k} \quad \text{بالمقابلة}$$

$$16 = 4 - 2k \quad \text{بالتربيع}$$

وعلى هذا النسق نحل هذه الامثلة الآتية

$$\frac{261}{100} = k \quad 7 = \frac{4}{0} - \sqrt{2k} + 2$$

$$20 = k \quad 8 = \frac{k}{0.2}$$

$$12 = k \quad 7 = 4 + \frac{1}{2}(2+k)$$

$$4 = k \quad \sqrt{2k} + 2 = \sqrt{4k + 12}$$

$$\frac{20}{16} = k \quad \frac{1}{3} - \sqrt{k} = \sqrt{k}$$

$$\frac{9}{20} = k \quad \sqrt{5k} + 2 = \sqrt{2+k} \times \sqrt{5k}$$

$$\frac{1}{1-1} = k \quad \frac{\sqrt{k}}{k} = \frac{k-1}{k}$$

$$4 = k \quad \frac{28 + \sqrt{k}}{6 + \sqrt{k}} = \frac{28 + \sqrt{k}}{4 + \sqrt{k}}$$

$$ك = \frac{٢}{٣} ت \quad \frac{٢ ت}{ك + ت} = \frac{٢ ك + ٢ ت}{ك + ت}$$

$$ك = ت \frac{٢}{٣} \quad \frac{٢ ت}{٢ ك + ٢ ت} = \frac{٢ ك + ٢ ت}{٢ ك + ٢ ت}$$

$$\frac{٢ ت - ٢ ك}{٢ ت} = ك \quad \frac{٢ ت}{٢ ك + ٢ ت} = \frac{٢ ك + ٢ ت}{٢ ك + ٢ ت}$$

$$ك = \frac{٢}{٣} \quad \frac{٤}{ك + ٢ ت} = \frac{٢ ك + ٢ ت}{ك + ٢ ت}$$

$$٨١ = ك \quad ٢ ت - ١٦ = ٢ ت - ١٦$$

$$١٦ = ك \quad ١ + ٢ ت = ١٧ + ٢ ت$$

$$ك = ٦ \quad \frac{٩ - ٢ ت}{٦ + ٢ ت} = \frac{٢ - ٢ ت}{٢ + ٢ ت}$$

$$\frac{٢ ت - ٢ ك}{٢ ت} = ك \quad \frac{٢ ت}{٢ ك + ٢ ت} = \frac{٢ ك + ٢ ت}{٢ ك + ٢ ت}$$

نبذة

في حل المعادلات بالتجذير

١٢٩ لو فرض $ك = ١٦$ فان تجذر الجانبان نصير $ك = ٤$

فاذا ان كانت الكمية المجهولة قوة نحل المعادلة بتجذير الجانبين

$$٧ = ٨ - ك + ٦$$
 مفروض

$$٢ = ٩ - ٢ ت$$
 بالمقابلة $ك = ٩$ وبالتجذير $ك = ٣$

فالجواب ملتبس لان $٩ = ٢ + ٢$ و $٩ = ٢ - ٢$

$$٢٤ + ك = ٢٠ - ك$$
 مفروض

$$١٦ = ك$$
 بالمقابلة واقسمة $ك = ١٦$

$$٤ = ك$$
 بالتجذير $ك = ٤$

مفروض ت + $\frac{ك}{ب} = ح - \frac{ك}{د}$

بالجبر والمقابلة والقسمة ك $\frac{ب د ح - ت ب د}{ب + د} = ك$

وبالتجذير ك $\frac{1}{3} \left(\frac{ب د ح - ت ب د}{ب + د} \right)^{\frac{1}{3}} = ك$

مفروض ت + د ك = ١٠ - ك

بالمقابلة والقسمة ك $\frac{ت - ١٠}{١ + د} = ك$

بالتجذير ك $\frac{1}{3} \left(\frac{ت - ١٠}{١ + د} \right) = ك$

١٣٠ متى كانت المجهولة قوة تحت علامة الجذر فنقل المعادلة بالترقية والتجذير

مفروض $٤ = \sqrt{ك}$

بالترقية ك = ٤ = ٤

بالتجذير ك = $\sqrt[3]{٨} = \sqrt[3]{٨}$

مفروض $٢ - ح = \sqrt{ك}$

بالترقية ك - ٢ = ح - ٢ ح د + د

بالمقابلة ك = ح - ٢ ح د + د + ت

بالتجذير ك = $\sqrt{٢ ح د + د + ت}$

مفروض $\frac{ب + ت}{\sqrt[3]{(ك - ت)}} = \frac{1}{3} (ك + ت)$

بالجبر حسباً مر (١١٢) ب + ت = $\frac{1}{3} (ك - ت)$

بالترقية ك - ت = ٢ ت + ٢ ت ب + ب

بالمقابلة ك = ٢ ت + ٢ ت ب + ب

بالتجذير ك = $\sqrt[3]{(٢ ت + ٢ ت ب + ب)}$

مسائل مشورة

(١) سئل رجل عن عمره فقال اذا اضيف اليه عشر سنين وأخذ الجذر

المالي للجنس وطرح من هذا الجذر ٢ يبقى ٦ فكم كان عمره

بموجب شروط المسألة $٦ = ٢ - \sqrt{١٠ + ك}$
 بالمقابلة $٨ = \sqrt{١٠ + ك}$
 بالترقية $٦٤ = ١٠ + ك$
 بالمقابلة أيضاً $٥٤ = ك$
 والامتحان $٦ = ٢ - \sqrt{١٠ + ٥٤}$

(٢) أي عدد إذا اضيف اليه ٢٢٥٧٧ وأخذ جذر الختيع المائي وطرح منه ١٦٢ يبقى ٢٢٧

بشروط المسألة $٢٢٧ = ١٦٢ - \sqrt{٢٢٥٧٧ + ك}$
 بالمقابلة $٤٠٠ = \sqrt{٢٢٥٧٧ + ك}$
 بالترقية $١٦٠٠٠٠ = ٢٢٥٧٧ + ك$
 بالمقابلة $١٢٧٤٢٣ = ك$
 الامتحان $٢٢٧ = ١٦٢ - \sqrt{٢٢٥٧٧ + ١٢٧٤٢٣}$

(٣) تاجر ربح من تجارته مبلغاً نسبته الى ٢٢٠ كنسبة ٢٥٠٠ الى خمسة اضعاف المبلغ. فكم يكون ربحه

بشروط المسألة $ك : ٢٢٠ :: ٢٥٠٠ : ٥$
 بتحويل النسبة الى معادلة $٨٠٠٠٠٠ = ٢٢٠ ك$
 بالقسمة $ك = ١٦٠٠٠٠$ بالتجذير $ك = ٤٠٠$

تنبيه. عند تجذير ١٦٠٠٠٠ لانعلم هل الجذر ايجابي ام سلمي ولكن حسب شروط المسألة كان ربحاً فنحسبه ايجابياً. وقس على ذلك نظيره

(٤) سئل كم ميلاً الى المكان اللاني. فاجيب انه اذا طرح ٩٦ من مربع البعد يبقى ٤٨ فكم كانت المسافة

بالشروط $ك - ٩٦ = ٤٨$ $ك = ١٤٤$ $ك = ١٢$

(٥) اي عدد ينقسم ثلاثة امثال مربعه على ٤ وي طرح ١٢ من الخارج فيبقى

بالشروط $\frac{٢ك}{٤} - ١٢ = ١٨٠ = ك$ $١٦ = ك$

(٦) اي عددٍ يُطرح ربع مربعه من ٨ فيبقى ٤ الجواب ٤

(٧) اي عددين نسبة مجموعهما الى اكبرها كنسبة ١٠ الى ٧ واذا ضرب مجموعهما في اصغرها كان الحاصل ٢٧٠

نفرض مجموعهما = ١٠ فيكون الاكبر ٧ ك والاصغر ٣ ك والعددان ٢١ و٩

(٨) اي عددين نسبة فضلتهما الى اكبرها كنسبة ٢ : ٩ وفضلة مربعهما ١٢٨

الجواب ١٨ و١٤

(٩) اقس ١٨ الى قسمين بحيث تكون نسبة مربع احدهما الى مربع الاخر

كنسبة ١٦ : ٢٥

ليكن ك الاكبر فيكون ١٨ - ك الاصغر وك : (١٨ - ك) :: ١٦ : ٢٥

وبالتحويل الى معادلة ١٦ ك = (١٨ - ك) ٢٥

وبالتجدير ٤ ك = ٥ (١٨ - ك)

١٠ = ك

(١٠) اي عددٍ يُضرب نصفه في ثلثه فيكون الحاصل ٢٤ الجواب ١٢

(١١) اي عددٍ اذا اضيف اليه ٥ وطرح منه ٥ وضرب المجمع في الفضلة

الجواب ١١

يكون الحاصل ٩٦

(١٢) اقس ١٤ الى قسمين بحيث تكون نسبة الخارج من قسمة اكبرها على

اصغرها الى الخارج من قسمة اصغرها على اكبرها كنسبة ١٦ : ٩

الجواب ٨ و٦

(١٣) اي عددين نسبة احدهما الى الاخر كنسبة ٥ : ٤ ومجموع كعيبيها ١٠٠٢

افرض الاكبر ٥ ك والاصغر ٤ ك فيكون الجواب ١٥ و١٢

(١٤) ثلاثة شركة قسموا ارباحهم فكان الخارج من قسمة حصة الاول على ٢

يمثل الخارج من قسمة حصة الثاني على ٣ والخارج من قسمة حصة الثاني على ١٧

يمثل الخارج من قسمة حصة الثالث على ٥ وان ضربت حصة الاول في حصة الثاني

وحصة الثاني في حصة الثالث وحصة الثالث في حصة الاول يكون مجموع الحواصل $\frac{2}{3} \cdot 2820$ فكم حصة كل واحد

لنفرض حصة الاول ك فلنا ٧:٢::ك: $\frac{2}{3}ك$ = حصة الثاني

و ١٧:٥:: $\frac{2}{3}ك$: $\frac{10}{119}ك$ = الثالث

والاول في الثاني اي $ك \times \frac{2}{3}ك = \frac{2}{3}ك^2$

والثاني في الثالث اي $\frac{2}{3}ك \times \frac{10}{119}ك = \frac{20}{1323}ك^2$

والثالث في الاول اي $\frac{10}{119}ك \times ك = \frac{10}{119}ك^2$

ثم بالتحويل الى مخرج مشترك والمجموع $\frac{2}{3}ك^2 + \frac{20}{1323}ك^2 + \frac{10}{119}ك^2 = 2820 \cdot \frac{2}{3}$

فلنا $\frac{2}{3}ك = \frac{2820 \cdot \frac{2}{3}}{823} = 2820 \cdot \frac{2}{3}$ $ك = 79 \frac{1}{3}$

فالاول $= 79 \frac{1}{3}$ والثاني $= 24$ والثالث $= 10$

(١٥) بعض التجار اشتركوا في ارسال عامل الى مصر واعطاه كل واحد منهم من الدنانير عشرين امثال عدد الشركة. وكانت عمالة العامل في المائة من الدنانير ضعف عدد الشركة. فان ضرب $\frac{1}{100}$ من ربحه في $\frac{2}{3}$ امثال الحاصل عدد الشركة فكم كانت الشركة

ليكن عدد الشركة ك فيكون المال الذي بيد العامل ١٠ ك ورجح العامل على كل ١٠٠ دينار = ٢ ك وعلى ١٠ ك يكون ربحه $\frac{2}{10}ك$ ويكون $\frac{1}{100}$ من هذا الربح $\frac{2}{1000}ك$ و $\frac{2}{1000}ك \times \frac{2}{3}ك = \frac{2}{1500}ك^2 = \frac{2}{4000}ك^2$

فلنا $\frac{2}{1500}ك^2 = 225 ك$ $ك = 225 ك$ $ك = 15$

(١٦) اي عدد اذا اضيف اليه ٢ وطرح منه ١٠ يكون مربع المجموع مع

مضاعف مرتع النضلة ١٧٤٢٥ الجواب ٧٥

(١٧) اي عدد ين نسبة احدها الى الاخر كنسبة ٢ : ٥ ومجموع مربعيها ١٦٦٦

الجواب ٢١ و ٢٥

(١٨) سافر زيد وعمرو كل واحد من بلد قاصدين ان يتلاقيا في مكان.

ولما التقيا كان زيد قد قطع من المسافة ١٨ ميلاً زيادة عن عمرو. وفي سيرها كان

زيد قد قطع مسافة عمرو في $\frac{١٥}{٤}$ يوم. وكان عمرو قد قطع مسافة زيد في ٢٨

يوماً. فكم كان البعد بين البلدين

لنفرض ك = المسافة التي قطعها زيد

وك - ١٨ = اثني قطعها عمرو

فيكون $\frac{ك}{١٥ \frac{٤}{٤}} = \frac{١٨ - ك}{٢٨}$ سفر زيد اليومي

و $\frac{ك}{٢٨} =$ سفر عمرو اليومي

ولنا ك : ك - ١٨ :: $\frac{١٨ - ك}{١٥ \frac{٤}{٤}} : \frac{ك}{٢٨}$

ك = ٧٢ = مسافة زيد. والبعد = ١٢٦ ميلاً

(١٩) اي عدد ين نسبة احدها الى الاخر كنسبة ٨ : ٥ وحاصلها ٢٦٠

الجواب ٢٤ و ١٥

(٢٠) رجل اشترى ثوبين مجموعهما ٢٦ ذراعاً. وكان ثمن الذراع من كل

واحد من الدراهم بقدر عدد اذرع. ونسبة ثمن الواحد الى ثمن الاخر :: ٤ : ١ فكم

ذراعاً كان كل ثوب.

(٢١) اي عدد ين نسبة احدها الى الاخر كنسبة ٢ : ٢ ونسبة فضلة قوتيهما

الرابعتين الى مجتمع كعبيها كنسبة ٢٦ : ٧ الجواب ٦ و ٤

(٢٢) بعض السواح ترافقوا في السفر. ومع كل واحد منهم قدر ما مع الاخر

من الدراهم ولكل واحد من الخُدّام انفاق بقدر عدد السواح. والدراهم التي مع كل

واحد من السواج مضاعف عدد الخدام ومجتمع الكل ٢٤٥٦ درهماً فكم كان عدد السواج
الجواب ١٢

(٢٢) طلب الملك من مقاطعه رجالاً للحرب فارسلت كل قرية انفاراً بعدد قري تلك المقاطعة اربع مرات. واذا لم يرض الملك بذلك ارسلت كل قرية ثلثة انفاراً ايضاً فكانت نسبة العدد كله بعد هذه الزيادة الى عدد المرسلين اولاً كنسبة ١٧ : ١٦ فكم قرية في هذه المقاطعة
الجواب ١٢



الفصل الحادي عشر

في معادلات ممتزجة من الدرجة الثانية

١٢١ تنقسم المعادلات الى اقسامٍ شتى باعتبار قوة الحرف الدال على الكمية المجهولة

الاول معادلات من الدرجة الاولى وهي ما ليس فيها سوى القوة الاولى من المجهولة. مثالها $x = t + b$ وتسمى ايضاً معادلات بسيطة وقد تقدم ذكرها الثاني معادلات من الدرجة الثانية وهي ما كانت القوة العليا فيها من المجهولة مآلاً. ويقال لها ايضاً معادلات مربعة. فان لم يكن فيها غير القوة من المجهولة فهي المحضة. وقد مضى ذكرها. مثالها $x^2 = t - r$ وان كان فيها القوة الثانية والاولى من المجهولة فهي الممتزجة. مثالها $x^2 + b = t$

الثالث معادلات من الدرجة الثالثة وهي ما كانت فيها القوة العليا من المجهولة كعباً. وهي ايضاً اما محضة مثل $x^3 = b - s$ واما ممتزجة مثل $x^3 + t = k^2 + b$ كعباً. وهي ايضاً اما محضة مثل $x^3 = b - s$ واما ممتزجة مثل $x^3 + t = k^2 + b$

١٢٢ قد راينا في ما تقدم ان المعادلة المربعة المحضة نحل بالتجزير جانبيها. وهكذا ايضاً الممتزجة اذا كان الجانب الذي فيه المجهولة مربعاً تاماً. مثالها

$x^2 + t = k + b$ فنحل هذه المعادلة نحل بالتجزير لان جانبيها الاول مربع كمي ثنائية. وحسبنا تقدم (١٠٢) لنا بالتجزير $x + t = k + b$ وبالمقابلة $x = k + b - t$

١٢٢ مراراً كثيرة يحدث ان الجانب الذي فيه المجهولة لا يكون مربعاً تماماً مثل ك^٢ + ٢ت ك = ب فلو عرفنا الجزء الناقص من الجانب الاول لكي يصير مربعاً تماماً واضفناه الى الجانبين لجمعنا المعادلة محضة بالتجذير كما تقدم (٧٨) فبما ان الجزء الثاني هو مضاعف حاصل الجزئين يكون ٢ت ك في المعادلة المذكورة مضاعف حاصل جزئي الكمية التي نحن في طلبها وتكون الكمية ك + ت ومربعها ك^٢ + ٢ت ك + ت^٢ اي الجزء الناقص هو مربع نصف مسمى القوة الدنيا من المجهول. ولنا من ذلك قاعدة لانما تربيع معادلة مربعة ممتزجة وهي ان بوخذ مربع نصف مسمى القوة الدنيا من المجهول ويضاف الى جانبي المعادلة

فلو فرض ك^٢ + ٢ف ك = د لكان لنا حسبنا نقدم

$$ك^٢ + ٢ف ك + ١/٤ ف^٢ = د + ١/٤ ف^٢$$

$$ك + ١/٢ ف = \sqrt{د + ١/٤ ف^٢}$$

$$ك + ١/٢ ف = \sqrt{د + ١/٤ ف^٢}$$

وهي عبارة عمومية لكل معادلة مربعة ممتزجة. فلو فرض ك^٢ - ٦ ك = ٧ لقلنا حسب هذه العبارة ك^٢ - ٦ ك + ٩ = ٧ + ٩ = ١٦ او ١ - ٧

نتبيه. لكل معادلة مربعة محضة كانت او ممتزجة فيمتان لان الجذر الشفيعي ملتبس (١٠٢) وهذا الجذر هو نفس قيمة المجهول في كل معادلة مربعة محضة. مثاله ك^٢ = ٦٤ ك = ٦٤ = \sqrt{٦٤} = ٨ ولكن في الممتزجة لا بد من اضافة شيء الى هذا الجذر او طرح شيء منه كما راينا. ونرى القيمتين تارة ايجابيتين وتارة احداها ايجابية والاخرى سلبية. مثال ذلك

$$ك + ٨ = ك = ٢٠ = ك - ٤ = ٦ = ٢ او ١٠ - ك = ٨ - ك = ١٥ - ك = ٤ = ١ = ٥ او ٢ وتبرهن صحتها بالتعويض بهما عن المجهول في المعادلة الاصلية. فبالتعويض عن ك بخمسة لنا ٨ - ٥ = ٣٥ - ٤٠ = ١٥ -$$

$$١٥ - وبالتعويض عنها بثلاثة ٢ - ٨ = ٢٤ - ٩ = ١٥ -$$

١٣٤ قبل اتمام التربيع يجب مقابلة المعادلة حتى تكون المجهولات وحدها على جانب واحد والمعلومات على الجانب الاخر. ويجب ايضاً ازالة الكسور والقسمة على مسي القوة العليا للجهول. ولايضاح كل ذلك قد وضعنا هذه الامثلة

- (١) مفروض $ك + ٦ = ت ك = ب$
 باتمام التربيع $ك + ٦ = ت ك + ٩ = ت ٩ + ب$
 بالتجذير $ك + ٦ = ت ٩ + ب$
 والمقابلة $ك - ٦ = ت ٩ + ب$
- (٢) مفروض $ك - ٨ = ب ك = ح$
 باتمام التربيع $ك - ٨ = ب ك + ١٦ = ب ١٦ + ح$
 بالتجذير $ك - ٨ = ب ١٦ + ح$
 بالمقابلة $ك + ٨ = ب ١٦ + ح$
- (٣) مفروض $ك + ت = ك = ب + ح$
 باتمام التربيع $ك + ت = ك + ت = ت ٤ + ب + ح$
 بالتجذير $ك + ت = ت ٤ + ب + ح$
 والمقابلة $ك - ت = ت ٤ + ب + ح$
- (٤) مفروض $ك - ك = ح - د$
 باتمام التربيع $ك - ك + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + ك - ح - د$
 وبالتجذير والمقابلة $ك - ك + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + ك - ح - د$
- (٥) مفروض $٦ + د = ك ٢ + ك$
 باتمام التربيع $٦ + د + \frac{٩}{٤} = \frac{٩}{٤} + ك ٢ + ك$
 وبالتجذير والمقابلة $٦ + د + \frac{٩}{٤} = \frac{٩}{٤} + ك ٢ + ك$
- (٦) مفروض $ك - ت = ت ب = ك = ت ب - س د$

باتمام التربيع $ك - ت ب ك + \frac{ت^2 ب^2}{٤} = \frac{ت^2 ب^2}{٤} + ت$

ب - س د

بالتجذير والمقابلة $ك = \frac{ت ب}{٢} + \frac{ت^2 ب^2}{٤} + ت ب - س د$

(٧) مفروض $ك = \frac{ت ك}{ب} + ت$ ح

باتمام التربيع $ك + \frac{ت^2}{٤ ب} = \frac{ت^2}{٤ ب} + \frac{ت ك}{ب} + ت$ ح

وبالتجذير والمقابلة $ك = \frac{ت}{٢ ب} + \frac{ت^2}{٤ ب} + ت$ ح

(٨) مفروض $ك - ت = \frac{ك}{ب} + ت$ ح

باتمام التربيع $ك - ت + \frac{١}{٤ ب} = \frac{١}{٤ ب} + \frac{ك}{ب} + ت$ ح

وبالتجذير والمقابلة $ك = \frac{١}{٢ ب} + \frac{١}{٤ ب} + ت$ ح

١٣٥ متى كانت القوة الدنيا في عتق من اجزاء المعادلة يجب جمعها الى جزء واحد قبل اتمام التربيع. وان كانت مضلعة يجب فكها الى اضلاعها لكي يُعرف مسماها

(١) مفروض $ك^٢ + ٢ ك + ٢ = ك + د$

بالجمع $ك^٢ + ٦ ك + ٩ = د + ٩$

باتمام التربيع $ك + ٦ = ٩ + ك + د$

وبالتجذير والمقابلة $ك = \sqrt{٩ + د} - ٦$

(٢) مفروض $ك^٢ + ت ك + ب ك = ح$

بالفك حسب (٢٨) $ك + ت + ب = \frac{ح}{ك}$

باتمام التربيع $ك + \frac{ت + ب}{٢} + \frac{ت + ب}{٢} = \frac{ح}{ك} + \frac{ت + ب}{٢}$

بالتجذير $ك + \frac{ت + ب}{٢} = \sqrt{\frac{ح}{ك} + \frac{ت + ب}{٢}}$

$\sqrt{\frac{ح}{ك} + \frac{ت + ب}{٢}} = \frac{ت + ب}{٢} + ك$

$$\text{وبالمقابلة ك} = \frac{ت + ب}{٢} - \sqrt{\frac{ت + ب}{٢} + ح}$$

(٣) مفروض ك^٢ + ت ك - ك = ب

بالتك (٣٨) ك^٢ + ك(١ - ت) = ب

باتمام التربيع ك^٢ + ك(١ - ت) + ك(١ - ت) = ك(١ - ت) + ح

+ ب

$$\text{بالتجزير والمقابلة ك} = \frac{١ - ت}{٢} + \sqrt{\frac{١ - ت}{٢} + ب}$$

١٣٦ ينبغي في بعض الاحيان ان تُعدَّ المعادلة لانمام التربيع بالجبر او المقابلة او القسمة او تبديل العلامات وما يشبه ذلك كما ترى في هذه الامثلة

(١) مفروض ت + ٥ ك - ٣ = ب

بالمقابلة والجمع ك^٢ + ٢ ك = ب - ت

باتمام التربيع ك^٢ + ٢ ك + ١ = ١ + ب - ت

بالتجزير والمقابلة ك = $\frac{١ - ب + ت}{٢} + ١$

(٢) مفروض $\frac{ك}{٣} = ٤ - \frac{٢٦}{٢ + ك}$

بالجبر والمقابلة والجمع ك^٢ + (١٠ ك) = ٥٦

باتمام التربيع ك^٢ + (١٠ ك) + ٢٥ = ٨١

بالتجزير والمقابلة ك = $\frac{٥ - ٩}{٨١} + ٥$

(٣) مفروض ك^٢ + ٢٤ ت - ٦ ح = ٥ ك

بالمقابلة والجمع ك^٢ - ١٢ ك = ٦ ح - ٢٤ ت

بالقسمة على ٦ ك^٢ - ٢ ك = ح - ٤ ت

باتمام التربيع ك^٢ - ٢ ك + ١ = ١ + ح - ٤ ت

بالتجزير والمقابلة ك = $\frac{١ + ح - ٤ ت}{٢} + ١$

(٤) مفروض ح + ك = $\frac{ب}{ت} - د$

بالجبر والمقابلة ب ك^٢ + ٢ ت ك = د - ت ح

$$\text{بالقسمة على ب} \quad \frac{\text{ك}^2 + \text{ك} \text{ت} - \text{ت}^2}{\text{ب}} = \frac{\text{ك}^2 + \text{ك} \text{ت} - \text{ت}^2}{\text{ب}}$$

$$\text{باتمام التربيع ك}^2 + \frac{\text{ك} \text{ت}}{\text{ب}} + \frac{\text{ت}^2}{\text{ب}} = \frac{\text{ك}^2 + \text{ك} \text{ت} - \text{ت}^2}{\text{ب}} + \frac{\text{ت}^2}{\text{ب}}$$

$$\text{بالتجذير والمقابلة ك} = \frac{\text{ك}^2 + \text{ك} \text{ت} - \text{ت}^2}{\text{ب}} + \frac{\text{ت}^2}{\text{ب}}$$

$$(٥) \text{ مفروض ب ك}^2 + \text{د ك} - \text{ك} = \text{ب} - \text{ح}$$

$$\text{بالقسمة على ب} + \text{د ك} - \frac{\text{ك}^2}{\text{ب}} = \frac{\text{ب} - \text{ح}}{\text{ب}} + \frac{\text{ك}^2}{\text{ب}}$$

$$\frac{\text{ب} - \text{ح}}{\text{ب}} + \frac{\text{ك}^2}{\text{ب}}$$

$$(٦) \text{ مفروض ت ك}^2 + \text{ك} = \text{ح} + \text{ك}^2 - \text{ك}$$

$$\text{بالمقابلة والجمع ت ك}^2 + \text{ك} = \text{ك}^2 - \text{ك} + \text{ح}$$

$$\text{بالقسمة على ت} + \text{ك} = \frac{\text{ك}^2}{\text{ت}} - \text{ك} + \frac{\text{ح}}{\text{ت}}$$

$$\text{ثم ك} = \frac{\text{ك}^2}{\text{ت}} - \text{ك} + \frac{\text{ح}}{\text{ت}}$$

١٢٧ لنفرض ت ك + ب ك = د فاذا ضرب الجانبان في ت واضيف اليهما ب نصير المعادلة ت ك + ك + ب ك = د ت + ب ك فنرى الجانب الاول قوة تامة من ت ك + ب ولنا من ذلك قاعدة اخرى لاتمام التربيع وهي ان تضرب المعادلة في اربعة امثال مسمى قوة المجهول العليا وتضيف الى الجانبين مربع مسمى قوته الدنيا

تنبيه. هذه القاعدة اسهل من الاولى متى كان للمجهول مسميات لا يمكن ازالتها بالقسمة لانه لا يحدث منها كسر في اتمام التربيع كما ترى في هذه الامثلة

$$(١) \text{ مفروض ت ك}^2 + \text{د ك} = \text{ح}$$

باتمام التربيع حسب القاعدة الثانية

$$\text{ت ك}^2 + \text{ك} + \text{د ك} = \text{د} + \text{ح} + \text{د}$$

$$\text{بالتجذير} \text{ت ك} + \text{ك} = \text{د} + \text{ح} + \text{د}$$

$$\frac{\sqrt{د + ح} + د - د}{٢} = \text{والمقابلة والقسمة ك}$$

وباتمام التربيع حسب القاعدة الاولى لنا

$$\frac{د}{٢} + \frac{ح}{٢} = \frac{د}{٢} + \frac{دك}{٢} + ك$$

$$\frac{\sqrt{\frac{د}{٢} + \frac{ح}{٢}} + \frac{د}{٢}}{٢} = \frac{د}{٢} + ك$$

$$\frac{\sqrt{\frac{د}{٢} + \frac{ح}{٢}} + \frac{د}{٢}}{٢} = \frac{د}{٢} + ك$$

(٢) مفروض ك + د = ح

باتمام التربيع ك + د = ح + د

$$\sqrt{د + ح} + د = د + ك$$

$$\frac{\sqrt{د + ح} + د - د}{٢} = \text{والمقابلة والقسمة ك}$$

(٣) مفروض ك + ٥ = ٤٢

باتمام التربيع ك + ٦٠ = ٥٢٩

بالتجذير والمقابلة والقسمة ك = ٣

(٤) مفروض ك - ١٠ = ٥٤

باتمام التربيع ك - ٦٠ = ٢٢٥

ثم ك = ١٥ + ٢ = ١٨ او ١٢

تنبيه. اذا وقع - ك في معادله يجب تبديل جميع علاماتها حتى نصير القوة لعلينا من المجهول ايجابية (٦٥) لان - ك لا يكون جزءا من مربع كمية ثنائية فلا يمكن اتمام التربيع

(١) مفروض - ك + ٢ = د - ح

بتبديل العلامات ك - ٢ = ح - د

$$\sqrt{د - ح + ١} + ١ = ك$$

(٢) مفروض $\epsilon - \kappa = \kappa - 12$

بتبديل العلامات $\kappa - \epsilon = \kappa - 12$

$$\sqrt{16} + 2 = \kappa$$

١٢٨ يمكن ان يكون جزء من كمية ثنائية اصلية قوة مثل $\kappa + 2$ ومرمبها يكون $\kappa + 2$ ت $\kappa + 2$ ت فنرى دليل المجهول في الجزء الاول مضاعف دليله في الثاني. وان فقد الجزء الثالث يستعلم بانمام التربيع حسبنا تقدم. ولنا من ذلك هذه القاعدة. وهي كل معادلة فيها قوتان من المجهول فقط دليل احدها مضاعف دليل الاخرى تحل كمعادلة مربعة ابي بانمام التربيع

(١) مفروض $\kappa - \epsilon = \kappa - 2$ ت

بانمام التربيع $\kappa - \epsilon = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \kappa - 2$ ت

بالتجذير والمقابلة $\kappa = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + 2$ ت

بالتجذير ايضا $\kappa = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + 2$ ت

(٢) مفروض $\kappa - \epsilon = \kappa - 2$ ت

$$\kappa = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + 2$$

(٣) مفروض $\kappa + \epsilon = \kappa - 3$ ت

بانمام التربيع $\kappa + \epsilon = \kappa - 3 + 4 + 4 + 4 + 4$ ت

بالتجذير والمقابلة $\kappa = \sqrt{4 + 4 + 4 + 4} - 3$ ت

بالترقية $\kappa = (\sqrt{4 + 4 + 4 + 4} - 3)$ ت

(٤) مفروض $\kappa + 8 = \frac{1}{4} \kappa + 2$ ت

بانمام التربيع $\kappa + 8 = \frac{1}{4} \kappa + 2 + 16 + 16 + 16 + 16$ ت

بالتجذير والمقابلة $\kappa = \frac{1}{4} \kappa + 2 + \sqrt{16 + 16 + 16 + 16}$ ت

بالترقية $\kappa = (\frac{1}{4} \kappa + 2 + \sqrt{16 + 16 + 16 + 16})$ ت

١٣٩ متى خرج للمجهول قيمة وهمية (١٠٢) لا يمكن ان توجد تلك القيمة حقيقيّة. مثالة

ك' - ٨ = ك - ٢٠ = ك ± ٤ - ٦ - ٤ و ٦ - ٤ كية وهمية فلا توجد للمجهول قيمة. ولا بد لكل معادلة مربعة ان تكون على احدى هذه الصور الثلاث

$$(1) \quad \sqrt{k' + 8} = k - 20 = k \pm 4 - 6 - 4 \quad \text{ب}$$

$$(2) \quad \sqrt{k' - 8} = k - 20 = k \pm 4 - 6 - 4 \quad \text{ب}$$

$$(3) \quad \sqrt{k' - 8} = k - 20 = k \pm 4 - 6 - 4 \quad \text{ب}$$

ففي الاولى والثانية لا تكون القيمة وهمية البتة. وتكون وهمية في الثالثة متى كان ب أكثر من ٤

فلو قيل اقسام ٨ الى قسمين حاصلها ٢٠ ل قيل $k - 8 = k - 20 = k$ وذلك مستحيل

١٤٠ للمجهول في كل معادلة مربعة فيمتان حسبما تقدم (١٢٢) وغالباً نتعين التي يجب ان تؤخذ منها بشروط المسئلة. فلو قيل اقسام ٢٠ الى قسمين حاصلها يعدل ثمانية امثال فضلتها ل قيل اصغرها = ك و اكبرها = ٢٠ - ك وبشروط المسئلة $k \times (30 - k) = 8 \times (2 - 30)$

$$k = 17 \pm 40 = 6$$

ولكن لا يكون ٤٠ قسماً من ٣٠ فيكون القسم الاصغر ٦ والاكبر ٢٤

١٤١ لنا طريقة اخرى لحل المعادلات المربعة المتريجة. وهي بالتعويض. فلنفرض ك' = ف + ك + ق و ف وق معروفان. فلنفرض ك = س + ١/٣ ف ثم بالتعويض عن ك بهذه القيمة نصير المعادلة

$$س + ف + س + ١/٣ ف + ق = ف + ك + ق$$

$$\text{ثم } س + ١/٣ ف = ف + ق$$

$$س = ١/٤ ف + ق$$

وك $\frac{1}{3} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ وهي عبارة عمومية لكل معادلة مربعة
ممتزجة كما ترى في هذه الامثلة الآتية

مفروض ك $7 + 6 = 13$ ثم ك $7 - 6 = 1$
وهنا $\sqrt{2} = 6 - 7 = 1$ فلنا بموجب العبارة المذكورة $2 = \sqrt{2} + \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$
 $\sqrt{3} = 1$ او $\sqrt{3} = 10 - 9 = 1$

مفروض ك $10 - 9 = 1$
ثم ك $13 + 12 = 25$ ف $\sqrt{2} = 1$
ولنا $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \frac{25}{2} = \frac{12 + 13}{2}$ او 11 او 12

مفروض ك $18 = 18$ ثم ك $2 = 180$
 $\frac{1}{3} = \frac{2}{3} = \frac{180 + 18}{3} = \frac{198}{3}$ ولنا ك $\frac{2}{3} = \frac{180 + 18}{3}$
او 15

مفروض ك $2 = 90$ ثم ك $2 = 90 - 2 = 88$
ك $2 = \frac{90 + 2}{4} = \frac{92}{4}$ ولنا ك $\frac{2}{4} = \frac{90 + 2}{4}$
او $7 = \frac{27 + 2}{4} = \frac{29}{4}$

امثلة

- (١) ك $3 = 80 - 4 = 76$ او $7 = 4$
- (٢) ك $4 = \frac{72 - 4}{4} = 17$ او $12 = \frac{2}{4}$
- (٣) ك $4 = \frac{14 - 4}{1 + 4} = 2$ او $4 = \frac{7}{4}$
- (٤) ك $5 = \frac{2 - 4}{3 - 4} + 2 = \frac{2}{1} + 2 = 4$ او $1 = 4$
- (٥) ك $2 = \frac{9 - 100}{4} = \frac{17}{4}$ او $4 = \frac{1}{12}$

$$7 \text{ او } 12 = \text{ك} \quad \frac{2-\text{ك}}{3} - 10 = 1 + \frac{4-\text{ك}}{4-\text{ك}} \quad (٦)$$

$$\text{او } 21 = \text{ك} \quad 1 - \frac{7+\text{ك}}{9} = \frac{\text{ك}-7}{3-\text{ك}} - \frac{4+\text{ك}}{3} \quad (٧)$$

$$28 - \text{او } 1 = \text{ك} \quad 2-\text{ك} = \frac{1+2\text{ك}}{4+\text{ك}} - \frac{10-\text{ك}}{6-\text{ك}} \quad (٨)$$

$$2 = \text{ك} \quad 2 = \frac{2}{\text{ك}} + \frac{7}{1+\text{ك}} \quad (٩)$$

$$10 = \text{ك} \quad 9-\text{ك} = \frac{1-\text{ك}}{6} - \frac{2\text{ك}}{3+\text{ك}} \quad (١٠)$$

$$\sqrt{12-\text{ك}} + 1 = \text{ك} \quad \frac{2}{\text{ك}} = \frac{\text{ك}}{\text{ك}} + \frac{\text{ك}}{\text{ك}} \quad (١١)$$

$$\sqrt{\frac{2}{\text{ك}} + \frac{\text{ك}}{4}} + \frac{\text{ك}}{3} = \text{ك} \quad \text{ب} = 2\text{ك} + \frac{4\text{ك}}{3} \quad (١٢)$$

$$22 = \text{ك} \quad \frac{1}{22} = \frac{2\text{ك}}{4} - \frac{7\text{ك}}{3} \quad (١٣)$$

$$\frac{1}{8} = \text{ك} \quad 2 = \frac{1}{3}\text{ك} + \frac{2}{3}\text{ك} \quad (١٤)$$

$$49 = \text{ك} \quad 22\frac{1}{6} = \frac{1}{\text{ك}} - \frac{1}{3} \quad (١٥)$$

$$7\sqrt{\frac{1}{3}} = \text{ك} \quad 99 = 96 + 2\text{ك} - 4\text{ك} \quad (١٦)$$

$$7 = \text{ك} \quad 2 = \frac{1}{4}(\text{ك}+10) - \frac{1}{3}(\text{ك}+10) \quad (١٧)$$

$$2\sqrt{2} = \text{ك} \quad 8 = 2\text{ك} - 2\text{ك} \quad (١٨)$$

$$\frac{1}{9} = \frac{1}{\sqrt{2-\text{ك}+10}} - \frac{1}{\sqrt{2-\text{ك}+10}} \quad (١٩)$$

$$\sqrt{41} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \text{ك}$$

$$\sqrt{\frac{4-\text{ك}}{3}} + \frac{\text{ك}}{3} = \text{ك} \quad \text{ب} - \text{ك} = \sqrt{2-\text{ك}} - \sqrt{2-\text{ك}} \quad (٢٠)$$

$$4 = \text{ك} \quad \frac{\sqrt{2-\text{ك}} - 4}{\sqrt{2-\text{ك}}} = \frac{2 + \sqrt{2-\text{ك}}}{\sqrt{2-\text{ك}} + 4} \quad (٢١)$$

$$(٢٢) \quad ٧٥٦ = \overset{١}{ك} + \overset{٢}{ك} = ٢٤٢ = ك$$

$$٤ = ك \quad \frac{٢١}{١ + ك} = \overset{٢}{ك} + \overset{١}{ك} \quad (٢٣)$$

$$٧ + ٥ = ك \quad \frac{٧ + ٥}{ك} = \overset{٢}{ك} + \overset{١}{ك} \quad (٢٤)$$

$$٩ = ك \quad \frac{١٦ + ٧ - ١٠}{١٦ + ك} = \overset{٢}{ك} + \overset{١}{ك} \quad (٢٥)$$

$$\overset{٦}{ك} = \overset{٢}{ك} + \overset{٤}{ك} \quad (٢٦)$$

بالقسمة على $\overset{٦}{ك}$ $٢ = ك + ٦ = ك$

$$٢ = ك \quad \frac{٢٢ + ٩}{١٢} = \frac{٧ - ٢}{٧ + ٢} = \frac{٥ - ٤}{ك} \quad (٢٧)$$

$$٢ = ك \quad \frac{١١}{٥} = \frac{٦}{٢ + ك} + \frac{٢}{٦ - ك} \quad (٢٨)$$

$$٩ = ك \quad ٤٠ = \overset{٢}{ك}(٥ - ك) - \overset{٢}{ك}(٥ - ك) \quad (٢٩)$$

$$١٠ = ك \quad \overset{٢}{ك} + ٢ = \overset{٢}{ك} + ٢ \quad (٣٠)$$

$$\frac{٨٦ + د + س + س}{٤} = ك \quad ٢ = ك - س \quad (٣١)$$

$$\frac{٨ + ٦ + ٦ + ٦ + ٦}{٨} = ك \quad ٤ = ك - ب = س \quad (٣٢)$$

$$\frac{١}{٣} (\overset{٢}{ك} - ٤ + ٤ - \overset{٢}{ك}) = ك \quad ب = \overset{٢}{ك} + \overset{٢}{ك} \quad (٣٣)$$

$$\overset{٢}{ك} = ك \quad ١٢ = ٤ + ٤ + ٤ \quad (٣٤)$$

$$٢ = ك \quad ٥١٢ = ٨ - ٨ + ٨ \quad (٣٥)$$

$$٨١ = ك \quad ٩٩ = ٧ - ٧ + ٧ \quad (٣٦)$$

$$\frac{١٥ - ٦ + ٤ - ٤}{١٥} = ك \quad ٠ = ٢١ + ٨ + ٨ + ٨ \quad (٣٧)$$

$$\frac{١٤ - ٦ + ٦}{١٤} = ك \quad ٠ = ٥٠ + ١٢ - ٨ - ٨ \quad (٣٨)$$

$$\frac{٧ - ٦ + ٨}{٧} = ك \quad ٧٠ = ١٦ - ١٦ + ١٦ \quad (٣٩)$$

$$(٤٠) \quad ٢ك + ١٥ = ٣ك \quad ك = \frac{١١١ - ٦ \pm ٣}{٤}$$

$$(٤١) \quad ٣ك - \frac{١}{٤}ك = ١٠ \quad ك = \frac{٦ - ٦}{٤}$$

عمليات

(١) تاجرٌ عندُ ثوبان طولها ١١٠ اذرع وان طرُح مربع اذرع اطولها من مقدار اذرع الاخر ٨٠ مرة يبقى ٤٠٠ فكم ذراعاً كل ثوبٍ

لنفرض ك اطولها و ١١٠ - ك الاخر

بشروط المسئلة $٤٠٠ = ٨٠ \times (١١٠ - ك) - ك$

ك = ٦٠ اطولها $٥٠ =$ الاخر

(٢) سُئل أخوان كم عمر كل واحدٍ منكما. فقالا مجتمع عمرنا ٤٥ سنة

وحاصلها ٥٠٠ سنة. فكم عمر كلٍ منها
الجواب ٢٥ و ٢٠

(٣) اي عدد من فضلتها ٤ وحاصلها ١١٧

ك = احدها ك + ٤ = الاخر

ثم $(ك + ٤) \times ك = ١١٧$
الجواب ٩ و ١٣

(٤) تاجرٌ باع ثوباً كان قد اشتراه بثلاثين ديناراً ولو ضرب الثمن الذي

باعه به في الربح الذي نتج له لكان المحاصل مكعب الربح. فكم كان الربح

لنفرض ك = الربح فيكون $٣٠ + ك$ ثمن المبيع

ثم بشروط المسئلة $ك = (٣٠ + ك) \times ك$
الجواب ٦ دنانير

(٥) اي عدد من فضلتها ٢ وفضلة كعبيها ١١٧

ك = الاصغر ك + ٢ = الاكبر
الجواب ٢ و ٥

(٦) ما عددان فضلتها ١٢ ومجموع مربعيهما ١٤٢٤

الجواب ٢٠ و ٢٢

(٧) ما عددان فضلتها ٧ ونصف حاصلها مع ٢٠ يعدل مربع اصغرها

ك = الاصغر ك + ٧ = الاكبر

$$\text{ثم بالمسألة } \text{ك} = \frac{\text{ك} \times (\text{ك} + ٧)}{٢} + ٣٠ = \text{ك}$$

الجواب ١٢ و ١٩

(٨) رف طيور طار منه جذر مال نصفه ثم $\frac{1}{4}$ منه وبقي طيران فكم طائراً كان الرف

$$\text{لنفرض العدد } ٢ \text{ ك} \text{ فلنا } \text{ك} = ٢ + \frac{١٦ \text{ ك}}{٩} + \text{ك}$$

الجواب ٧٢ طائراً

(٩) رجل اشترى قطيعاً من الغنم بثمن ٢٤٠٠ دينار. ولو زيد عدد الغنم ٨ لكان ثمن كل راس اقل مما كان في الحقيقة ١٠ دنانير. فكم راساً كان ذلك القطيع
الجواب ٤٠

(١٠) رجل اشترى مواشي بمبلغ ١١٤٠ ديناراً ومات منها ٨ روس ثم باع الباقى ورجح في كل راس ٨ دنانير ولم يخسر شيئاً. فكم راساً اشترى

الجواب ٢٨

(١١) زيد وعبيد سافرا معاً قاصدين مكاناً يبعد عنها ٣٠٠ ميل. وكان زيد يسبق عبيداً كل ساعة ميلاً فوصل قبله بعشر ساعات. فكم ميلاً مشى كل واحد منها في الساعة
زيد = ٦ اميال وعبيد = ٥ اميال

(١٢) اقس ١٨ الى ضلعين حتى يكون مجتمع كعيبها ٢٤٢

$$\text{ك} = \text{احدها} = \frac{١٨}{\text{ك}} = \text{الآخر}$$

$$\text{ك} = ٦ = \text{اكبرها} = \frac{١٨}{٣} = \text{اصغرها}$$

(١٣) ائى عددان فضلتهما ١٢٠ ونسبة اكبرها الى اصغرها :: الاصغر : ١٠

الجواب ٤٠ و ١٦

(١٤) ائى عددان مجتمعها ٦ ومجتمع كعيبها ٧٢

(١٥) اقس ٥٦ الى قسمين يكون حاصلها ٦٤٠

الجواب ٢ و ٥٤

الجواب ٤٠ و ١٦

(١٦) رجل اشترى اثواباً ثمنها ٦٧٥ ديناراً. ثم باع كل ثوبٍ بثمانية واربعين ديناراً ورجح مبلغاً يماثل ثمن الثوب الاصلي. فكم ثوباً اشترى الجواب ١٥

(١٧) رجل اشترى فرساً بمبلغ من المال ثم باعه بمائة وتسعة عشر ديناراً ورجح في المائة ما يماثل الثمن الاصلي فكم كان ثمنه

ك = الثمن فيكون ك ايضاً الربح في المائة و $\frac{ك}{١٠٠}$ الربح كله

$$فلنا ك + \frac{ك}{١٠٠} = ١١٩ \quad ك = ٧٠$$

(١٨) رجل اشترى اثواباً بمبلغ ١٨٠ ديناراً. ولو زيد ثلثة اثوابٍ لانحط ثمن الثوب ثلثة دانابر. فكم ثوباً اشترى الجواب ١٢

(١٩) تاجران تشاركا وكان راس مالها ١٠٠ دينار. وبقيت حصة احدها في الشركة ثلثة اشهر وحصة الاخر شهرين. ثم انفصحت الشركة فحصل لكل واحدٍ منها من راس المال والربح ٩٩ ديناراً. فكم وضع كل واحدٍ من راس المال في الاصل

لنفرض ك = حصة الاول و ١٠٠ - ك حصة الثاني. فيكون ربح الاول ٩٩ - ك لثلاثة اشهر وك - ١ = ربح الثاني لشهرين ولو بقي راس مالٍ ثلثة اشهر لكان ربحه $\frac{٢ - ك}{٣}$ ولكن الربح هو ك راس المال. فلنا ك : ٩٩ - ك :: $\frac{٢ - ك}{٣}$: ١٠٠ - ك

$$ك = ٤٥ = الاول \quad الثاني = ٥٥$$

(٢٠) نزلت امراتان الى السوق ومع كل واحدةٍ منها عدد من البيض خلاف ماع الاخرى ولكن الجميع ١٠٠ بيضة. فباعت كل واحدةٍ ماعها بثمنٍ واحد. فقالت احدها للاخرى لو كان معي من البيض قدر ما معك لاخذت ثمنه ١٥ غرشاً. وقالت الاخرى لو كان معي قدر ما معك لاخذت ٦٤ غرش. فكم بيضة كان مع كل واحدةٍ منها لنفرض ماع الاولى = ك وما مع الاخرى ١٠٠ - ك. وبما ان الاولى كانت

$$قد باعت ١٠٠ - ك بثمن ١٥ غرشاً لنا (١٠٠ - ك) : ١٥ :: ك : ١٥ \quad ك = ١٠٠$$

والثانية كانت باعت ك بثمن ٦٤ غرش لنا

$$ك : (١٠٠ - ك) :: \frac{٢٠}{٣} : \frac{٢٠٠٠ - ٢٠}{ك}$$

ثم ان كل واحدة احدث مبلغًا واحدًا فلنا

$$\frac{١٥ ك}{١٠٠ - ك} = \frac{٢٠٠٠ - ٢٠}{ك}$$

ك = ٤٠ = الاولى ٦٠ = الثانية

(٢١) تاجران باعا اذرعًا من قاشٍ يبلغ ٢٥ دينارًا وباع احدهما ٢ اذرع زيادة عن الاخر. فقال له صاحبه لو بعته ما بعته لاخذت ٢٤ دينارًا. فقال وانا لو بعته ما بعته لاخذت ١٢٣ دينار. فكم ذراعًا باع كل واحدٍ منها

ك = ما باعه الاول وك + ٢ = ما باعه الثاني. فيكون

$$\frac{ك ٢٤}{٣ + ك} \text{ ثمن ك اذرع و } \frac{٧٥ + ك ٢٥}{ك ٢} \text{ ثمن ك + ٢ اذرع فلنا}$$

$$٢٥ = \frac{٧٥ + ك ٢٥}{ك ٢} + \frac{ك ٢٤}{٣ + ك}$$

ك = ١٠ ± ٥ = ١٥ او ٥ = الاول

١٨ او ٨ = الثاني

(٢٢) سافر زيد وعبيد قاصدين بلدًا تبعد عنها ١٥٠ ميلًا وكان زيد يقطع من المسافة كل ساعة ٢ اميال زيادة عن عبيد فوصل قبل عبيد بثمان ساعات وعشرين دقيقة. فكم قطع كل واحدٍ منها في الساعة

(٢٣) اي عدد من فضلتها ٦ واذا اضيف ٤٧ الى مضاعف مربع الاصغر

يعدل المجتمع مربع الاكبر الجواب ١٧ و ١١

(٢٤) زيد وعبيد تصدقا على الفقراء كل واحدٍ منها بمبلغ ١٢٠٠ دينار

وكان الذين اعطاهم زيد يزيدون اربعين نفراً عن الذين اعطاهم عبيد غير ان صدقة عبيد لكل واحدٍ كانت تزيد ٥ دنانير عن صدقة زيد. فكم كان عدد الفقراء جميعًا.

زيد = ١٢٠ = عبيد = ٨٠

(٢٥) ما عددان مجتمعهما ١٠ ومجتمع مربعهما ٥٨ الجواب ٧ و ٣

(٢٦) اشترك رجالٌ في شراءِ بستانٍ ثمنه ١٧٥ ديناراً. ثم خرج اثنان من الشركة فلتحق كل واحدٍ من الاخرين ١٠ دنانير زيادة عما كان يلحقه لو بقي الاثنان معهم. فكم كان عددهم اولاً
الجواب ٧

(٢٧) تاجرٌ اشترى اذرعاً من الفاش بستين ديناراً. فاتخذ منها لنفسه ١٥ ذراعاً وباع الباقي باربعة وخمسين ديناراً فرجع في كل ذراعٍ $\frac{1}{10}$ دينار. فكم ذراعاً اشترى وكم كان الثمن
الجواب ٧٥ ذراعاً و $\frac{1}{10}$ دينار ثمن الذراع

(٢٨) سافر زيدٌ من بلفج وعمرو من اخرى قاصدين ان يلتقيا في مكانٍ وكان بين البلدين ٢٤٧ ميلاً. فكان زيدٌ يقطع كل يومٍ ٩ اميال والايام التي سافرا فيها قبل التقاها تزيد ثلاثة ايامٍ عن عدد الاميال التي كان يقطعها عمرو في اليوم. فكم ميلاً سافرا
الجواب زيد = ١١٧ وعمرو = ١٣٠

(٢٩) رجلٌ اشترى ثوبين من الجوخ ثمن الذراع من الواحد يزيد ٤ دراهم عن ثمن الاخر. وكان ثمن هذا الثوب جميعه ٢٦٠ درهماً و ثمن الاخر جميعه ٢٢٠ درهماً ولكنه اطول من الاول بذراعين. فكم ذراعاً كان كل واحدٍ منها وكم ثمن الذراع منه
الجواب الاول ١٨ ذراعاً و ثمن الذراع ٢٠ درهماً والاخر ٢٠ ذراعاً و ثمن الذراع ١٦ درهماً

(٣٠) رجلٌ اشترى ٥٤ رطلاً من الخمر الاصفر و عة ارطال من الخمر الاسود وكان ثمن الرطل من الاول يعدل نصف ارطال الثاني و ثمن الرطل من الثاني اقل من ثمن الرطل من الاول اربعة دراهم. ثم مزجها و باع الرطل من المزج بعشرة دراهم فمخر ٥٧٦ درهماً. فكم كان ثمن الرطل من الاصفر وكم عدد ارطال الاسود
الجواب الرطل من الاصفر = ١٨ درهماً والاسود ٢٦ رطلاً

(٣١) ابي عددٍ اذا طُرِحَ مربعه من ٤٠ و اضيف الى جذر الباقي المالي ١٠ و ضرب المجمع في ٢ و انقسم المحاصل على العدد نفسه يخرج ٤
الجواب ٦

(٣٢) سُئِلَ رجلٌ عن عمره فقال اذا اضيف جذره المالي الى نصفه و طُرِحَ من المجمع ١٢ لا يبقى شيء. فكم كان عمره
الجواب ١٦

(٣٣) رجلٌ اشترى زقين من الخمر ثمنها ٥٨ غرشاً. وفي الواحد منها ٥

رطل زيادة عن الآخر وثن الرطل اقل من $\frac{1}{4}$ عدة ارطال الاصفر بقرشين فكم
رطلاً في كل زقيّ وكم ثن الرطل

الجواب الأكبر = ١٧ والاصغر = ١٢ وثن الرطل = ٢

(٢٤) رجل معه ٢٤ قطعة بعضها فضة وبعضها نحاس. وقيمة القطعة من

الفضة تساوي غروشاً عدد قطع النحاس وقيمة القطعة من النحاس تساوي عدد
قطع الفضة. وقيمة الجميع ٢١٦ غرشاً. فكم عدد القطع

الجواب الفضة = ٦ والنحاس = ١٨

(٢٥) رجل اشترى عدة من الغنم بثمانين ديناراً. ولو اخذ بهذا الثمن أكثر

بما اخذ باربعة روس لانحطّ ثمن الراس ديناراً واحداً. فكم رأساً اشترى

الجواب ١٦

!!

١٤٢ قد تسهل الاعمال الجبرية ولا سيما حل المعادلات بواسطة التعويض

عن عبارات طويلة بحرف واحد. وعند نهاية العمل ترجع العبارة الاصلية. فلو فرض

ك^٢ - ٢ت ك = ك^٢ + $\frac{٢}{٤}$ - ٨٦٦ - ٦٤ + ح تضع ب عوض الجانب

الثاني فتصير ك^٢ - ٢ت ك = ب ثم ك = ت^٢ + ب ثم بترجع

العبارة الاصلية تصير ك = ت^٢ + $\frac{٢}{٤}$ - ٨٦٦ - ٦٤ + ح

ولو فرض ت ك - ٢ك - د = ب ك - ك^٢ - ك

فبالمقابلة والفك تصير ك^٢ + (ت - ب - ١) ك = د

بوضع ح عوض (ت - ب - ١) لنا ك^٢ + ح ك = د

ثم ك = $\frac{٢}{٤} + \frac{٢}{٢} - \sqrt{\frac{٢}{٤} + \frac{٢}{٢}}$

وترجع العبارة الاصلية ك = $\frac{ت - ب - ١}{٢} + \sqrt{\frac{(ت - ب - ١)}{٤} + \frac{٢}{٢}}$



الفصل الثاني عشر

في المسائل المشتملة على مجهولين فاكثر

$$١٤٢ \text{ لنفرض ك + ي = } ١٤$$

$$\text{وايضاً ك - ي = } ٢$$

$$\text{بنقل الياء فيها لنا ك = } ١٤ - ي$$

$$\text{وك = } ٢ + ي \text{ وحسب الاولية الحادية عشرة ان الاشياء المساوية لشي}$$

واحد هي متساوية

$$\text{فاذا } ٢ + ي = ١٤ - ي \text{ وهي معادلة جديدة فيها مجهول واحد فقط}$$

وقد استخرجناها من معادلتين في كل واحدة منها مجهولان. ولنا من ذلك هذ

القاعدة لاخراج احد المجهولين واستخراج معادلة واحدة من اثنتين. وهي ان تستعلم قيم

احد المجهولين في المعادلتين وتبنى المعادلة الجديدة من هاتين القيمتين

(١) ما عددان مجتمعهما ٢٤ والاكبر منها بقدر الاصغر ٥ مرات

$$\text{لنفرض ك = الاكبر و ي = الاصغر}$$

$$(١) \text{ بالشرط الاول ك + ي = } ٢٤$$

$$(٢) \text{ بالشرط الثاني ك = } ٥ ي$$

$$(٣) \text{ بمقابلة الياء في الاولى ك = } ٢٤ - ي$$

$$(٤) \text{ بالمساواة بين (٢) و (٣) } ٥ ي = ٢٤ - ي$$

$$(٥) \text{ بالمقابلة والقسمة } ي = ٤$$

(٢) ما كميّتان مجتمعهما يعدل ح وفضله مربعيهما تعدل د

$$\text{لنفرض ك = اكبرها و ي = اصغرها}$$

$$(١) \text{ بالشرط الاول ك + ي = ح}$$

$$(٢) \text{ بالثاني ك - ي = د}$$

$$(٣) \text{ بمقابلة ي في (٢) ك = د + ي}$$

$$(٤) \text{ بالتجذير ك = } \sqrt{د + ي}$$

$$(٥) \text{ بمقابلة ي في (١) ك - ح = - ي}$$

(٦) بالمساواة بين (٤) و(٥) $\sqrt{د + ٢ي} = ح - ي$

(٧) ولنا $ي = \frac{د - ٢ح}{ح٢}$

(٢) مفروض ت ك + ب = ح
و ك + ي = د

مطلوب قيمة ي $\frac{ح - ت}{ب - ت} =$ الجواب ي

١٤٤ مفروض ك = ح ي

وايضاً ت ك + ب = ك = ي

ونرى هنا قيمة ك في الاولى هي ح ي ويمكننا اذ ذاك ان نعوض عن ك في الثانية بهذه القيمة فتصيرت ح ي + ب ح ي = ي وليس فيها سوى مجهول واحد. ولنا من ذلك هذه القاعدة الثانية لاجراج مجهول. وهي ان نستعلم قيمة احد المجهولين في احدي المعادلتين ونعوض عنه بها في الاخرى

(٤) سفينة جرت على اثار اخرى كانت قد سبقتها ٢٠ ميلاً. وكانت التابعة تجري ٨ اميال كلما جرت السابقة ٧ اميال. فكم ميلاً تجري الاولى قبل ان تترك الاخرى

لنفرض ما تجر به الاولى = ك وما تجر به الاخرى = ي فلنا

(١) بالشروط ك = ي + ٢٠

(٢) بالشروط ك : ي :: ٨ : ٧

(٣) ثم $ي = \frac{٧}{٨} ك$

(٤) بالتعويض عن ي في (١) $ك = \frac{٧}{٨} ك + ٢٠$

(٥) ولنا من ذلك ك = ١٦٠

(٥) سئل كم عمر زيد وعبيد. ف قيل منذ سبع سنين كان عمر زيد ثلاثة امثال عمر عبيد. وبعد سبع سنين يكون عمر مضاعف عمر عبيد. فكم هو عمر عبيد

لنفرض ك = زيد ي = عبيد

ثم ك - ٧ = زيد منذ سبع سنين

ي - ٧ = عيد منذ سبع سنين

ك + ٧ = زيد بعد سبع سنين

ي + ٧ = عيد بعد سبع سنين

(١) بالشرط الاول ك - ٧ = ٢ × (٧ - ي) = ٢١ - ٢ي

(٢) بالثاني ك + ٧ = ٢ × (٧ + ي) = ١٤ + ٢ي

(٣) بمقابلة الاولى ك = ٢ - ١٤

(٤) بالتعويض عن ك في (٢) ١٤ - ٢ي = ٧ + ٢ي

(٥) ولنا من ذلك ي = ٢١ = عمر عيد

(٦) اي عددين نسبة اكبرها الى اصغرهما :: ٢ : ٢ ومجموعهما يعدل

الجواب ١٠ و ١٥ سدس حاصلها

١٤٥ مفروض ك + ٢ = ت

وايضاً ك - ٢ = ب

بجمع المعادلتين ٢ك = ت + ب

وليس فيها سوى مجهول واحد

مفروض ٢ك + ٢ = ح

وايضاً ٢ك + ٢ = د

بالطرح ك = ح - د

فقد اخرجت ي

مفروض ك - ٢ = ت

و ك + ٤ = ب

بضرب الاولى في ٢ ٢ك - ٤ = ٢ت

ثم يجمع الثانية والثالثة ٢ك = ب + ٢ت

فلنا من ذلك قاعدة ثالثة لاخراج مجهول. وهي ان تضرب احدى المعادلات او تقسمها حتى يكون احد الاجزاء المشتملة على المجهول يعدل جزءاً من الاخرى. ثم تجمع المعادلتين او تطرح الواحدة من الاخرى حتى ينفني جزءاً من الواحدة جزءاً من الاخرى

(٧) عسكران مجتمع انفارهما ٢١١١٠ ومضاعف أكبرهما مع ثلاثة امثال اصغرها يعدل ٥٢٢١٩ فكم عدد أكبرهما

لنفرض ك = الأكبر وى = الأصغر

(١) بالشرط الاول $٢١١١٠ = ك + ٢١١٠$

(٢) بالثاني $٥٢٢١٩ = ٢ك + ٢١١٠$

(٣) اضرب (١) في ٢ $٦٢٢٢٠ = ٢ك + ٤٢٢٠$

(٤) اطرح (٢) من (٣) $١١١١١ = ك$

(٨) مفروض $٢ك + ٢١١٠ = ١٦٠٠$ و $٢ك - ٢١١٠ = ٦٠٠$ مطلوب قيمة ك

(١) بالفرض الاول $١٦٠٠ = ٢ك + ٢١١٠$

(٢) بالثاني $٦٠٠ = ٢ك - ٢١١٠$

(٣) اضرب (١) في ٢ $٤٨٠٠ = ٤ك + ٤٢٢٠$

(٤) يجمع (٢) و (٣) $٥٤٠٠ = ٦ك$

$٩٠٠ = ك$

(٩) مفروض $ك + ١٤٠٠ = ١٤٠٠$ و $ك - ٢٠٠ = ٢٠٠$ مطلوب قيمة ى

الجواب $٦٠٠ = ى$

(١٠) في عمود ذي قطعتين اذا اضيف $\frac{1}{٦}$ القطعة السفلى الى $\frac{1}{٦}$

القطعة العليا يكون المجتمع ٢٨ واذا طُرِحَ ٦ امثال القطعة العليا من

٥ امثال القطعة السفلى يبقى ١٢ فما هو طول العمود

لنفرض ك = القطعة السفلى وى = العليا

(١) بالشرط الاول $٢٨ = ك + \frac{1}{٦}$

(٢) بالثاني $١٢ = ٥ك - ٦٠٠$

(٣) بضرب (١) في ٦ $١٦٨ = ٦ك + ١$

(٤) بقسمة (٣) على (٢) $\frac{١}{٦} = ك - ٢٠٠$

(٥) بجمع (٢) و(٤) $١٧٠ = ٣ك + ٦ = ١٧٠$

(٦) بالجبر والجمع $١٠٢٠ = ١٧ك$

(٧) بالقسمة $ك = ٦٠ =$ السفلى

ثم بالتعويض عن ك في (٢)

$١٢٠ = ١٦٨ = ٤٨ = ٤٨ =$ العليا

(١١) لتنا ان نجد كسراً اذا اضيف واحد الى صورته يعدل الكسر

$\frac{1}{٣}$ وان اضيف واحد الى مخرجه يعدل الكسر $\frac{1}{٤}$

لنفرض $ك =$ الصورة و $و =$ المخرج

(١) بالشرط الاول $\frac{1}{٣} = \frac{١ + ك}{و}$

(٢) بالثاني $\frac{1}{٤} = \frac{ك}{١ + و}$

$ك = ٤ =$ الصورة $و = ١٥ =$ المخرج

(١٢) اي عدد ين نسبة فضلها الى مجموعها :: ٢ : ٣ ونسبة مجموعها الى

حاصلها :: ٣ : ٥ الجواب ١٠ و ٢

(١٣) ما عددان حاصل مجتمعهما في فضلها يعدل ٥ وحاصل مجتمعهما

في فضلة مربعها يعدل ٦٥

لنفرض $ك =$ الاكبر $و =$ الاصغر

(١) بالشرط الاول $٥ = (و - ك) \times (و + ك)$

(٢) بالثاني $٦٥ = (ك + و) \times (ك - و)$

(٣) بضرب الاولى $٥ = و - ك$

(٤) بقسمة (٢) على (٣) $١٣ = و + ك$

(٥) بجمع (٣) و(٤) $١٨ = ٢ك$

(٦) $ك = ٩ = ٩ = و = ٩$

(١٤) اي عدد ين فضلها ٨ وحاصلها ٢٤٠

(١٥) ما عددان فضلتهما ١٢ ومجموع مربعيها ١٤٢٤

لنفرض أكبرها = ك واصغرهما = ي

$$(١) \text{ بالشرط الاول } ك - ي = ١٢$$

$$(٢) \text{ بالثاني } ك + ي = ١٤٢٤$$

$$(٣) \text{ بمقابلة } (١) \text{ في } ك = ي + ١٢$$

$$(٤) \text{ بتربيع الجانبين } ك = ي + ١٢ \Rightarrow ك^2 = ي^2 + ٢٤ ي + ١٤٤$$

$$(٥) \text{ بمقابلة } (٢) \text{ في } ك = ي + ١٢ \Rightarrow ك^2 - ١٤٢٤ = ي^2 + ٢٤ ي + ١٤٤ - ١٤٢٤$$

$$(٦) \text{ بالمساواة بين } (٤) \text{ و } (٥) \text{ } ك^2 - ١٤٢٤ = ي^2 + ٢٤ ي + ١٤٤ - ١٤٢٤$$

$$ك = ٢٠ \quad ي = ٣٢$$

(١٦) انقسمت تركة بين عدة ورثة بحيث كان للاول ١٠٠ غرش وعشر

الباقى. وللثاني ٢٠٠ غرش وعشر الباقى. وللثالث ٣٠٠ غرش وعشر الباقى.

وللرابع ٤٠٠ غرش وعشر الباقى وهم جراً. فوجد ان التركة قد انقسمت بينهم

بالسوية فكم كانوا وكل حصه كل واحد منهم

لنفرض التركة ي وكل حصه كل واحد فاذا يكون $\frac{ي}{٤}$ عدة الورثة

$$\text{فلنا حصه الاول } ك = ١٠٠ + \frac{١٠٠ - ي}{٤}$$

ويبقى ي - ك

$$\text{فتكون حصه الثاني } ك = ٢٠٠ + \frac{٢٠٠ - ي - ك}{٤}$$

ويبقى ي - ٢ ك

$$\text{وحصه الثالث } ك = ٣٠٠ + \frac{٣٠٠ - ي - ٢ ك}{٤}$$

وهلم جراً وبطرح حصه الاول من حصه الثاني

$$\text{لنا } ١٠٠ - ك = \frac{١٠٠ - ي - ك}{٤} \text{ وهكذا ان طرح الثاني من الثالث}$$

والثالث من الرابع وهلم جراً

فلنأخذ هذه المعادلة $١٠٠ - \frac{ك}{١٠} = ١٠٠$

ك = ٢٠٠ حصة كل واحد ثم بالتعويض عن ك لنا $٩٠٠ = ١٠٠$

$$\frac{١٠٠ - ي}{١٠}$$

ي = ١٠٠ التركة $\frac{ي}{ك} = ٩ =$ عدد الورثة

(١٧) اي عدد من فضلتهما ١٥ ونصف حاصلها يعدل كعب اصغرها

الجواب ٣ و ١٨

(١٨) اي عدد من مجموعها ١٠٠ وحاصلها ٢٠٥٩

الجواب ٧١ و ٢٩

(١٩) اقسام ٢٦ الى ثلاثة اقسام بحيث يزيد كل قسم على ما قبله اربعة ويكون

الجواب ٨ و ١٢ و ١٦

مجموع مربعاتها ٤٦٤

(٢٠) قال حمار لبغل لو زيد على حملي رطل من حملك لكان وزنه مضاعف

وزن حملك. فقال البغل ولو زيد على حملي رطل من حملك لصار ثلاثة امثال

حملك. فكم رطلا كانا حاملين

ك = البغل ي = الحمار

لو زيد على حمل الحمار رطل من حمل البغل لكان ي + ١ وبقي للبغل ك - ١

وكان حمل الحمار مضاعف حمل البغل اي ي + ١ = ٢ ك - ٢

وان زيد على حمل البغل لنا ك + ١ = ٢ ي - ٢

$$ك = ٢ \frac{٢}{٥} \quad ي = ٢ \frac{١}{٥}$$

١٤٦ مفروض ك + ي + ل = ١٢

وايضاً ك + ٢ ي - ٢ ل = ١٠

وايضاً ك + ي - ل = ٤

لنا ان نجد قيمة ك وي ول

بالمقابلة لنا من الاولى ك = ١٢ - ي - ل

من الثانية ك = 10 - 2ي + 2ل

من الثالثة ك = 4 - ي + ل

بالمساواة بين الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة لنا

$$12 - ي - ل = 10 - 2ي + 2ل$$

$$\text{وايضاً } 10 - 2ي + 2ل = 4 - ي + ل$$

بالمقابلة لنا من الاولى $2 - ل = ي$

ومن الثانية $ي = ل + 6$

بالمساواة بين هاتين $2 - ل = ل + 6$ $ل = 4$

فلنا من ذلك هذه القاعدة لحل مسئلة فيها ثلاثة مجهولات فاكثر

وهي ان تستخرج من المعادلات الثلاث معادلتين فيها مجهولان فقط. وتستخرج

من هاتين واحدة فيها مجهول واحد فقط

$$(21) \text{ مفروض (1) } ك + 5ي + ل6 = 52$$

$$\text{ايضاً (2) } ك + 2ي + 2ل = 20$$

$$\text{ايضاً (3) } ك + ي + ل = 12$$

المطلوب قيمة ك وى ول

$$(4) \text{ بطرح الثانية من الاولى } 22 = 2ل + 3ي$$

$$(5) \text{ بطرح (2) من (3) } 18 = 2ل + 2ي$$

$$(6) \text{ بطرح (5) من (4) } 4 = ل$$

ثم لكي نجد ك وى نعوض عن ل بقيمتها ونحول المعادلات كما تقدم

$$\text{فلنا في (5) } 18 = 10 + 2ي \quad 8 = 2ي \quad 4 = ي$$

$$\text{وفي (3) } 12 = 5 + 4 + ك \quad 3 = ك$$

(22) لنا ان نجد قيمة ك وى ول من هذه المعادلات

$$(1) \text{ مفروض } 12 = ك + ي + ل$$

$$(2) \text{ ايضاً } 20 = ك + 2ي + 2ل$$

$$(3) \text{ ايضاً } 6 = ك + 2ي + ل$$

$$(4) \text{ اضرب الاولى في 2 } 24 = 2ك + 4ي + 2ل$$

(5) اطرح (2) من (4) $16 = 2ك + 1ي$

(6) اطرح (3) من (1) $6 = 2ك + 1ي$

(7) بالجبير $26 = 2ك + 1ي$

(8) اضرب (5) في 2 $32 = 4ك + 2ي$

(9) بطرح (7) من (8) $6 = 2ك$ $12 = 4ك$

(10) بنحويل (7) $4 = 2ي$

(11) بنحويل (1) $2 = 1ي$

(22) مفروض (1) $ك + 1ي = ت$

(2) $ك + 1ل = ب$

(3) $1ي + 1ل = س$

لنا ان نجد ك و ي و ل

الجواب $ك = \frac{ت + ب - س}{2}$ $ي = \frac{ت + س - ب}{2}$ $ل = \frac{ب - س + ت}{2}$

$\frac{ب + س - ت}{2}$

(24) زيد وعبيد وبكو نشاركوا في شراء فرس ثمنه مائة دينار. فلو أخذ ما مع زبيد ونصف ما مع عبيد كان المجموع ثمن الفرس. او لو أخذ ما مع عبيد وثالث ما مع بكر لكان المجموع ثمن الفرس. او لو أخذ ما مع بكر ورابع ما مع زيد لكان المجموع ثمن الفرس. فكم كان مع كل واحد منهم

لنفرض $ك = زيد$ $ي = عبيد$ $ل = بكر$

(1) بالشرط الاول $100 = 1ك + 1ي$

(2) بالثاني $100 = 1ك + 1ل$

(3) بالثالث $100 = 1ك + 1ل$

$ك = 64$ $ي = 72$ $ل = 84$

(25) ثلاثة رجال اشتروا كراما بمائة دينار. فلو أخذ ما مع الاول ونصف ما مع الثاني كان المجموع ثمن الكرم. ولو أخذ ما مع الثاني وثالث ما مع الثالث كان المجموع ثمن الكرم. ولو أخذ ما مع الثالث ورابع ما مع الاول كان المجموع ثمن الكرم.

فكم ديناراً مع كل واحداً منهم

الجواب الاول = ٦٤ الثاني = ٧٢ الثالث = ٨٤ ديناراً

(٢٦) ملك عنده ثلاث كتائب من العساكر احداها اترك والثانية عرب
والثالثة اعجم. فامر ان تهجم احدى الطوائف على قلعة ووعده ان يعطي الجميع ٩٠١
من الدنانير غير انه يعطي كل نفر من الطائفة الهاجمة ديناراً واحداً ويوزع ما بقي على
الطائفتين الاخرتين بالمساواة. فلو هجمت الاترك لاصاب كل نفر من الاخرين
نصف دينار. ولو هجمت العرب لاصاب كل نفر من الاخرين ثلث دينار. ولو هجمت
الاعجم لاصاب كل نفر من الاخرين ربع دينار. فكم نفراً كان في كل طائفة

لنفرض الاترك = ك والعرب = ي والاعجم = ل

ولنفرض ك + ي + ل = س اي مجموع الثلاثة. فان هجمت الاترك فلنا البقية
= س - ك وللاترك دينار واحد لكل نفر. وللبقية نصف دينار لكل نفراي ك +
ل = س - ك وان هجمت العرب فلنا ي + ل = س - ك وان هجمت الاعجم فلنا ل = س - ك
٩٠١ = س - ك = ١/٣ ك = ٩٠١ وان هجمت العرب فلنا ي + ل = س - ك = ١/٣ ي = ٩٠١
٩٠١ = س - ك = ١/٤ ك = ٩٠١ وان هجمت الاعجم فلنا ل = س - ك = ١/٤ ل = ٩٠١
ك = ٢٦٥ ي = ٥٨٢ ل = ٦٨٩

(٢٧) زيد وعمرو وبكر سافروا الى جهات مختلفة. وكان مجتمع اسفارهم ٦٢
ميلاً. وكان سفر زيد اربعة امثال سفر بكر مع مضاعف سفر عمرو. و١٧ مثل سفر
بكر تعدل مضاعف سفر زيد مع ثلاثة امثال سفر عمرو. فكم ميلاً سافر كل واحد منهم

زيد = ٤٦ عمرو = ٩ بكر = ٧

(٢٨) لئان نجد قيمة ك وي ول من هذه المعادلات

$$٦٢ = ل + \frac{١}{٣} ي + \frac{١}{٤} ك$$

$$٤٧ = ل + \frac{١}{٤} ي + \frac{١}{٣} ك$$

$$٢٨ = ل + \frac{١}{٥} ي + \frac{١}{٤} ك$$

الجواب ك = ٢٤ ي = ٦٠ ل = ١٢٠

(٢٩) مفروض كى = ٦٠٠ كل = ٢٠٠

ل = ٢٠٠ مطلوب قيمة ك ول وى

ك = ٢٠ وى = ٢٠ ل = ١٠

١٤٧ على هذه الكيفية نحل اربع معادلات فاكثر. ابي نستخرج من الاربع ثلاثاً ومن الثلاث اثنتين وهلم جراً

(٣٠) لئان نجد قيمة ك وى ول ون من هذه المعادلات

اربع معادلات { (١) مفروض $\frac{1}{3} ك + ل + \frac{1}{3} ن = ٨$
 (٢) مفروض $ك + وى + ن = ٩$
 (٣) مفروض $ك + وى + ل = ١٢$
 (٤) مفروض $ك + ن + ل = ١٠$

ثلاث معادلات { (٥) بجبر الاولى $١٦ = ن + ل + وى$
 (٦) بطرح (٢) من (٣) $٢ = ن - ل$
 (٧) بطرح (٤) من (٣) $٢ = ن - وى$

معادلتان { (٨) بجمع (٥) و (٦) $١٩ = ل + وى$
 (٩) بطرح (٧) من (٦) $١ = ل - وى$

الكميات المطلوبة { (١٠) بجمع (٨) و (٩) $٥ = ل ٢٠ = ل + وى$
 (١١) بمقابلة (٨) $٤ = ل - وى$
 (١٢) بمقابلة (٣) $٢ = ل - وى - ١٢ = ك$
 (١٣) بمقابلة (٢) $٢ = وى - ك - ٩ = ن$

مطلوب ك وى ول ون { (٣١) مفروض $ن + ٥ = ك$
 $ك + ٢ = ١٢٠ = وى$
 $ل + ٢ = ١٢٠ = وى$
 $ل + ٢ = ١٩٥ = ن$

ن = ١٠٠ ك = ١٥٠ وى = ٩٠ ل = ١٠٥

(٢٢) مطلوب عدد ذورقين احدهما في منزلة الآحاد والاخر في منزلة العشرات .
الذي في منزلة العشرات يعدل ثلاثة امثال الاخر . واذا طُرِحَ ١٢ من العدد نفسه
يعدل الباقي منه مربع الرقم الذي في منزلة العشرات

لنفرض ك = الذي في منزلة العشرات وى = الذي في منزلة الاحاد . فوقع
ك في منزلة العشرات يزيد عشرة امثال ما كان لو وقع في منزلة الاحاد . فلنا اذا
١٠ ك = العدد

وبشروط المسئلة ك = ٣ ى

وايضاً ١٠ ك + ى = ١٢ = ك

ك = ٩٣

(٢٣) مطلوب ثلاثة اعداد يكون الاول مع نصف الاخرين ٢٤ والثاني مع
ثلث الاخرين ٢٤ والثالث مع ربع الاخرين ٢٤ الجواب ١٠ و ٢٢ و ٢٦

(٢٤) مطلوب عدد ذورقين مجتمعهما ١٥ واذا اضيف ٢١ الى حاصلهما تنقلب
رتبة الرقين اي ان الذي كان في منزلة الاحاد يصير في منزلة العشرات وبالعكس
الجواب ٧٨

(٢٥) اي عدد ذي رقين اذا انقسم على حاصل رقيه يخرج اثنان . واذا اضيف
٢٧ الى العدد نفسه تنقلب رتبة رقيه الجواب ٢٦

(٢٦) ما عدان اذا طُرِحَ الاصغر من ثلاثة امثال الاكبر يبقى ٢٥ واذا انقسم
اربعه امثال الاكبر على ثلاثة امثال الاصغر مع واحد يكون الخارج نفس العدد
الاصغر الجواب ١٢ و ٤

(٢٧) اي كسر اذا اضيف ٢ الى صورته تكون قيمته $\frac{1}{3}$ واذا طُرِحَ
واحد من مخرجه تكون قيمته $\frac{1}{6}$ الجواب $\frac{4}{31}$

(٢٨) رجل لهُ فرسان وسرج قيمته ١٠ دنانير . فاذا وُضِعَ السرج على الفرس
الاول تكون قيمته مضاعف قيمة الفرس الثاني . واذا وُضِعَ على الثاني تكون قيمته اقل
من قيمة الاول بثلاثة عشر ديناراً . فكم قيمة الفرسين الجواب ٥٦ و ٢٢ ديناراً

(٣٩) اقسام ٩٠ الى اربعة اقسام بحيث اذا اضيف الى الاول ٢ وطرح من الثاني ٢ وضرب الثالث في ٢ وانقسم الرابع على ٢ تكون الاقسام كلها متساوية

لفرض ثلاثة اقسام ك وى ول فيكون الرابع ٩٠ - ك - ي - ل

$$\text{فلنا ك} + ٢ = ٢ - \text{ى}$$

$$\text{و ك} + ٢ = ٢$$

$$\text{وآل} = \frac{٩٠ - \text{ك} - \text{ى} - \text{ل}}{٢}$$

الجواب ١٨ و ٢٢ و ١٠ و ٤٠

(٤٠) ما ثلاثة اعداد يكون الاول منها مع نصف مجموع الثاني والثالث ١٢٠

والثاني مع ١/٥ فضلة الثالث والاول ٧٠ ونصف مجموع الثلاثة ٩٥

(٤١) ما عدد ان النسبة بين فضلتهما ومجموعهما وحاصلهما كالنسبة بين

الجواب ١٠

٣ و ٥

(٤٢) رجل باع ٢٠ رطلاً من الخمر الاسود و ٣٠ رطلاً من الاصفر وكان

ثمن الجميع ١٢٠ غرشاً. ثم باع ٢٠ رطلاً من الاسود و ٢٥ رطلاً من الاصفر بالسعر

الاول وبلغ ثمن الجميع في المرة الثانية ١٤٠ غرشاً. فكم كان ثمن الرطل من كل صنف

الجواب الاسود = ٢ غروش والاصفر = غرشين

(٤٣) رجل مزج خمراً بماء ولوزاد من كل صنف ٦ ارطال لكان في المزج

٧ ارطال من الخمر لكل ٦ ارطال من الماء. ولو نقص من كل صنف ٦ ارطال

لكان في المزج ٦ ارطال خمر لكل ٥ ارطال ماء. فكم رطلاً مزج من كل صنف

الجواب الخمر = ٧٨ والماء ٦٦ رطلاً

(٤٤) اي كسر اذا تضاعفت صورته واضيف ٧ الى مخرجه تكون قيمته ٢

وإذا تضاعف المخرج واضيف ٢ الى صورته تكون قيمته ١/٥

الجواب ١/٥

(٤٥) رجل اشترى من التفاح والليمون بثلاثين غرشاً. وكان كل اربع

تفاحات بغرش وكل خمس ليمونات بغرش ايضاً. ثم باع نصف التفاح و ١/٣ الليمون

بسعر ما اشترى فبلغ الثمن ١٢ غرشاً فكم اشترى من كل صنف

الجواب التفاح = ٧٢ والليمون = ٦٠

١٤٨ متى وجدك^اى^ا او كى^ا فى كل جزء من المعادلتين تكونان على

$$\text{احدى هاتين الهيئين } ت ك^ا + ب ك^ا + س ي^ا = د$$

$$ت ك^ا + ب ك^ا + س ي^ا = د$$

ولحلها افرض ك = ف ي اذا ك = ف ي^ا

وبالتعويض عن ك^ا وك^ا فى المعادلتين لنا

$$\frac{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا = د}{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا} = \frac{د}{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا}$$

$$\frac{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا = د}{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا} = \frac{د}{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا}$$

وبالمساواة بين هاتين لنا

$$\frac{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا = د}{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا} = \frac{د}{ت ف^ا ي^ا + ب ف^ا ي^ا + س ي^ا}$$

$$(ت د - ت د) ف^ا + (ب د - ب د) ف = س د - س د \text{ وهي معادلة}$$

مربعة محل بالتمام التربيع كما تقدم

$$(١) \text{ مفروض } ٢ ك^ا + ٢ ك^ا + ٢ ك^ا = ٢٠$$

$$٤١ = ٤ ك^ا + ٤ ك^ا$$

افرض ك = ف ي ثم بالتعويض لنا

$$\frac{٢٠}{١ + ٢ + ٢} = ي^ا \quad ٢٠ = ي^ا + ٢ ي^ا + ٢ ي^ا$$

$$\frac{٤١}{٤ + ٢} = ي^ا \quad ٤١ = ي^ا + ٤ ي^ا$$

$$\frac{٤١}{٤ + ٢} = \frac{٢٠}{١ + ٢ + ٢}$$

$$\frac{١}{٣} \text{ او } \frac{١٢}{٣} = ف - ١٢ = ف - ٤١$$

ثم بالتعويض عن ف لنا

$$٩ = \frac{٢٦٩}{٤١} = \frac{٤١}{٤ + \frac{١}{٣}} = \frac{٤١}{٤ + \frac{١}{٣}} = ي^ا \quad \frac{١}{٣} = ف$$

$$١ = ٢ \times \frac{١}{٣} = ف ي = ك \quad ٢ = ي$$

(٢) ما عددان اذا ضرب مجتمعهما في اكبرها يصل ٧٧ واذا ضربت فضلتهما

في اصغرهما يحصل ١٢

لنفرض ك = اكبرها وى = اصغرهما

فلنا ك + كى = ٧٧

و كى - كى = ١٢

لنفرض ك = فى فلنا فى + فى = ٧٧ كى = فى - ١٢

وايضاً فى - فى = ١٢ كى = فى - ١٢

بالمساواة $\frac{٧٧}{١٢} = \frac{٧٧}{١٢}$ ف = $\frac{١١}{٣}$ او $\frac{٧}{٤}$

ك = ٧ ي = ٤

(٢) اي عددين فضلة مربعيهما ٥٦ ومجتمع مربع اصغرهما مع $\frac{١}{٣}$

الجواب ٩ و٥

حاصلها ٤٠

(٤) اي عددين ثلاثة امثال مربع اكبرها مع مضاعف مربع اصغرهما = ١١٠

الجواب ٦ و٤

ونصف حاصلها مع مربع الاصغر = ٤

١٤٩ متى ترقي الجهولان الى قوة واحدة لا تنحل المعادلة حسبنا تقدم بل

نستعمل طريقة اخرى نوضحها هنا وعليها نحل كل مسألة واقعة تحت هذه القضية .

وهي مفروض مجتمع عددين ومجتمع القوة التونية منها لنا ان نجد العددين على

شرط ان لا يتجاوز القوة التاسعة

مفروض كيتان اكبرها ك واصغرهما ي

مفروض ايضا ك + كى = ٢ س ك - كى = ٢ ل

ثم بالجمع ك = س + ل وبالطرح كى = س - ل

ثم لنفرض ك = كى + ٢ ت ك + كى = ٢ ب

ك + كى = ر ك + كى = د وهلم جراً فنجد قيمة ك وى في اجزاء من المعلومات

ث ب ر د س على هذا الاسلوب

$$(١) \text{ك} = (\text{ل} + \text{س}) = \text{س}^٢ + \text{س} \text{ل} + \text{ل}^٢$$

$$\text{ى} = (\text{ل} - \text{س}) = \text{س}^٢ - \text{س} \text{ل} + \text{ل}^٢$$

$$\text{بالمجموع ك} + \text{ى} = \text{أى ت} = \text{س}^٢ + \text{ل}^٢ \quad \text{ل} = \frac{\text{ت} - \text{س}^٢}{٢}$$

$$\text{ل} = \sqrt{\frac{\text{ت} - \text{س}^٢}{٢}} + \text{س} = \text{ك} \text{ أى كوى اى كى}$$

$$\text{ى} = \text{س} - \sqrt{\frac{\text{ت} - \text{س}^٢}{٢}}$$

$$(٢) \text{ك} = (\text{ل} + \text{س}) = \text{س}^٢ + \text{س} \text{ل} + \text{ل}^٢ + \text{ل}^٢ + \text{س} \text{ل} + \text{س}^٢$$

$$\text{ى} = (\text{ل} - \text{س}) = \text{س}^٢ - \text{س} \text{ل} + \text{ل}^٢ + \text{ل}^٢ + \text{س} \text{ل} - \text{س}^٢$$

$$\text{ك} + \text{ى} = \text{أى ب} = \text{س}^٢ + \text{ل}^٢$$

$$\text{ل} = \frac{\text{ب} - \text{س}^٢}{\text{س}^٢ - \text{ل}^٢} \quad \text{ل} = \sqrt{\frac{\text{ب} - \text{س}^٢}{\text{س}^٢ - \text{ل}^٢}}$$

فلنا قيمة كوى بالتعويض اى

$$\text{ك} = \text{س} + \sqrt{\frac{\text{ب} - \text{س}^٢}{\text{س}^٢ - \text{ل}^٢}} \quad \text{ى} = \text{س} - \sqrt{\frac{\text{ب} - \text{س}^٢}{\text{س}^٢ - \text{ل}^٢}}$$

$$(٣) \text{ك} = (\text{ل} + \text{س}) = \text{س}^٤ + \text{س}^٣ \text{ل} + \text{س}^٢ \text{ل}^٢ + \text{س} \text{ل}^٣ + \text{ل}^٤$$

$$\text{ى} = (\text{ل} - \text{س}) = \text{س}^٤ - \text{س}^٣ \text{ل} + \text{س}^٢ \text{ل}^٢ - \text{س} \text{ل}^٣ + \text{ل}^٤$$

$$\text{ك} + \text{ى} = \text{أى م} = \text{س}^٤ + \text{س}^٣ \text{ل} + \text{س}^٢ \text{ل}^٢ + \text{ل}^٤ \quad \text{وهي معادلة مربعة}$$

يُستعمل منها قيمة ل كما تقدم ثم يُعوض بها عن كوى

$$(٤) \text{ك} = (\text{ل} + \text{س}) = \text{س}^٥ + \text{س}^٤ \text{ل} + \text{س}^٣ \text{ل}^٢ + \text{س}^٢ \text{ل}^٣ + \text{س} \text{ل}^٤ + \text{ل}^٥$$

$$\text{ل} + \text{س}^٥ + \text{س}^٤ \text{ل} + \text{س}^٣ \text{ل}^٢ + \text{س}^٢ \text{ل}^٣ + \text{س} \text{ل}^٤ + \text{ل}^٥$$

$$\text{ى} = (\text{ل} - \text{س}) = \text{س}^٥ - \text{س}^٤ \text{ل} + \text{س}^٣ \text{ل}^٢ - \text{س}^٢ \text{ل}^٣ + \text{س} \text{ل}^٤ - \text{ل}^٥$$

$$\text{س}^٥ \text{ل} - \text{ل}^٥ + \text{ك} + \text{ى} = \text{أى د} = \text{س}^٥ + \text{س}^٣ \text{ل}^٢ + \text{س} \text{ل}^٤ + \text{ل}^٥ \quad \text{وهي}$$

معادلة مربعة تُستعمل منها قيمة ل ثم قيمة كوى كما تقدم

$$١٥٠ \text{ مفروض ك} + \text{ى} = \text{س}^٢ \text{ وك} - \text{ى} = \text{ل}^٢$$

$$\text{ثم لنفرض } \text{ت} = \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}} \quad \text{ب} = \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}}$$

$$\text{ر} = \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}} \quad \text{د} = \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}}$$

ثم بواسطة المعادلات المتقدمة (١٤٩) نجد قيمة ك وي في اجزاء من المعلومات
س ت ب ر د

$$(1) \quad \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}} = \text{ت} = \text{ك} + \text{ي} \quad \text{ت} = \text{ك} \text{ ي} \times (\text{س} + \text{ل})$$

$$\times (\text{س} - \text{ل}) = \text{ت} \times (\text{س} - \text{ل})$$

وحسب (١٤٩) (١) لنا $\text{ك} + \text{ي} = \text{س}^2 + \text{ل}^2$

فاذا $\text{ت} = \text{س}^2 - \text{ل}^2$

$$\frac{\text{ل} \times (\text{ت} - \text{س}^2)}{\text{ت} + \text{س}^2} = \text{ل} \quad \frac{\text{ل} \times (\text{ت} - \text{س}^2)}{\text{ت} + \text{س}^2} = \text{ل}$$

$$\text{ثم ك} = \text{س} + \frac{\text{ل} \times (\text{ت} - \text{س}^2)}{\text{ت} + \text{س}^2}$$

$$\text{ي} = \text{س} - \frac{\text{ل} \times (\text{ت} - \text{س}^2)}{\text{ت} + \text{س}^2}$$

$$(2) \quad \text{ب} = \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}} \quad \text{ب} = \text{ك} + \text{ي} \quad \text{ب} = \text{ك} \text{ ي}$$

$$(\text{س} - \text{ل})$$

حسب (١٤٩) (٢) لنا $\text{ك} + \text{ي} = \text{س}^2 + \text{ل}^2$ اي $\text{ب} = (\text{س} - \text{ل})$

$$= \text{س}^2 + \text{ل}^2$$

$$\frac{\text{ل} \times (\text{ب} - \text{س}^2)}{\text{ب} + \text{س}^2} = \text{ل} \quad \frac{\text{ل} \times (\text{ب} - \text{س}^2)}{\text{ب} + \text{س}^2} = \text{ل}$$

$$\text{ك} = \text{س} + \frac{\text{ل} \times (\text{ب} - \text{س}^2)}{\text{ب} + \text{س}^2} \quad \text{ي} = \text{س} - \frac{\text{ل} \times (\text{ب} - \text{س}^2)}{\text{ب} + \text{س}^2}$$

$$(3) \quad \text{ر} = \frac{\text{ك}}{\text{ي}} + \frac{\text{ي}}{\text{ك}} \quad \text{ر} = \text{ك} + \text{ي} \quad \text{ر} = \text{ك} \text{ ي} \times (\text{س} - \text{ل})$$

ثم حسب (١٤٩) (٣) لنا

$$ك^٤ + ي^٤ = ٢س^٤ + ١٢س^٢ل + ل^٤ \quad \text{إذا}$$

ر (س - ل) = ٢س^٤ + ١٢س^٢ل + ل^٤ وهي معادلة مربعة
 نستعلم منها قيمة ل وكذلك قيمة ك وى حسبنا تقدم

$$(٤) \quad د = \frac{ك^٤}{ك} + \frac{ي^٤}{ي} = د^٤ ك ي = د(س - ل)$$

وحسب (١٤٩) (٤) لنا ك^٤ + ي^٤ = ٢س^٤ + ١٢س^٢ل + ل^٤
 إذا ٢س^٤ + ١٢س^٢ل + ل^٤ = د(س - ل) وهي معادلة مربعة
 نستعلم منها قيمة ل كما تقدم

١٥١ مفروض ك + ي = س ك ي = ف

فنجيد قيمة اية قوة فُرِضَتْ من ك وى في اجزاء من المعلومتين س وف هكذا

$$(١) \quad ك + ٢ك ي + ي = س$$

$$ك + ي = س - ٢ك ي = س - ٢ف$$

$$(٢) \quad (ك + ي) (ك + ي) = (س + س) (س - ٢ف) \times س$$

$$ك + ي + ي + ك ي = (س + س) (س - ٢ف) \quad \text{اي ك + ي + ٢ف}$$

$$ف س = س^٢ - ٢ف س$$

$$(٣) \quad (ك + ي) (ك + ي) = (س + س) (س - ٢ف) \quad س$$

$$ك + ي + ي + ك ي = (س + س) (س - ٢ف) \quad س$$

$$\text{اي ك + ي + ٢ف} = (س + س) (س - ٢ف) \quad س$$

$$\text{اي ك + ي + ٢ف} = س^٢ - ٢ف س + ٢ف س$$

$$(٤) \quad (ك + ي) (ك + ي) = (س + س) (س - ٢ف) \quad س$$

$$\text{اي ك + ي + ٢ف} = (س + س) (س - ٢ف) \quad س$$

$$\text{اي ك + ي + ٢ف} = (س + س) (س - ٢ف) \quad س$$

$$ك + ي = س - ٢ف + ٢ف س$$

ومطلقاً ك + ي = س - ن ن - ن ف س + ن - ن ف س = ن - ن ف س + ن - ن ف س الى اخره

مثال (١) ما عددان مجموعهما ٦ ومجموع قوتيهما الخامستين ١٠٥٦
انظر (١٤٩) (٤)

$$\begin{aligned} \text{س} = ٢ = \text{د} = ١٠٥٦ \text{ فلنا لكي نجد قيمة ل} \\ \text{س}^٢ + \text{س}^٠ + \text{ل}^٢ + \text{ل}^٠ = ١٠ + \text{س} \text{ ل} = \text{د} = \text{اي} \\ ١٠٥٦ = \text{ل}^٤ + ٢٠ + \text{ل}^٢ + ٤٨٦ \\ \text{ل}^٤ + ١٨ = \text{ل}^٢ + ١٩ = \text{ل} = ١ \end{aligned}$$

$$\text{ك} = \text{س} + \text{ل} = ٢ + ١ = ٣ = \text{ي} = \text{س} - \text{ل} = ٢ - ١ = ١$$

(٢) ما عددان مجموعهما ١٨ ومربع الأكبر على الاصغر مع مربع الاصغر على الأكبر = ٢٧

$$\text{انظر (١٥٠) (٢) س} = ٩ = \text{ب} = ٢٧$$

$$\text{ل} = \frac{\text{س}(\text{س} - \text{ب})}{\text{ب} + \text{س}} = \frac{٨١ \times ٩}{٥٤ + ٢٧} = \frac{٧٢}{٨١} = \frac{٨}{٩}$$

$$\text{ك} = \text{س} + \text{ل} = ٩ + \frac{٨}{٩} = ١٢ = \text{ي} = \text{س} - \text{ل} = ٩ - \frac{٨}{٩} = \frac{٧٢}{٩}$$

(٣) عددان مجموعهما ٥ وحاصلها ٦ فما هو مجموع قوتيهما الرابعتين
انظر (١٥١) (٣)

$$\text{ك} + \text{ي} = \text{س} - \text{ل} = ٤ - \text{س} + \text{س} + \text{ل} = ٤ + \text{ل} = ٢ + \text{س} + \text{ل} = ٧٢ + ٦٠٠ - ٦٢٥ = ١٧$$

١٥٢ متى كانت المعادلات الناتجة من مسألة أكثر من عدد المجهولات المتضمنة فيها تكون بعضها اما متناقضة واما فضولاً. فمثال المتناقضة ٢ ك = ٦٠ ل ك = ٢٠ لان بالاولى ك = ٢٠ وبالثانية ك = ٤٠ ولو غيرنا الثانية حتى نصير ل ك = ١٠ لكانت فضولاً لان قيمة ك تُستعمل بدونها. وان كان عدد المعادلات اقل من عدد المجهولات في المسئلة تكون المسئلة سيالة اي اجوبتها كثيرة. وسياتي الكلام على بعض انواع هذه المسائل في محله

١٥٢ في حل المسائل المتضمنة عدة مجاهيل. للتعلم باب واسع لاستعمال فطنته في اختراع طرق لتسهيل العمل. وهذه الطرق لا تنحصر في قواعد معلومة

$$\text{فلو فُرض (١) } م + ك + ي = ١٤$$

$$\text{(٢) } م + ك + ل = ١٧$$

$$\text{(٣) } م + ي + ل = ١٨$$

$$\text{(٤) } ك + ي + ل = ٢١$$

فلنفرض مجموع المجاهيل اي ك + ي + م + ل = س

ثم في الاولى نجد الجميع الال اي س - ل = ١٤

في الثانية نجد الجميع الاي اي س - ي = ١٧

في الثالثة الجميع الاك اي س - ك = ١٨

في الرابعة الجميع الام اي س - م = ٢١

بالجمع ٤ س - ل - ي - ك - م = ٦٩

اي ٤ س - (ل + ي + ك + م) = ٦٩

اي ٤ س - س = ٦٩ - س ٢ ٦٩ = س ٢٢ = س

$$١٠ = ل$$

$$\text{ثم بالتعويض } ٢٢ - ل = ١٤$$

$$٦ = ي$$

$$٢٢ - ي = ١٧$$

$$٥ = ك$$

$$٢٢ - ك = ١٨$$

$$٢ = م$$

$$٢٢ - م = ٢١$$

١٥٤ في ما تقدم استخدمنا المعادلات لحل مسائل عملية. وهي تُستعمل ايضاً

في برهان النظريات كما نرى هنا

نظرية اولى. اربعة امثال حاصل كيتين يعدل مربع مجموعها الا مربع فضلتهما

لنفرض اكبرها = ك اصغرها = ي

مجموعها = س فضلتهما = د

(١) بالشروط ك + ي = س (٢) ك - ي = د

(٣) بالجمع ٢ ك = س + د

(٤) بالطرح ٢ ي = س - د

(٥) بضرب (٢) في (٤) ٤ ك ي = س - د

نظرية ثانية . مجتمع مربعي كيتين يعدل مربع فضلتهما مع مضاعف حاصلها

لنفرض ك = الأكبر ي = الأصغر

د = فضلتهما ف = حاصلها

(١) بالشروط ك - ي = د (٢) ك ي = ف

(٣) بتربيع الاولى ك^٢ - ٢ ك ي + ي^٢ = د^٢

(٤) بضرب الثانية في ٢ ٢ ك ي = ٢ ف

(٥) بجمع هاتين ك^٢ + ي^٢ = د^٢ + ٢ ف

نظرية ثالثة . نصف فضلة كيتين مع نصف مجتمعهما يعدل اكبرها . ونصفا

مجتمعهما الا نصف فضلتهما يعدل اصغرها

لنفرض (١) ك + ي = س (٢) ك - ي = د

(٣) بالتقسمة على ٢ $\frac{1}{2} ك + \frac{1}{2} ي = \frac{1}{2} س$

(٤) ايضاً $\frac{1}{2} ك - \frac{1}{2} ي = \frac{1}{2} د$

(٥) بجمع هاتين ك = $\frac{1}{2} س + \frac{1}{2} د$

(٦) بطرحها ي = $\frac{1}{2} س - \frac{1}{2} د$

وقس على ذلك نظائره



الفصل الثالث عشر

في التناسب والنسبة

١٥٥ التناسب هو النفاوت بين كيتين باعبار المقدار . ولا يقع الا بين

الكميات المتشابهة اي بين عدد و عدد او بين خط وخط او بين مجسم ومجسم او

بين سطح و سطح وهم جراً لانه لا يمكن مناسبة خطوط على ارباط ولا سطوح على

اقسام الوقت . واذا اعتبرت زيادة كية على اخرى فهو التناسب الحسابي واذا اعتبرت

رار وجود احدها في الاخرى فهو التناسب الهندسي

١٥٦ التناسب الحسابي حسبما تقدم هو الفضلة بين كيتين او عدة كميات .
الكميات نفسها هي اجزاء التناسب . فالتناسب الحسابي بين ٥ و ٢ هو ٢ و يُدَلُّ عليه
وضع علامة الطرح بين الكيتين هكذا ٥ - ٢ او بوضع نقطتين هكذا ٥ .. ٢ فان
سُرِبَت اجزاء تناسب حسابي في كمية او انقسمت عليها بضرب التناسب او ينقسم على
لك الكمية مثالة لو فرض ت - ب = ر

بضرب الجانبيين في ح لنا ح ت - ح ب = ح ح ر

وبالقسمة على ح $\frac{ت}{ح} = \frac{ب}{ح} - \frac{ر}{ح}$

اذا اضيفت اجزاء تناسب الى اجزاء تناسب اخر كل جزء الى نظيره او طُرِحَت
اجزاء الواحد من اجزاء الاخر يعدل تناسب المجموع او الفضلة بمجموع التناسبين او

فضلتها . مثالة ليكن ت - ب تناسبين ثم

(ت + د) - (ب + ح) = (ت - ب) + (د - ح) لان كل واحد من
الجانبيين = ت + د - ب - ح وكذلك (ت - د) - (ب - ح) =
ت - ب - (د - ح) لان كل واحد من الجانبيين = ت - د - ب + ح

التناسب الحسابي بين ١١ و ٤ = ٧

التناسب الحسابي بين ٥ و ٢ = ٣

وتناسب المجموع ١٦ و ٦ = ١٠ = مجموع التناسبين

وتناسب الفضلة ٦ و ٢ = ٤ = فضلة التناسبين

١٥٧ التناسب الهندسي هو المدلول عليه بالخارج من قسمة كمية على اخرى .

فالتناسب الهندسي بين ٨ و ٤ هو $\frac{٨}{٤} = ٢$ وبين ت و ب هو $\frac{ت}{ب}$ وبين د +

ح و ب + س هو $\frac{د + ح}{ب + س}$ ويُدَلُّ عليه ايضاً بنقطتين بين الكيتين . مثالة ت :

ب و ١٢ : ٤ ويقال للكيتين معاً زوج وتسمى الاولى سابقاً والثانية تالياً

١٥٨ في كل تناسبٍ ثلاثة اقسامٍ وهي السابق والتالي والتناسب الواقع بينهما.
وان فُرِضَ اثنان منها يُستعلم منها الثالث هكذا

لفرض السابق = ت والتالي = س والتناسب = ر ثم حسب الحد
المذكور آنفاً $r = \frac{ت}{س}$ اي التناسب يعدل الخارج من قسمة السابق على التالي
بالجبر ت = س ر اي السابق يعدل حاصل التالي في التناسب. وبالقسمة على
ر $s = \frac{ت}{ر}$ اي التالي يعدل الخارج من قسمة السابق على التناسب

فرعٌ اول في زوجين ان كان السابقان متساويين والتاليان متساويين ايضاً
يكون التناسبان متساويين (اقليدس ك ٥ ق ٧)

فرعٌ ثانٍ في زوجين ان كان التناسبان متساويين والسابقان متساويين
يكون التاليان متساويين. وان كان التناسبان متساويين والتاليان متساويين
يكون السابقان متساويين (اقليدس ك ٥ ق ٩)

١٥٩ اذا تساوى السابق والتالي يكون التناسب واحداً ويقال له تناسب
المساواة. مثاله $٢ \times ٦ : ١٨$ واذا كان السابق اكبر من التالي يكون التناسب
اكثر من واحد. مثاله $١٨ : ٦ = ٢$ ويسمى تناسباً اعظم. واذا كان السابق اصغر
من التالي يكون التناسب اقل من واحد. مثاله $٢ : ١٨ = \frac{١}{٩}$ ويسمى تناسباً اصغر.
اما التناسب بالقلب او التناسب المكفوء فهو تناسب مكفوء كيتبين. فالتناسب

بالقلب بين ٦ و٢ هو $\frac{١}{٦} : \frac{١}{٢}$ اي $\frac{١}{٦} \div \frac{١}{٢}$ والتناسب المستقيم بين ت وب
هو $\frac{ت}{ب}$ وبالقلب هو $\frac{١}{ب} : \frac{١}{ت}$ اي $\frac{١}{ب} \div \frac{١}{ت} = \frac{١}{ب} \times \frac{ت}{١} = \frac{ت}{ب}$ اي الخارج
من قسمة التالي على السابق. فيُبدل على التناسب المكفوء اما بقلب الكسر اللال على
المستقيم واما بقلب رتبة السابق والتالي. فنناسب ت : ب بالقلب هو ب : ت

١٦٠ التناسب المركب هو التناسب بين حواصل اجزأ تناسيبين فاكثر اذا
ضرب كل جزء من الواحد في نظيره من الاخر. مثاله

تناسب ٢ = ٢ : ٦

وتناسب ٢ = ٤ : ١٢

والمركب منها هو ٦ = ١٢ : ٧٢

وهكذا المركب من ت : ب : وس : د وح : ي هو ت س ح : ب د ي =

ت س ح
ب د ي

فرج كل تناسب مركب يعدل حاصل التناسبات البسيطة التي تركب منها .

ثالثاً تناسب ت : ب = $\frac{ت}{ب}$ و س : د = $\frac{س}{د}$ وح : ي = $\frac{ح}{ي}$ والمركب هو ت

س ح : ب د ي = $\frac{ت س ح}{ب د ي}$ = حاصل الكسور الثلاثة على التناسبات البسيطة

١٦١ في عدة تناسب اذا كان تالي الاول سابق الثاني وتالي الثاني سابق

لثالث وهلم جرا يكون تناسب السابق الاول الى التالي الاخير مماثلاً للتناسب

لمركب من التناسبات كلها . مثالة

ت : ب : س : د د : ح

فالمركب من هذه التناسبات هو $\frac{ت س د}{س د ح}$ وهو يعدل $\frac{ت}{ح}$ ا ب

تناسب السابق الاول الى التالي الاخير

١٦٢ التناسب المركب من مربع اجزاء تناسب بسيط يُسمى تناسباً مالياً .

نلو فرض ت : ب لكان تناسبها المالى ت : ب : ب^٢ والكعبي هو المركب من تكرار

لثثة تناسبات بسيطة اي ت : ب^٢ وتناسب الجزر المالى هو ت : ب^٣ والمجذر

الكعبي ت : ب^٤ فالتناسب البسيط بين ٦ و ٢ هو ٢ اي ٦ : ٢ = ٢ = ٢

ومضاعفه ٦ = ٢ : ١٢

وثلاثة امثاله ٩ = ٢ : ١٨

والمال ٩ = ٢ : ٦

والكعبي ٢٧ = ٢ : ٦

١٦٣ قد راينا ان التناسب يبدل عليه بكسر . وراينا في فصل الكسور ان

ضرب صورة كسرٍ هو كضرب قيمته وقسمة صورته كقسمة قيمته (٤٥) فاذا ضرب سابق زوج في كمية ما يُضرب التناسب في تلك الكمية. وبقسمة السابق يُقسم التناسب

$$\text{مثال} ٢ = ٢ : ٦ \quad ٢ = ٢ : ٤ \quad ١٢ = ٢ : ١٢ \quad \text{ت : ب} = \frac{\text{ت}}{\text{ب}} \quad \text{ن : ت} = \frac{\text{ن}}{\text{ب}} = \frac{\text{ن}}{\text{ب}}$$

فرع اذا بقي التالي على حالته فكلما زاد السابق زاد التناسب وبالعكس

(اقليدس ك ٥ ق ٨ و ١٠)

١٦٤ ضرب نالي زوج كقسمة التناسب. وقسمة التالي كضرب التناسب

$$\text{مثال} ١٢ = ٢ : ٦ \quad ١٢ = ٤ : ٣ \quad \text{ت : ب} = \frac{\text{ت}}{\text{ب}} \quad \text{وت : ن} = \frac{\text{ت}}{\text{ن}} = \frac{\text{ت}}{\text{ن}}$$

فرع اذا بقي السابق على حالته فكلما زاد التالي صغر التناسب وبالعكس

(اقليدس ك ٥ ق ٨ و ١٠)

ثم انه قد اتضح ما تقدم ان ضرب سابق زوج هو كقسمة التالي. وقسمة السابق

كضرب التالي. مثال

$$٨ : ٤ = ٢ \quad \text{بضرب السابق في اثنين} \quad ١٦ : ٤ = ٤$$

$$\text{بقسمة التالي على اثنين} \quad ٨ : ٢ = ٤$$

فرع اذا انفك سابق او تالي الى ضلعين فاكثر يمكن نقل ضلع فاكثر من

احدها الى الاخر بدون تغيير التناسب. مثال

$$٢ = ٩ : ٦ \quad ٢ = ٩ : ٦ \times ٢ \quad \frac{\text{ت}}{\text{ب}} = \frac{\text{ت}}{\text{ب}} \div \frac{\text{ت}}{\text{ب}} = \frac{\text{ت}}{\text{ب}}$$

$$= \text{م ت : ب ي}$$

وان ضرب السابق والتالي كلاهما في كمية واحدة او انقسما عليها فلا يتغير

التناسب (اقليدس ك ٥ ق ١٥) مثال

$$٨ : ٤ = ٢ \quad \text{بالضرب في ٢} \quad ١٦ : ٨ = ٢$$

$$\text{وبالقسمة على ٢} \quad ٢ = ٢ : ٤ \quad \text{ت : ب} = \frac{\text{ت}}{\text{ب}} \quad \text{م ت : م ب} = \frac{\text{م ت}}{\text{م ب}}$$

$$= \frac{\text{ت}}{\text{ب}}$$

فرع التناسب بين كسرين لهما مخرج مشترك هو مثل الذي بين صورتيهما.

فتناسب $\frac{ت}{ن} : \frac{ب}{ن}$ هو ت : ب

فرع ثانٍ التناسب بين كسرين لهما صورة مشتركة هو مثل التناسب بالقلب

بين مخرجيهما. مثاله $\frac{ت}{م} : \frac{ن}{م}$ هو $\frac{ا}{ن} : \frac{ا}{م}$ اي ن : م

فاذا لكي نجد التناسب بين كسرين في صحیح نضربهما في المخرجين.

مثاله $\frac{ت}{د} : \frac{س}{د}$ فبالضرب في ب دلنا $\frac{ت}{ب} : \frac{س}{د}$ اي ت : ب س

١٦٥ اذا تركب تناسب اعظم (١٥٩) مع تناسب اخر بزيك. مثاله

لنفرض التناسب الاعظم $ا + ن : ا$

وتناسباً اخر $ت : ب$

فالركب منها $ت + ن : ب$ وهو اعظم من ت : ب

ثم اذا تركب تناسب اصغر مع تناسب اخر ينقصه

لنفرض التناسب الاصغر $ا - ن : ا$

وتناسباً اخر $ت : ب$

بالتركيب $ت - ن : ب$

وهو اصغر من ت : ب

١٦٦ اذا اضيف الى جزوي زوج او طرح منها كيتان تناسبها مثل تناسب

الزوج المذكور يكون بين المجموعين او الباقيين نفس ذلك التناسب (اقليدس ك ٥

ق ٥ و ٦)

مفروض تناسب ت : ب مثل س : د ثم ت + س : ب + د = ت : ب

او س : د

(١) لان بالمفروض $\frac{ت}{ب} = \frac{س}{د}$

(٢) بالجبر $ت + س : ب + د = ت : ب$

(٣) اضيف س د الى الجانبين ت د + د = د ب س + س د

$$(٤) \text{ بالقسمة على د } \frac{ب س + س د}{د} = ت + س$$

$$(٥) \text{ بالقسمة على ب + د } \frac{ت + س}{ب + د} = \frac{س}{د} = \frac{ت}{ب}$$

$$\text{وكذلك } \frac{ت - س}{ب - د} = \frac{س}{د} = \frac{ت}{ب}$$

$$(١) \text{ لان بالمفروض } \frac{س}{د} = \frac{ت}{ب}$$

(٢) وبالجبر ت د = د ب س

(٢) بطرح س د من الجانبين ت د - د = د ب س - س د

$$(٤) \text{ بالقسمة على د } \frac{ب س - س د}{د} = ت - س$$

$$(٥) \text{ بالقسمة على ب - د } \frac{ت - س}{ب - د} = \frac{س}{د} = \frac{ت}{ب}$$

$$\text{مفروض } ٢ = ٥ : ١٥$$

$$\text{وايضاً } ٢ = ٢ : ٩$$

$$\text{بجمع اجزاء الزوجين } ٢ = ٢ + ٥ : ٩ + ١٥$$

$$\text{بالطرح } ٢ = ٢ - ٥ : ٩ - ١٥$$

وهكذا مها تعددت الأزواج . مثلاً

$$٢ = ٦ : ١٢$$

$$٢ = ٥ : ١٠$$

$$٢ = ٤ : ٨$$

$$٢ = ٣ : ٦$$

بالجمع (١٢ + ١٠ + ٨ + ٦) : (٢ + ٤ + ٥ + ٦) = ٢ (اقليدس

ك ٥ ق ١٢ و ١٢)

١٦٧ تناسب اعظم بصغر باضافة كمية واحدة الى جزويو . مثاله اذا فرض

ت + ب : ت اي $\frac{ت + ب}{ت}$ واذا اضيف ك الى الجزئين فلنا $\frac{ت + ب + ك}{ت + ك}$

ثم بالتحويل الى مخرجٍ مشتركٍ يصير الاول $\frac{ت^٢ + ت + ب + ت + ك}{ت(ت + ك)}$

والثاني $\frac{ت^٢ + ت + ب + ت + ك}{ت(ت + ك)}$ فالصورة الثانية اقل من الاولى ومن ثم صغر التناسب

تناسب اصغر يزداد باضافة كمية واحدة الى جزئيه

مفروض ت - ب : ت اي $\frac{ت - ب}{ت}$ ثم باضافة ك الى الجزئين لنا

ت - ب + ك : ت + ك اي $\frac{ت - ب + ك}{ت + ك}$ وبالتحويل الى مخرجٍ مشتركٍ

يصير الاول $\frac{ت - ت + ب + ت + ك}{ت(ت + ك)}$ والثاني $\frac{ت - ت + ب + ت + ك}{ت(ت + ك)}$

والصورة الثانية اكبر من الاولى فيكون التناسب قد زاد. واذا طُرح كمية واحدة من الجزئين يكون الفعل عكس ما ذُكر

امثلة

(١) اي تناسبي اكبر ١١ : ٩ ام ٤٤ : ٣٥

(٢) اي تناسبي اكبر ٢ : ٣ ام ٢ : ٣ + ٧ : ٣ + ٧

(٣) سابق زوج ٦٥ والتناسب ١٢ فا هو التالي

(٤) اذا كان التالي ٧ والتناسب ١٨ فا هو السابق

(٥) ما هو التناسب المركب من ٣ : ٧ و ٢ : ٥ ب ٧ : ٥ + ١ :

٢ - ٣

(٦) ما هو التناسب المركب من ك + ٣ : ٥ ب ٥ - ٣ : ٥ + ٣

الجواب ك - ٣ : ٥ ب ح

٥ - ٣ : ٥ + ٣

(٧) اذا تركب ٥ ك + ٧ : ٣ ك - ٣ مع ٣ ك + ٣ : ٣ ك + ٣ ف هل

يحدث تناسب اعظم او اصغر الجواب تناسب اعظم

(٨) اي تناسبي من الانواع الثلاثة (١٥٩) يحدث من تركيب ك + ٣ : ٥

٥ - ٣ : ٥ + ٣ ب ٥ - ٣ : ٥ + ٣

الجواب تناسب المساواة

٥ - ٣ : ٥ + ٣

(٩) ما هو التناسب المركب من ٥ : ٧ و ٤ : ٩ المائي و ٣ : ٢ الكعبي
الجواب ١٤ : ١٥

(١٠) ما هو التناسب المركب من ٧ : ٣ وك : ي الكعبي و ٩ : ٤٩ المجذري
الجواب ك : ي المائي

(١١) ما هو التناسب المركب من ت - ك : ت - ك : ب وب :
ت - ك الجواب (ت + ك) : ت

(١٢) ائني تناسب اكبرت + ٢ : ٢ : ٢ + ٤ امرت + ٤ : ٤ : ٤
الجواب ت + ٤ : ٤ : ٤ + ٥

نبذة

في النسبة

١٦٧ النسبة هي المساواة بين تناسبين فاكثرو. وهي اما حسابية واما هندسية.
فالحسابية هي مساواة تناسبات حسابية كما في ٦ ٤ ١٠ ٨ واهندسية هي
مساواة تناسبات هندسية كما في ٦ ٢ ١٢ ٤ فينبغي ان يميز بين التناسب
والنسبة ولو استعمل اللفظان مترادفين في بعض الاحيان. والفرق بينهما واضح اذ
يقال في تناسب ما انه اكبر من اخر. مثاله ١٢ : ٢ اكبر من ٦ : ٢ ولا يقال ذلك
في النسبة لانها مساواة تناسبات والمساواة تستلزم عدم التفاوت. وفي كل نسبه زوجان.
ويقال للسوابق الاجزاء المتشابهة وكذلك للتوالي. ويقال للسوابق والتوالي من
كل زوج الاجزاء المتناسبة ولا خلاف في رتبة زوجي نسبه لانه ان كان ت : ب ::
س : د تكون س : د :: ت : ب من حيث مساواة النسبتين. واذا اريد الدلالة على
نسبه بين ثلاث كميات فلا بد من تكرار الوسطى. فيدل على النسبة بين ٨ و ٤ و ٢
هكذا ٨ : ٤ :: ٤ : ٢

ويسمى المكرر متناسباً متوسطاً بين الاخرين. وتسمى الثالثة من الكميات الثلاث
متناسباً ثالثاً للاخرين

١٦٨ النسبة بالقلب ويقال لها ايضاً النسبة المكفوة هي المساواة بين تناسب

ستقيم وتناسب بالقلب . مثاله ٤ : ٢ :: $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{6}$ اي نسبة ٤ الى ٢ هي بالقلب
نسبة ٢ الى ٦ وتكتب أحياناً هكذا ٤ : ٢ :: ٢ : ٦ بالقلب . ومتى تعددت
كميات وكان تناسب الأولى الى الثانية مثل تناسب الثانية الى الثالثة وهلمّ جراً
لميت النسبة متصلة . مثاله ١٠ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢ في النسبة الحسابية المتصلة . و ٦ و
٢٢ و ١٦ و ٨ و ٤ في النسبة الهندسية المتصلة . وهكذا : ب :: ب : س :: س
د :: د : ح الى اخره . والنسبة الحسابية إنما هي معادلة بسيطة . مثالها ت - ب
= س - د وفي كل نسبة حسابية يكون مجموع الطرفين مائلاً . لمجموع الوسطين
هي ت + د = ب + س وهكذا في ١٢ - ١٠ = ٩ - ١١ ١٢ = ٩ + ١١
+ ١٠ . وان كانت ثلاث كميات على نسبة حسابية يكون مجموع الطرفين مضاعف
الوسط . فإذا فرض ت - ب = ب - س يكون ت + س = ٢ ب

نبذة

في النسبة الهندسية

١٧٩ متى كانت اربع كميات على نسبة هندسية يكون حاصل الطرفين مائلاً

لحاصل الوسطين

مفروض ت : ب :: س : د فإذا ت = د = ب = س لانه بالمفروض $\frac{ت}{ب} = \frac{س}{د}$

وبالمجرب ت = د = ب = س وهكذا ١٢ : ١٥ :: ٨ : ١٠ ١٠ × ١٢ = ٨ × ١٥

فرع اذا نُقِل ضلعٌ من طرفٍ الى اخر او من وسط الى اخر لا تتغير النسبة .

فإذا فرض ت : م : ب :: ك : ن تكون ت : ب :: م : ك ي وإذا فرض ن : ت :

ب :: ك : ن تكون ت : ب :: ك : ن ي

اذا كان حاصل كيتين مائلاً لحاصل كيتين اخريين تكون الاربع على نسبة

هندسية اذا جعل ضلعا الجانب الواحد طرفين وضلعا الجانب الاخر وسطين .

فان فرض م ي = ن ح تكون م : ن :: ح : ي وان فرض (ت + ب) × س =

(د - م) × ي تكون ت + ب : د - م :: م : ي س

اذا كانت ثلاث كميات على نسبة هندسية يكون حاصل الطرفين مائلاً لمربع

الوسط . مثاله اذا فرض ت : ب :: ب : س يكون ت س = ب^٢ فيجد متناسباً

متوسطاً بين كيتين يتخذير حاصلها. فاذا فرضت : ك :: ك : س لنا ك^٢ =
 ت س وك = $\sqrt{٦}$ ت س

١٨٠ ينفع ما تقدم ان كل طرفٍ من نسبة يعدل حاصل الوسطين مقسوماً
 على الطرف الاخر. وكل وسطٍ يعدل حاصل الطرفين مقسوماً على الوسط الاخر

اذا فرضت : ب :: س : د يكون ت د = ب س وت = $\frac{ب س}{د}$ د

$\frac{ب س}{ت} = ب = \frac{ت د}{س} = س = \frac{ت د}{ب}$ فان فرض ثلاثة اجزاء

من نسبة نجد الرابع بقسمة حاصل الثاني والثالث على الاول. وقد بُني على ذلك
 باب الاربعة المتناسبة في علم الحساب

١٨١ اذا كانت اربع كميات متناسبة يمكن مبادلة الطرفين او الوسطين ان
 جزءي كل زوج بدون تغيير النسبة لان حاصل الطرفين لا يزال ماثلاً لحاصل
 الوسطين بعد هذه المعاملات

اذا فرضت ت : ب :: س : د

و ١٢ : ٨ :: ٦ : ٤

فاذا بمبادلة الوسطين

ت : س :: ب : د ١٢ : ٨ :: ٦ : ٤ (اقليدس ك ٥ ق ١٦)

ومبادلة الطرفين

د : ب :: س : ت ١٢ : ٦ :: ٨ : ٤

ومبادلة جزءي كل زوج

ب : ت :: د : س ٨ : ١٢ :: ٤ : ٦

ويسمى هذا العمل الاخير قلباً

ومبادلة ترتيب الزوجين

س : د :: ت : ب ٨ : ١٢ :: ٤ : ٦

ويقلب ترتيب النسبة كلها

د : س :: ب : ت ١٢ : ٨ :: ٦ : ٤

لان المعادلة من الجميع ت د = ب س و $٨ \times ٦ = ١٢ \times ٤$ لا تنزع النسبة اذا ضرب الجزآن المتناسبان معاً او الجزآن المشابهان معاً في كمية واحدة او انقسما عليها

مفروض ت : ب :: س : د

(١) بضرب المتناسبين الاولين م ت : م ب :: س : د

(٢) بضرب المتناسبين الاخرين ت : ب :: م س : م د

(٣) بضرب السابقين. (اقليدس ك ه ق ٣)

م ت : ب :: م س : د

(٤) بضرب التاليين ت : م ب :: س : م د

(٥) بقسمة الاولين $\frac{ت}{م} : \frac{ب}{م} :: س : د$

(٦) بقسمة الاخرين ت : ب :: $\frac{س}{م} : \frac{د}{م}$

(٧) بقسمة السابقين $\frac{ت}{م} : ب :: \frac{س}{م} : د$

(٨) بقسمة التاليين ت : $\frac{ب}{م} :: س : \frac{د}{م}$

فرع. اذا ضرب كل واحد من الاجزاء الاربعة او انقسم لا تتغير النسبة (اقليدس ك ه ق ٤)

ت م : م ب :: م س : م د $\frac{ت}{م} : \frac{ب}{م} :: \frac{س}{م} : \frac{د}{م}$

فرع آخر في المعاملات الثاني المتقدمة يمكن ضرب التالي عوض قسمة السابق وعكسه

١٨٢ اذا عدل تناسبان تناسباً ثالثاً يكونان متساويين (اقليدس ك ه ق ١١) (اولية ١١)

اذا فرضت ت : ب :: م : ن و س : د :: م : ن
يكون ت : ب :: س : د او ت : س :: ب : د

وإذا فرضت : ب :: م : ن وم : ن :: س : د
 يكون ت : ب :: س : د اوت : س :: ب : د
 فرج . إذا فُرضت : ب :: م : ن وم : ن < س : د
 يكون ت : ب < س : د (اقليدس ك ٥ ق ١٢)

١٨٤ إذا فرض م : ت :: ن : ب ثم بالمبادلة م : ن :: ت : ب
 وإذا فرض م : س :: ن : د ثم بالمبادلة م : ن :: س : د
 فحسبما تقدمت : ب :: س : د

إذا فرض م : ت :: ن : ب ثم بالقلب والمبادلة ت : ب :: م : ن
 وإذا فرض س : م :: د : ن ثم بالمبادلة س : د :: م : ن فيكون
 ت : ب :: س : د حسبما تقدم

إذا فُرضت : م :: ب : ن ثم بالمبادلة ت : ب :: م : ن

وإذا فرض س : د :: م : ن ثم ت : ب :: س : د كما تقدم (اقليدس ك ٥ ق ٢٢)

١٨٥ في عدة نِسَبٍ إذا كان الجزءان الآخران من الاولى الاولين من الثانية
 والآخران من الثانية الاولين من الثالثة وهم جراً تكون نسبة الاولين من الاولى
 كنسبة الاخرين من الاخيرة . مثالة

ت : ب :: س : د س : د :: ح : ل ح : ل :: م : ن م : ن :: ك : ي	}	ت : ب :: س : د
		س : د :: ح : ل
		ح : ل :: م : ن
		م : ن :: ك : ي

وهكذا ان امكن تحويل النسب الى هذا الترتيب

مثالته : س :: ب : د بالمبادلة ت : ب :: س : د
 س : ح :: د : ل بالمبادلة س : د :: ح : ل
 ح : م :: ل : ن بالمبادلة ح : ل :: م : ن
 م : ك :: ن : ي بالمبادلة م : ن :: ك : ي
 ثم ت : ب :: ك : ي كما تقدم

١٨٦ متى كان الطرفان او الوسطان من نسبة واحدة كالطرفين او الوسطين من اخرى تكون الاجزاء الاربعة متناسبة بالقلب

مثالته ت:م::ن:ب وس:م::ن:د ثم ت:س::ب:د
 لان ت ب = م ن وس د = م ن وت ب = س د اي ت : س :: د : ب
 وهكذا متى تشابه الطرفان. مثالته م : ت :: ب : ن وم : س :: د : ن ثم ت : س :: د : ب (اقليدس ك ه ق ٢٣)
 واذا كانت ت : م :: ن : ب وم : س :: د : ن فيكون ت : س :: د : ب كما تقدم

١٨٧ اذا شابهت اجزائه نسبة اخرى يكون مجموعها او فضلتهما متناسبة ايضاً (اقليدس ك ه ق ٢) مثالته

اذا فرض ت : ب :: س : د
 وايضاً ت : ب :: م : ن
 فبالجمع ت + م : ب + ن :: س : د وت - م : ب - ن :: س : د وت
 ب : س + م : د + ن وت : ب :: س - م : د - ن
 وبالمبادلة ت + م : س :: ب + ن : د وت - م : س :: ب - ن : د
 وهكذا مهما تعددت النسب. مثالته

س : د
 ح : ل
 م : ن
 ك : ي
 مفروضات : ب ::

ثم ت : ب :: س + ح + م + ك : د + ل + ن + ي (اقليدس ك ه ق ٢)
 اذا فرضت ت : ب :: س : د وم : ب :: ن : د
 يكون ت + م : ب + ن :: س : د لان بالمبادلة لتات : س :: ب : د
 وم : ن :: ب : د فاذا ت + م : س + ن :: ب : د وبالمبادلة ت + م : ب :: س + ن : د (اقليدس ك ه ق ٢٤)

١٨٨ في النسبة الواحدة اذا اضيف احد الجزئين المتناسبين او المتشابهين الى الاخر او طرح احدهما من الاخر لا تتغير النسبة. فاذا فرضت : ب :: س : د و ١٢ : ٤ :: ٦ : ٢ ثم

(١) باضافة الجزئين الاخيرين الى الاولين

$$ت + س : ب + د :: ت : ب \quad ٤ : ١٢ :: ٢ + ٤ : ٦ + ١٢$$

$$ت + س : ب + د :: س : د \quad ٢ : ٦ :: ٢ + ٤ : ٦ + ١٢$$

$$ت + س : ت :: ب + د : ب \quad ٤ : ٢ :: ١٢ : ٦ + ١٢$$

$$ت + س : س :: ب + د : د \quad ٢ : ٢ :: ٦ : ٦ + ١٢$$

(٢) باضافة السابقين الى التاليين

$$ت + ب : ب :: س + د : د \quad ٢ : ٢ + ٦ :: ٤ : ٤ + ١٢$$

$$ت + ب : ت :: س + د : س \quad ٦ : ٢ + ٦ :: ١٢ : ٤ + ١٢$$

وهكذا الى اخره. ويقال لهذا العمل تركيب النسب (اقليدس ك ٥ ق ١٨)

(٣) بطرح الاولين من الاخيرين

$$س - ت : ب - د :: س - ت : س \quad س - ت : س :: د - ب : د$$

(٤) بطرح الاخيرين من الاولين (اقليدس ك ٥ ق ١٧)

$$ت - س : ب - د :: ت - س : ب \quad ت - س : ب :: د - س : د$$

(٥) بطرح التاليين من السابقين

$$ت - ب : ب :: س - د : د \quad ت - ب : ت :: س - د : س$$

ويسمى هذا الاخير قلب النسبة

(٦) بطرح السابقين من التاليين

$$ب - ت : ت :: د - س : س \quad ب - ت : ب :: د - س : د$$

(٧) ت + ب : ب - ت :: س + د : س - د اي مجتمع الاولين الى

فضلتها كمجتمع الاخيرين الى فضلتها

فرع اذا كانت اربع كميات مركبة متناسبة كما في الامثلة المتقدمة تكون البسيطة التي تركيب منها متناسبة ايضاً. فاذا فرضت ت + ب : ب :: س + د : د تكون

ت : ب :: س : د ويسمى هذا العمل قسمة النسبة (اقليدس ك ٥ ق ١٧)
 ١٨٩ اذا ضُرِبَتْ اجزاءُ نسبةٍ في اجزاءٍ نسبةٍ اخرى كل جزء في نظيره تكون
 المحواصل متناسبة ايضاً. مثالة

$$\begin{array}{l} \text{ت : ب :: س : د} \\ \text{و ح : ل :: م : ن} \\ \hline \text{ت ح : ب ل :: س م : د ن} \end{array}$$

وهكذا مها تعددت النسب. مثالة

$$\begin{array}{l} \text{ت : ب :: س : د} \\ \text{ح : ل :: م : ن} \\ \hline \text{ف : ق :: ك : ي} \end{array}$$

ت ح ف : ب ل ق :: س م ك : د ن ي

وهكذا اذا ترقت اجزاءُ نسبةٍ الى اية قوة فُرِضَتْ. مثالة

$$\begin{array}{l} \text{ت : ب :: س : د} \\ \text{ت : ب :: س : د} \\ \hline \text{ت : ب :: س : د} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{وايضاً : ت : ب :: س : د} \\ \text{و : ح : ل :: م : ن} \\ \text{و : ت : ب :: س : د} \end{array}$$

١٩٠ اذا انقسمت اجزاءُ نسبةٍ على اجزاءٍ نسبةٍ اخرى تكون الخواارج
 متناسبة. مثالة

$$\begin{array}{l} \text{ت : ب :: س : د} \\ \text{ح : ل :: م : ن} \\ \hline \text{ت : ب :: س : د} \\ \text{ح : ل :: م : ن} \end{array}$$

١٩١ في تركيب بعض النسب يمكن افناء الاجزاء المتساوية واخراجها قبل الضرب لاجل اختصار العمل. مثاله

$$ت : ب :: س : د$$

$$م : ت :: ت : س$$

$$ت : م :: ب : ت :: س : ن :: س : د$$

فإذا م : ت :: ن : د وهكذا

$$ت : ب :: س : د \quad ٢ : ٩ :: ٤ : ١٢$$

$$ب : ح :: د : ل \quad ٦ : ٣ :: ٨ : ٤$$

$$ح : م :: ل : ن \quad ١٥ : ٦ :: ٢٠ : ٨$$

$$ت : م :: س : ن \quad ١٥ : ٩ :: ٢٠ : ١٢$$

١٩٢ متى كانت اربع كميات متناسبة فاذا كانت الاولى اعظم من الثانية تكون الثالثة اعظم من الرابعة واذا كانت مثلها فمثلها او اصغر فاصغر

$$\left. \begin{array}{l} ت = ب \quad س = د \\ ت < ب \quad س < د \\ ت > ب \quad س > د \end{array} \right\} \text{فإذا} \quad ت : ب :: س : د$$

فرع اذا كانت الاولى اعظم من الثالثة تكون الثانية اعظم من الرابعة (اقليدس ك ه ق ١٤) فان فرضت : ب :: س : د فبالمبادلة : ت : س :: ب : د وحينئذ ان كان ت = ب يكون س = د الى اخره

فرع ثان اذا فرضت : م :: س : ن

وم : ب :: ن : د فان كان ت = ب تكون س = د

الى اخره (اقليدس ك ه ق ٢٠) لان بالتركيب : ت : ب :: س : د ومن ثم ان كان ت = ب تكون س = د الى اخره

$$\left. \begin{array}{l} وهكذا ان فرضت : م :: ن : د \\ م : ب :: س : ن \end{array} \right\}$$

فان كانت = ب يكون س = د الى اخره (اقليدس ك ٥ ق ٢١)
 اذا كانت اربع كميات متناسبة تكون مكفوءاتها متناسبة ايضاً. فاذا فرض
 ت : ب :: س : د يكون $\frac{1}{1} : \frac{1}{2} :: \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$ لان الحاصل من تحويلها
 كليهما هوت د = ب س

نبذة

في النسبة المتصلة

١٩٣ في النسبة المتصلة (١٦٨) تكون جميع التناسبات متساوية. فاذا
 فرض ت : ب :: ب : س :: س : د :: د : هـ ي يراد ان تناسب ت : ب يعدل
 تناسب ب : س وتناسب س : د الى اخره. وتناسب الاولى الى الاخيرة يعدل
 الحاصل من التناسبات المتوسطة بينها اي تناسب ت : هـ ي يعدل $\frac{ت}{ب} \times \frac{ب}{س} \times \frac{س}{د} \times \frac{د}{هـ}$
 $\frac{ت}{هـ} \times \frac{س}{د}$ ولكن هذه التناسبات كلها متساوية فيمكن الضرب في ايتها
 شيئاً اي $\frac{ت}{ب} \times \frac{ب}{س} \times \frac{س}{د} = \frac{ت}{د}$ فيكون ت : هـ ي :: ت : ب^٤
 ولنا من ذلك هذه القاعدة

وهي اذا كانت عدة كميات على نسبة متصلة تكون نسبة الاولى الى الاخيرة كنسبة
 احد التناسبات المتوسطة مرفقة الى قوتها دليلها اقل من عدة الكميات بواحد. مثاله
 اذا فرض ت : ب :: ب : س تكون ت : س : هـ ي وان فرض
 ت : ب :: ب : س :: س : د :: د : هـ ي تكون ت : هـ ي :: ت : ب^٤

١٩٤ اذا كانت عدة كميات على نسبة متصلة تكون متناسبة ايضاً اذا
 انعكس ترتيبها حسب ما تقدم (١٨١) فاذا فرض

٤	٨	١٦	٣٢	٦٤	
	٢	٢	٢	٢	فالتناسبات
٦٤	٣٢	١٦	٨	٤	وبالعكس
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	فالتناسبات

اي متى انعكس ترتيب الكميات تكون التناسبات مكفومات التناسبات
المستقيمة ومكفومات كميات متساوية هي متساوية كما يتضح من الاولية الرابعة

مسائل

(١) اقسام ٦٠ الى قسمين تكون نسبة حاصلها الى مجموع مربعيها كنسبة ٢
الى ٥

لنفرض $ك = قسما$ و $٦٠ - ك = القسم الاخر$

(١) بالشروط $٦٠ ك - ك : ك : ك + ٢ ك = ٢٦٠٠ - ١٢٠ ك :: ٥ : ٢$

(٢) بالتحويل الى معادلة $٣٠٠ ك - ٥ ك = ٤ ك + ٢٦٠٠ - ١٢٠ ك$

(٣) بالمقابلة والقسمة $٦٠ ك - ٤ ك = ٨٠٠$

(٤) بالتام التربيع والتجذير والمقابلة $٤٠ = ٦٠ - ٤٠ = ٢٠$

(٢) اقسام ٤٩ الى قسمين تكون نسبة اكبرها مع ستة الى الاصغر الاحد
عشر كنسبة ٩ : ٢

لنفرض $ك = الاكبر$ و $٤٩ - ك = الاصغر$

بالشروط $ك + ٦ : ٢٨ - ك :: ٩ : ٢$

باضافة السابقين الى التاليين $ك + ٦ : ٤٤ :: ٩ : ١١$

بقسمة التاليين $ك + ٦ : ٤ :: ٩ : ١$

ثم بالتحويل $ك + ٦ = ٣٦$ $ك = ٣٠$

(٢) اي عدد اذا اضيف اليه ١ ثم ٥ ثم ١٢ تكون نسبة المجموع الاول :
الثاني :: الثاني : الثالث

لنفرض العدد ك

ثم بالشروط $ك + ١ : ك + ٥ :: ك + ٥ : ك + ١٢$

بالطرح $ك + ١ : ٤ :: ك + ٥ : ٨$

بقسمة التاليين $ك + ١ : ١ :: ك + ٥ : ٢$

ثم $ك + ٢ = ٢$ $ك + ٥ = ٢$ $ك = ٣$

(٤) ما عددان نسبة اكبرها الى الاصغر كجانبينها الى ٤٢ وكفضلتها الى ٦

لنفرض العددين ك وى
 ثم بالشرط الاول ك : ى :: ك + ى : ٤٢
 وبالثاني ك : ى :: ك - ى : ٦
 بالمساواة ك + ى : ٤٢ :: ك - ى : ٦
 بقلب الوسطين ك + ى : ك - ى :: ٤٢ : ٦
 بالجمع والطرح ٢ ك : ٢ ى :: ٤٨ : ٢٦
 بالقسمة ك : ى :: ٤ : ٢
 $٢ ك = ٤ ى$ $ك = ٢ ى$ ثم بالتعويض في النسبة الثانية لنا
 $٢٤ = ى$ $٢٢ = ك$

(٥) اقسام ١٨ الى قسمين بين مربعيهما نسبة ٢٥ : ١٦

لنفرض القسمين ك و ١٨ - ك

ثم بالشرط ك : (١٨ - ك) :: ٢٥ : ١٦

بالتجذير ك : ١٨ - ك :: ٥ : ٤

بالجمع ك : ١٨ :: ٥ : ٩

بالقسمة ك : ٢ :: ٥ : ١٠

(٦) اقسام ١٤ الى قسمين تكون نسبة الخارج من قسمة الاكبر على الاصغر

الى الخارج من قسمة الاصغر على الاكبر كنسبة ١٦ : ٩

لنفرض اكبرها ك والاصغر ١٤ - ك

بشروط $\frac{ك}{١٤ - ك} : \frac{١٤ - ك}{ك} :: ١٦ : ٩$

بالضرب ك : (١٤ - ك) :: ١٦ : ٩

بالتجذير ك : ١٤ - ك :: ٤ : ٣

بالجمع ك : ١٤ :: ٤ : ٧

بالقسمة ك : ٢ :: ٤ : ٨

(٧) اقسام ٢٠ الى قسمين بينها نسبة ٢ المالية الى ١ المالية واستعلم متناسبا

توسطا بينها

لنفرض احدها ك والاخر ٢٠ - ك

بالشروط ك : ٢٠ - ك : ٣ : ١ : ٩ :: ١ : ٩

بالمجموع ك : ٢٠ : ٩ :: ١٠ : ٩ = ك = ١٨ والاخر = ٢ والمتناسب المتوسط

$$٦ = \sqrt{١٨ \times ٣٦} = (١٧٩ \text{ حسب})$$

(٨) اي عدد ين حاصلها ٢٤ ونسبة فضلة كعبيها الى كعب فضلتهما كسبا

١ : ١٩

لنفرض ك احدها وي الاخر

بالمفروض ك ي = ٢٤

وايضاً ك^٢ - ي^٢ : (ك - ي) : ١٩ :: ١ : ١٩

بالبسطة ك^٢ - ي^٢ : ك^٢ - ٢ ك ي + ي^٢ : (ك - ي) : ١٩ :: ١ : ١٩

بالطرح (١٨٨) ٢ ك^٢ - ي^٢ : ٢ ك ي - (ك - ي) : ١٨ :: ١ : ١٨

بالقسمة على ك - ي : ٢ ك ي : (ك - ي) : ١٨ :: ١ : ١٨

٢ ك ي = ٢٤ × ٢ = ٧٢ حسب المفروض

فبالتعويض ٧٢ : (ك - ي) : ١٨ :: ١ : ١٨

بالضرب والقسمة (ك - ي) = ٤ - ك - ي = ٢ ك ي = ٢٤ = ك

ي = ٤

(٩) مفروض (ت + ك) : (ت - ك) : ك + ي : ك - ي

هات البرهان من ذلك على ان ت : ك :: ٣٦ - ت - ي : ٦٠

بالبسطة ت + ٢ ك + ك : ت - ٢ ك + ك : ك + ي : ك - ي

بالمجموع والطرح ٢ ت + ٢ ك : ٤ ت : ٢ ك : ٢ ي

بالقسمة ت + ك : ٢ ت : ك : ي

بنقل ك ت + ك : ٢ ت : ك : ي

بقلب الوسطين ت + ك : ك : ٢ ت : ي

بالطرح ت : ك : ٢ ت - ي : ي

بالتجذير ت : ك :: ٣٦ - ت - ي : ٦٠

(١٠) مفروض ك : ي :: ت : ب

وأيضاً ت : ب :: $\sqrt{ك + ك} : \sqrt{د + د}$ ي

هات البرهان على أن دك = س ي

بالترقية ت : ب :: س : ك + د + د ي

بالمساواة س : ك + د + د ي :: ك : ي

بقلب الوسطين س : ك + ك :: د + د ي : ي

بالطرح س : ك :: د : ي

ثم دك = س ي

(١١) مفروض $\frac{ت - ك}{ب} = ٤$ ت برهن أن ت + ك : ٢

:: ٢ : ت - ك

(١٢) مفروض ك : ي :: ٣٦ : ٢٥ ونسبة ٢ ك + ي : ك + ٢ ك كالنسبة

المركبة من ١٧ : ٢ و ٢ : ٧ فإهي قيمة ك وي الجواب ك = ١٢ ي = ١٠

(١٣) مطلوب ثلاثة اعداد على نسبة متصلة اوسطها ٦٠ ومجموع الطرفين

الجواب ٤٥ ٦٠ ٨٠

١٢٥

(١٤) ما اعدادان حاصلها ١٣٥ وفضلته مربعيهما الى مربع فضلتهما :: ٤ : ١

الجواب ١٥ و ٩

(١٥) ما اعدادان نسبة فضلتهما ومجموعهما وحاصلها كنسبة ٢ و ٣ و ٥

الجواب ١٠ و ٢

(١٦) اقس ٢٤ الى قسمين نسبة حاصلها الى مجموع مربعيهما :: ٢ : ١٠

الجواب ١٨ و ٦

(١٧) مزيج من خمير وماء كانت فيه نسبة فضلتهما : الماء :: ١٠٠ : الخمير

ونفس هذه الفضلة الى الخمير :: ٤ : الماء. فكم في المزيج من الصنفين

الجواب خمير ٢٥ ماء ٥

(١٨) ما اعدادان نسبة احدهما الى الاخر :: ٣ : ٢ وإذا اضيف ٦ الى الأكبر

وطرح ٦ من الأصغر فيكون المجموع الى الفضلة :: ٣ : ١

الجواب ٢٤ و ١٦

(١٩) ما عددان حاصلها ٢٢٠ ونسبة فضلة كعيبيها الى كعب فصلتها ::

الجواب ٢٠ و١٦

١ : ٦١

(٢٠) ما عددان نسبة احدهما الى الاخر كالنسبة المئوية بين ٤ و٢

الجواب ٢٢ و١٨

والمتناسب المتوسط بينهما هو ٢٤



الفصل الرابع عشر

في التغير او النسبة العمومية

١٩٥ قد يحدث احياناً ان اجزاء نسبة يتعلق بعضها ببعض حتى يتغير احدها بتغير اخر منها فتحفظ النسبة . مثاله ان يقال ان ثمن ٥٠ ذراعاً من قاشٍ = ١٠٠ غرش فان طرّح من الاذرع ١٠ نصير ٤٠ فطرّح من الثمن ٢٠ فيصير ٨٠ وان صارت الاذرع ٣٠ بصير الثمن ٦٠

ذ	ذ	ذ	ذ	
٨٠	: ١٠٠	:: ٤٠	: ٥٠	اي
٦٠	: ١٠٠	:: ٢٠	: ٥٠	و
٤٠	: ١٠٠	:: ٢٠	: ٥٠	و

فكلما تغيرت نالي الزوج الاول بتغير مثله نالي الثاني حتى تبقى النسبة محفوظة . اذا فرض سابقان ت وب وفرضت كمية من جنس ت ولكن اكبر منها او اصغر . وب كمية من جنس ب اكبر او اصغر مراراً مساوية للاحاد التي في فضلة ت وت فتكون ت : ت :: ب : ب فان تغيرت ت وصارت ت بتغير ب وتغير ب ويقال ان ت تغيرت بتغير ب او بالاختصاص ان تاء كباء كما يقال ان اجرة فاعلي تتغير كتغير مده عمله وان ربح مبلغ بتغير كتغير راس المال . ولنا هنا جزءان من نسبة وكل نسبة لها اربعة اجزاء . فاذا قولنا السابق انما هو عبارة مختصرة بذكر جزءين من النسبة عوض الاربعة . ولو بسطنا العبارة لقلنا نسبة راس مال : راس مال اخر :: ربح الاول : ربح الثاني

١٩٦. نحتاج في بعض المسائل التعليمية او الفلسفية الى معرفة نسبة شيء الى
 خبر دون معرفة قيمتها الخصوصية. ويكفي لذلك جزءاً نسبياً غير انه ينبغي ان نذكر
 كون الجزءين الاخرين متضمنين في المذكورين. كما لو قيل ان ثقل الماء هو بالنسبة
 لـ ب مقداره فانه يراد به ان رطلاً : عدة ابطال مفروضة :: ثقل رطل : ثقل
 لارطال المفروضة ويدل على نسبة بين كميات غير ثابتة بهذه العلامة - مثالها ت
 - ب فيراد ان ت تتغير كتغير ب اي ان ت : ت :: ب : ب ويقال لهذا العبارة
 ي ت - ب نسبة عمومية

١٩٧ متى زادت كمية عند زيادة اخرى او نقصت عند نقصانها قيل ان
 الاولى تغيرت كالاخري بالاستقامة. فان رباة دين مثلاً يزيد او ينقص بالنسبة الى
 اس المال فان تضاعف راس المال تضاعف الرباه وهلمّ جراً. واذا نقصت كمية
 عند زيادة اخرى او بالعكس قيل ان الاولى تتغير كالثانية بالقلب. مثالها ان الوقت
 الذي فيه الفاعل يجمع مبلغاً يكون بالقلب كاجرتو اي كلما زادت الاجرة قلّ الوقت
 وبالقلب

١٩٨ متى زادت كمية او نقصت كزيادة حاصل كبيتين او نقصانها قيل انها
 تغيرت كتغيرها معاً. مثالها رباة دين يتغير كحاصل راس المال في الوقت. فان
 تضاعف راس المال وتضاعف الوقت زاد الرباه اربعة امثال. ومتى كانت كمية متناسبة
 ابداً مع اخرى مقسومة على كمية ثالثة قيل انها تتغير بالاستقامة كالثانية وبالقلب
 كالثالثة. مثاله ان كانت ت : ت :: ب : ب تكون ت - ب فنرى
 ما سبق ان هذا الباب لا يلزم له شيء سوى ان يقاس على قواعد النسبة المتقدم
 ذكرها. وان النسبة العمومية انما هي عبارة مختصة يذكر فيها جزءان من اربعة اجزاء
 نسبة. وان اشكل شيء من مسائله يوضح جلياً بذكر الجزءين المخدوفين

١٩٩ يتضح مما سبق انه يمكن عكس ترتيب الاجزاء في نسبة عمومية كما في
 نسبة خصوصية. فان كان ت - ب فكذلك ب - ت لان ت : ت :: ب : ب
 اذا ب : ب :: ت : ت

وان ضرب جزء او جزءان من نسبة عمومية في كمية واحدة ثابتة او انقسما عليها
 فلا تتغير النسبة (١٨٤) مثاله

اذا فرضت : ت :: ب : ب اي ت س ب فيكون م ت : م ت :: ب : ب
 اي م ت س ب وم ت : م ت :: م ب : م ب اي م ت س م ب الخ
 وهكذا ان ضرب كلا الجزئين في كمية غير ثابتة او انقسما عليها لا تتغير النسبة.
 فان فرض م كمية متغيرة وت : ت :: ب : ب اي ت س ب يكون م ت : م ت
 :: م ب : م ب اي م ت س م ب

فرع اول اذا تغيرت كمية كاخرى يكون الخارج من قسمة احدها على الاخرى
 كمية ثابتة كما يتضح من انه اذا تغيرت صورة كسر كتنغير مخرجه لا تتغير قيمته
 مثاله ت : ت :: ب : ب اي ت س ب اذا $\frac{ت}{ب} : \frac{ت}{ب} :: \frac{ت}{ب} : \frac{ت}{ب}$
 :: ١ : ١

فرع ثان اذا كان حاصل كيتين ثابتا تتغير احدها كمكفوه الاخرى. مثاله
 ت ب : ت ب :: ١ : ١ يكون $\frac{ت}{ب} : \frac{ت}{ب} :: \frac{١}{ب} : \frac{١}{ب}$ او ت : ت ::
 $\frac{١}{ب} : \frac{١}{ب}$

فرع ثالث يمكن نقل كمية من احد جزوي نسبة عمومية الى الاخر. فاذا كان
 مضروباً فيه في احدها بصير مقسوماً عليه في الاخر. مثاله ت س ب يكون ايضاً
 $\frac{ت}{ب} - س$ وان كان ت س $\frac{١}{د}$ يكون ت س $\frac{١}{د}$

٢٠٠ اذا تغيرت كلتا كيتين كالثالثة تتغير احدها كالاخرى

مثاله ت : ت :: ب : ب	اي ت س ب
س : س :: ب : ب	اي س س ب
اذا ت : ت :: س : س	اي ت س س

واذا تغيرت كيتان كالثالثة يتغير مجموعها وفضلتها ايضاً كالثالثة. مثاله اذا
 فرض

ت : ت :: ب : ب	اي ت س ب
وس : س :: ب : ب	اي س س ب

فأذات + س : ت + س :: ب : بَ اي ت + س - س ب و ت - س :
 ت - س :: ب : بَ اي ت - س س - ب
 وهكذا تعددت الكميات التي تتغير ككمية واحدة. مثالة اذا فُرِضَ ت
 ب و س - ب و د - ب و ي - ب
 فان (ت + س + د + ي) - ب

واذا تغير مربع مجموع كيتين كربع فضلنها بتغير مجموع مربعيها كحاصلها.

فان فُرِضَ (ت + ب) - أ (ت - ب) يكون ت + ب - أ س ت ب لان
 بالمفروض (ت + ب) : أ : (ت - ب) : (ت + ب) :: (ت - ب) : (ت - ب) - أ

بالسطر والجمع والطرح حسب ما تقدم في النسبة لنا

أ ت + أ ب : أ ب : ٤ ت ب :: أ ت + أ ب : أ ب : ٤ ت ب

وبالتقسمة ت + ب : ب : ت :: ت + ب : ب : ت اي ت + ب - ب س ت ب

٢٠١ قد يمكن ايضا ان تُضرب اجزاه نسبة عمومية في اجزاء اخرى او تُقسَم عليها

اي ت - س ب	ت : ت :: ب : بَ	فان فرض
اي س - د	و س : س :: د : دَ	
اي ت س - س ب د	ت س : ت س :: ب د : ب دَ	اذا

فرع اذا تغيرت كلتا كيتين كالثالثة بتغير حاصل الاثنتين كربع الاخرى

مثالة اذا فُرِضَ ت - ب

و س - ب

اذا ت س - ب

واذا تغيرت كمية كاخرى بتغير اية قوتها او اي جذر فُرِضَ من الواحدة مثل

ذلك الجذر او تلك القوة من الاخرى (ع٢٤)

مثالة اذا فُرِضَ ت : ت :: ب : ب اي ت ب
 يكون ت : ت :: ب : ب اي ت ب

و ت : ت :: ب : ب اي ت ب

١٩١ في تركيب بعض النسب يمكن افناء الاجزاء المتساوية واخراجها قبل الضرب لاجل اختصار العمل. مثاله

$$ت : ب :: س : د$$

$$م : ت :: ت : س$$

$$ت : م :: ب : ت :: س : ن :: س : د$$

فاذا م : ت :: ن : د وهكذا

$$ت : ب :: س : د \quad ٢ : ٩ :: ٤ : ١٢$$

$$ب : ح :: د : ل \quad ٦ : ٢ :: ٨ : ٤$$

$$ح : م :: ل : ن \quad ١٥ : ٦ :: ٢٠ : ٨$$

$$ت : م :: س : ن \quad ١٥ : ٩ :: ٢٠ : ١٢$$

١٩٢ متى كانت اربع كميات متناسبة فاذا كانت الاولى اعظم من الثانية تكون الثالثة اعظم من الرابعة واذا كانت مثلها فمثلها او اصغر فاصغر

$$\left. \begin{array}{l} ت = ب \quad س = د \\ ت < ب \quad س < د \\ ت > ب \quad س > د \end{array} \right\} \text{ فاذا } ت : ب :: س : د$$

فرع اذا كانت الاولى اعظم من الثالثة تكون الثانية اعظم من الرابعة (اقليدس ك ه ق ١٤) فان فرضت : ب :: س : د فبالمبادلة ت : س :: ب : د وحينئذ ان كان ت = ب يكون س = د الى اخره

فرع ثان اذا فرضت : م :: س : ن

وم : ب :: ن : د فان كان ت = ب تكون س = د

الى اخره (اقليدس ك ه ق ٢٠) لان بالتركيب ت : ب :: س : د ومن ثم ان كان ت = ب تكون س = د الى اخره

$$\left. \begin{array}{l} ت : م :: ن : د \\ م : ب :: س : ن \end{array} \right\} \text{ وهكذا ان فرض}$$

فان كانت = ب يكون س = د الى اخره (اقليدس ك ٥ ق ٢١)
 اذا كانت اربع كميات متناسبة تكون مكفواتها متناسبة ايضاً. فاذا فرض
 ت : ب :: س : د يكون $\frac{1}{ت} : \frac{1}{ب} :: \frac{1}{س} : \frac{1}{د}$ لان الحاصل من تحويلها
 كليهما هوت د = ب س

نبذة

في النسبة المتصلة

١٩٢ في النسبة المتصلة (١٦٨) تكون جميع التناسبات متساوية. فاذا
 فرض ت : ب :: ب : س :: س : د :: د : هـ يراد ان تناسب ت : ب يعدل
 تناسب ب : س وتناسب س : د الى اخره. وتناسب الاولى الى الاخيرة يعدل
 الحاصل من التناسبات المتوسطة بينها اي تناسب ت : هـ ي يعدل $\frac{ت}{ب} \times \frac{ب}{س} \times \frac{س}{د} \times \frac{د}{هـ}$
 $\frac{ت}{ب} \times \frac{ب}{س} \times \frac{س}{د} \times \frac{د}{هـ}$ ولكن هذه التناسبات كلها متساوية فيمكن الضرب في ايتها
 شيئاً اي $\frac{ت}{ب} = \frac{ب}{س} \times \frac{س}{د} \times \frac{د}{هـ}$ فيكون ت : هـ :: ت : ب^٤
 ولنا من ذلك هذه القاعدة

وهي اذا كانت عدة كميات على نسبة متصلة تكون نسبة الاولى الى الاخيرة كنسبة
 احد التناسبات المتوسطة مرفقة الى قوة دليلها اقل من عدة الكميات بواحد. مثالة
 اذا فرض ت : ب :: ب : س تكون ت : س :: ت : ب^٢ وان فرض
 ت : ب :: ب : س :: س : د :: د : هـ ي تكون ت : هـ :: ت : ب^٤

١٩٤ اذا كانت عدة كميات على نسبة متصلة تكون متناسبة ايضاً اذا
 انعكس ترتيبها حسب ما تقدم (١٨١) فاذا فرض

٤	٨	١٦	٣٢	٦٤	
	٢	٢	٢	٢	فالتناسبات
٦٤	٣٢	١٦	٨	٤	وبالعكس
	$\frac{1}{٢}$	$\frac{1}{٢}$	$\frac{1}{٢}$	$\frac{1}{٢}$	فالتناسبات

اي متى انعكس ترتيب الكميات تكون التناسبات مكفوءات التناسبات المستقيمة ومكفوءات كميات متساوية هي متساوية كما يتضح من الاولية الرابعة

مسائل

(١) اقس ٦٠ الى قسمين تكون نسبة حاصلها الى مجموع مربعيها كنسبة ٢

الى ٥

لنفرض $ك = قسما$ و $٦٠ - ك = القسم الاخر$

(١) بالشروط $٦٠ ك - ك : ك : ٢ ك + ٢٦٠٠ - ١٢٠ ك :: ٢ : ٥$

(٢) بالتحويل الى معادلة $٣٠٠ ك - ٥ ك = ٤ ك + ٧٢٠٠ - ٢٤٠ ك$

(٣) بالمقابلة والقسمة $٦٠ ك - ٨٠٠ = ٤٠ ك$

(٤) بالتام التربع والتجذير والمقابلة $٤٠ ك = ٦٠ - ٤٠ = ٢٠$

(٢) اقس ٤٩ الى قسمين تكون نسبة اكبرها مع ستة الى الاصغر الاحد

عشر كنسبة ٢ : ٩

لنفرض $ك = الاكبر$ و $٤٩ - ك = الاصغر$

بالشروط $٦ + ٢٨ ك - ٢ : ٩ :: ٢ : ٩$

باضافة السابقين الى التاليين $٦ + ٤٤ ك :: ٩ : ١١$

بقسمة التاليين $٦ + ٤ ك :: ٩ : ١$

ثم بالتحويل $٦ + ٢٦ ك = ٩$ $٣٠ ك = ٩$

(٣) اي عدد اذا اضيف اليه ١ ثم ٥ ثم ١٢ تكون نسبة المجموع الاول :

الثاني :: الثاني : الثالث

لنفرض العدد ك

ثم بالشروط $١ + ك : ٥ + ك :: ٥ + ك : ١٢ + ك$

بالطرح $١ + ك : ٤ :: ٥ + ك : ٨$

بقسمة التاليين $١ + ١ : ١ :: ٥ + ك : ٢$

ثم $٢ ك + ٢ = ٥ + ك$ $ك = ٣$

(٤) ما عددان نسبة اكبرها الى الاصغر كجانبينها الى ٤٢ وكفضلتها الى ٦

لنفرض العددين ك وى
 ثم بالشرط الاول ك : ى :: ك + ى : ٤٢
 وبالثاني ك : ى :: ك - ى : ٦
 بالمساواة ك + ى : ٤٢ :: ك - ى : ٦
 بقلب الوسطين ك + ى : ك - ى :: ٤٢ : ٦
 بالجمع والطرح ٢ك : ٢ى :: ٤٨ : ٢٦
 بالقسمة ك : ى :: ٤ : ٢
 ٢ك = ٤ى ك = $\frac{٤}{٢}$ ى ثم بالتعويض في النسبة الثانية لنا
 ٢٤ = ى ٢٢ = ك

(٥) اقسام ١٨ الى قسمين بين مربعيها نسبة ٢٥ : ١٦

لنفرض القسمين ك و١٨ - ك

ثم بالشروط ك : (١٨ - ك) : ٢٥ :: ١٦ : ٢٥

بالتجذير ك : ١٨ - ك :: ٥ : ٤

بالجمع ك : ١٨ :: ٥ : ٩

بالقسمة ك : ٢ :: ٥ : ١٠

(٦) اقسام ١٤ الى قسمين تكون نسبة الخارج من قسمة الاكبر على الاصغر

الى الخارج من قسمة الاصغر على الاكبر كنسبة ١٦ : ٩

لنفرض اكبرها ك والاصغر ١٤ - ك

بشروط $\frac{ك}{١٤ - ك} : \frac{١٤ - ك}{ك} :: ١٦ : ٩$

بالضرب ك : (١٤ - ك) : ١٦ :: ٩ : ١٦

بالتجذير ك : ١٤ - ك :: ٤ : ٣

بالجمع ك : ١٤ :: ٤ : ٧

بالقسمة ك : ٢ :: ٤ : ٨

(٧) اقسام ٢٠ الى قسمين بينها نسبة ٢ المئوية الى ١ المئوية واستعلم متناسبا

متوسطا بينها

لنفرض احدها ك والاخر ٢٠-ك

بالشروط ك : ٢٠-ك :: ٣ : ١ :: ٩ : ١

بالجمع ك : ٢٠ : ٩ :: ٣ : ١٠ : ك = ١٨ والاخر = ٢ وبالتناسب المتوسط

$$٦ = \sqrt{١٨ \times ٢} = (١٧٩ \text{ حسب})$$

(٨) اي عدد ين حاصلها ٢٤ ونسبة فضلة كعبيها الى كعب فضلتهما كسبنا

١ : ١٩

لنفرض ك احدها وى والاخر

بالمفروض كى = ٢٤

وايضاً ك^٢ - ك^٢ : ك^٢ - ك^٢ :: ١٩ : ١

بالبسط ك^٢ - ك^٢ : ك^٢ - ك^٢ :: ١٩ : ١

بالطرح (١٨٨) ٢ ك^٢ - ك^٢ : ٢ ك^٢ - ك^٢ :: ١٨ : ١

بالقسمة على ك - ك^٢ : ك^٢ - ك^٢ :: ١٨ : ١

٢ ك^٢ - ك^٢ = ٢٤ × ٢ = ٧٢ حسب المفروض

فبالتعويض ٧٢ : ك^٢ - ك^٢ :: ١٨ : ١

بالضرب والقسمة (ك - ك^٢) = ٤ : ك - ك^٢ = ٢ : ك^٢ - ك^٢ = ٢٤ : ك =

ى = ٤

(٩) مفروض (ت + ك) : (ت - ك) :: ك + ى : ك - ى

هات البرهان من ذلك على ان ت : ك :: ٣٢ : ١٢

بالبسط ت + ٢ : ت + ك + ك : ت - ٢ : ت - ك + ك + ك : ك - ى

بالجمع والطرح ٢ : ت + ٢ : ٤ : ت : ٢ : ك : ٢ : ك

بالقسمة ت + ٢ : ت + ك : ٢ : ك : ى

بنقل ك ت + ٢ : ت + ك : ٢ : ك : ى

بقلب الوسطين ت + ٢ : ك : ٢ : ت : ى

بالطرح ت : ك : ٢ : ت - ى : ى

بالتجذير ت : ك :: ٣٢ : ١٢

(١٠) مفروض ك : ى :: ت : ب

وَإيضاً ت : ب :: $\sqrt{2}س + ك$: $\sqrt{2}د + ي$

هات البرهان على ان $دك = سي$

بالترقية ت : ب :: $\sqrt{2}س + ك$: $د + ي$

بالمساواة س + ك : $د + ي$:: ك : ي

بقلب الوسطين س + ك : ك :: $د + ي$: ي

بالطرح س : ك :: $د + ي$

ثم $دك = سي$

(١١) مفروض $\frac{ت - ك}{ب} = \xi$ ت برهن ان ت + ك : ٢

:: ٢ : ت - ك

(١٢) مفروض ك : ي :: ٣٦ : ٢٥ ونسبة ٢ ك + ي : ك + ٢ ك كالنسبة

المركبة من ١٧ : ٢ و ٢ : ٧ فاي قيمة ك وي الجواب ك = ١٢ ي = ١٠

(١٣) مطلوب ثلاثة اعداد على نسبة متصلة اوسطها ٦٠ ومجموع الطرفين

الجواب ٤٥ ٦٠ ٨٠

١٢٥

(١٤) ما اعدادان حاصلها ١٢٥ وفضلته مربعيهما الى مربع فضلتهما :: ٤ : ١

الجواب ١٥ و ٢

(١٥) ما اعدادان نسبة فضلتهما ومجمعهما وحاصلها كنسبة ٢ و ٣ وه

الجواب ١٠ و ٢

(١٦) اقم ٢٤ الى قسمين نسبة حاصلها الى مجموع مربعيهما :: ٢ : ١٠

الجواب ١٨ و ٦

(١٧) مزيج من خمر وماء كانت فيو نسبة فضلتهما : الماء :: ١٠٠ : الخمر

ونفس هذه الفضلة الى الخمر :: ٤ : الماء. فكم في المزيج من الصنفين

الجواب خمر ٣٥ ماء ٥

(١٨) ما اعدادان نسبة احدهما الى الاخر :: ٣ : ٢ واذا اضيف ٦ الى الاكبر

وطرح ٦ من الاصغر فيكون المجموع الى الفضلة :: ١ : ٢ الجواب ٢٤ و ١٦

(١٩) ما عددان حاصلها ٢٢٠ ونسبة فضلة كعبيها الى كعب فصلتها:

الجواب ٢٠ و١٦

١ : ٦١

(٢٠) ما عددان نسبة احدهما الى الاخر كالنسبة المئوية بين ٤ و١

الجواب ٢٢ و١٨

والمتناسب المتوسط بينهما هو ٢٤



الفصل الرابع عشر

في التغير او النسبة العمومية

١٩٥ قد يحدث احيانا ان اجزاء نسبة يتعلق بعضها ببعض حتى يتغير احدها بتغير اخر منها فتحفظ النسبة . مثاله ان يقال ان ثمن ٥٠ ذراعاً من قماشٍ = ١٠٠ غرش فان طرّح من الاذرع ١٠ نصير ٤٠ فيُطرح من الثمن ٢٠ فيصير ٨٠ وان صارت الاذرع ٢٠ يصير الثمن ٦٠

ذ	ذ	ذ	ذ	
٨٠	: ١٠٠	::	٤٠ : ٥٠	اي
٦٠	: ١٠٠	::	٢٠ : ٥٠	و
٤٠	: ١٠٠	::	٢٠ : ٥٠	و

فكلما تغير نالي الزوج الاول بتغير مثله نالي الثاني حتى تبقى النسبة محفوظة . اذا فرض سابقان ت وب وفرضت كمية من جنس ت ولكن اكبر منها او اصغر . وب كمية من جنس ب اكبر او اصغر مراراً مساوية للاحاد التي في فضلة ت وت فتكون ت : ت :: ب : ب فان تغيرت ت وصارت ت بتغير ب وتصير ب ويقال ان ت تغيرت بتغير ب او بالاختصاص ان تاه كباء كما يقال ان اجرة فاعلي تتغير كتغير مده عمله وان ربح مبلغ يتغير كتغير راس المال . ولنا هنا جزءان من نسبة وكل نسبة لها اربعة اجزاء . فاذا قولنا السابق انما هو عبارة مختصة بذكر جزءين من النسبة عوض الاربعة . ولو بسطنا العبارة لقلنا نسبة راس مال : راس مال اخر :: ربح الاول : ربح الثاني

١٩٦ نحتاج في بعض المسائل التعليمية او الفلسفية الى معرفة نسبة شيء الى اخر بدون معرفة قيمتها الخصوصية. ويكفي لذلك جزءاً نسبياً غير انه ينبغي ان نذكر كون الجزءين الاخرين متضمنين في المذكورين. كما لو قيل ان ثقل الماء هو بالنسبة الى مقداره فانه يراد به ان رطلاً : عدة ابطال مفروضة :: ثقل رطل : ثقل الارطال المفروضة ويدل على نسبته بين كميات غير ثابتة بهذه العلامة - مثالها ت - ب فيراد ان ت تتغير كتغير ب اي ان ت : ت :: ب : ب ويقال لهذه العبارة اي ت - ب نسبة عمومية

١٩٧ متى زادت كمية عند زيادة اخرى او نقصت عند نقصانها قيل ان الاولى تغيرت كالاخرى بالاستقامة. فان رباة دين مثلاً يزيد او ينقص بالنسبة الى راس المال فان تضاعف راس المال تضاعف الرباة وهلمّ جراً. واذا نقصت كمية عند زيادة اخرى او بالعكس قيل ان الاولى تتغير كالثانية بالقلب. مثالها ان الوقت الذي فيه الفاعل يجمع مبلغاً يكون بالقلب كاجرتو اي كلما زادت الاجرة قلّ الوقت وبالقلب

١٩٨ متى زادت كمية او نقصت كزيادة حاصل كمتين او نقصانها قيل انها تغيرت كتغيرها معاً. مثالها رباة دين يتغير كحاصل راس المال في الوقت. فان تضاعف راس المال وتضاعف الوقت زاد الرباة اربعة امثال. ومتى كانت كمية متناسبة ابداً مع اخرى مقسومة على كمية ثالثة قيل انها تتغير بالاستقامة كالثانية وبالقلب كالثالثة. مثاله ان كانت ت : ت :: ب : ب تكون ت - ب فنرى ما سبق ان هذا الباب لا يلزم له شيء سوى ان يقاس على قواعد النسبة المتقدم ذكرها. وان النسبة العمومية انما هي عبارة مختصة يذكر فيها جزءان من اربعة اجزاء نسبة. وان اشكل شيء من مسائله يوضح جلياً بذكر الجزءين المخدوفين

١٩٩ يتضح مما سبق انه يمكن عكس ترتيب الاجزاء في نسبة عمومية كما في نسبة خصوصية. فان كان ت - ب فكذلك ب - ت لان ت : ت :: ب : ب اذا ب : ب :: ت : ت

وان ضرب جزء او جزءان من نسبة عمومية في كمية واحدة ثابتة او انقسما عليها فلا تتغير النسبة (١٨٢) مثاله

اذا فُرِضَ ت : ت :: ب : ب اي ت س ب فيكون م ت : م ت :: ب : ب
 اي م ت س ب وم ت : م ت :: م ب : م ب اي م ت س م ب الخ
 وهكذا ان ضُرِبَ كلا الجزئين في كمية غير ثابتة او انقسما عليها لا تتغير النسبة
 فان فرض م كمية متغيرة وت : ت :: ب : ب اي ت س ب يكون م ت : م ت
 :: م ب : م ب اي م ت س م ب

فرع اول اذا تغيرت كمية كاخرى يكون الخارج من قسمة احدها على الاخرى
 كمية ثابتة كما يتضح من انه اذا تغيرت صورة كسرٍ كتغيير مخرجوه لا تتغير قيمته
 مثاله ت : ت :: ب : ب اي ت س ب اذا $\frac{ت}{ب} : \frac{ت}{ب} :: \frac{ب}{ب} : \frac{ب}{ب}$
 ١ : ١ ::

فرع ثانٍ اذا كان حاصل كميّتين ثابتاً تتغير احدها كمكفوه الاخرى. مثاله
 ت ب : ت ب :: ١ : ١ يكون $\frac{ت}{ب} : \frac{ت}{ب} :: \frac{١}{ب} : \frac{١}{ب}$ او ت : ت :
 $\frac{١}{ب} : \frac{١}{ب}$

فرع ثالث يمكن نقل كمية من احد جزوي نسبة عمومية الى الاخر. فاذا كان
 مضروباً فيه في احدها بصير مقسوماً عليه في الاخر. مثاله ت س ب س يكون ايضاً
 $\frac{ت}{ب} - س$ وان كان ت س $\frac{١}{د}$ يكون ت س $\frac{١}{د}$

٢٠٠ اذا تغيرت كلتا كميّتين كالثالثة تتغير احدها كالاخرى

مثاله ت : ت :: ب : ب	اي ت س ب
س : س :: ب : ب	اي س س ب
اذا ت : ت :: س : س	اي ت س س

واذا تغيرت كميّتان كالثالثة يتغير مجموعها وفضلتها ايضاً كالثالثة. مثاله اذا

فُرِضَ

ت : ت :: ب : ب	اي ت س ب
وس : س :: ب : ب	اي س س ب

فأذات + س : ت + س :: ب : بَ اي ت + س - س ب و ت - س :
 ت - س :: ب : بَ اي ت - س س ب
 وهكذا مهما تعددت الكميات التي تتغير ككمية واحدة. مثالة اذا فرضت
 ب و س - ب و د - ب و ي - ب
 فان (ت + س + د + ي) - ب

واذا تغير مربع مجموع كيتين كمربع فضلتهما بتغير مجموع مربعيهما كحاصلهما.

فان فرض (ت + ب) = (ت - ب) يكون ت + ب = ت - ب لان
 بالمفروض (ت + ب) : (ت - ب) :: (ت + ب) : (ت - ب)

بالسطر والجمع والطرح حسب ما تقدم في النسبة لنا

٢ ت + ٢ ب : ٤ ت ب :: ٢ ت + ٢ ب : ٤ ت ب

وبالقسمه ت + ب : ت ب :: ت + ب : ت ب اي ت + ب = ت ب

٢٠١ قد يمكن ايضا ان تضرب اجزاه نسبة عمومية في اجزاء اخرى او تقسم عليها

اي ت - س	ت : ت :: ب : بَ	اي ت - س
اي س - د	و س : س :: د : دَ	اي س - د
اي ت س - س ب د	ت س : س :: ت س : س ب د	اي ت س - س ب د

فرع اذا تغيرت كلتا كيتين كالثالثة بتغير حاصل الاثنتين كمربع الاخرى

مثالة اذا فرضت ت - س

و س - س ب

اذا ت س - س ب

واذا تغيرت كمية كاخرى بتغير اية قوتها او اي جذر فرض من الواحدة مثل

ذلك الجذر او تلك القوة من الاخرى (ع٢٤)

مثالة اذا فرضت ت : ت :: ب : ب اي ت ب
 يكون ت : ت :: ب : ب اي ت ب

و ت : ت :: ب : ب اي ت ب

٢٠٢ في تركيب نسب عمومية يمكن طرح كميات متساوية من الجزئين

مثال ت : ت :: ب : ب اي ت س ب
 وب : ب :: س : س اي ب س س
وس : س :: د : د اي س س د
اذا ت : ت :: د : د اي ت س د

فرع اذا تغيرت كمية كتابية والثانية كالثالثة والثالثة كرابعة وهلم جرا فالاولى
 تتغير كالاخيرة. مثال اذا فرضت س ب س س د فان ت س د واذا
 فرضت س ب س $\frac{1}{س}$ فان ت س $\frac{1}{س}$ اي ان تغيرت الاولى كالثانية والثانية
 كمكفوء الثالثة فالاولى تتغير كمكفوء الثالثة

٢٠٣ اذا تغيرت كمية كحاصل كميتين اخريين وكانت احدي الاخريين
 ثابتة فالاولى تتغير كالاخرى الغير الثابتة. مثال

اذا فرضت ك س ل ب وكانت ب ثابتة فاذا ك س ل ومثال ذلك ايضا ثقل
 اللوح فانه يتغير كتغير طول وعرض وعمقه فان بقي العمق على ما هو كان تغير
 ثقله كتغير طول وعرضه

فرع وهكذا مها تعددت الكميات. فان فرض
 ك س ل ب ط
 فان جعلت ل ثابتة ك س ب ط
 وان جعلت ل ب ثابتة ك س ط

وان كانت قيمة كمية متوقفة على اخريين وان فرضت الثانية تغيرت الاولى
 كالثالثة وان فرضت الثالثة تغيرت الاولى كالثانية فالاولى تتغير كحاصل الاخريين.
 مثال ان تغير ثقل لوح كالطول مع عرض مفروض وكالعرض مع طول مفروض
 ثم ان تغير الطول والعرض يتغير الثقل كحاصلها. وهكذا مها تعددت الكميات
 اذا تغيرت كمية كاخري تكون الاولى مساوية للثانية في كمية ما ثابتة. فان كان
 ت س ب فلا بد ان تكون نسبة ت : ب ثابتة. وقد يمكن ان تضرب ب في كمية ما

حتى يكون المحاصل ت وان كانت نسبة ربح ١٠٠ غرش : رأس المال :: ١ : ٢٠٠
 يكون لربح ١٠٠ غرش او ١٠٠٠ غرش نفس هذه النسبة الى رأس المال
 تنبيه . ان لفظه مفروض في مسائل هذا الباب ولا سيما في الفلسفة الطبيعية يراد
 بها كميات ثابتة كما انه في غير هذا الباب يراد بها كميات معروفة لتمييزها من المجهولة



الفصل الخامس عشر

في السلسلة الحسابية والهندسية

٢٠٤ السلسلة ويقال لها النسبة المتصلة نوعان حسابية وفيها كلامنا الان .
 وهندسية وسياقي الكلام عليها . اما الحسابية فهي عبارة عن طائفة من الكميات تعلق
 او تهبط بزيادة كمية مفروضة او طرحها على التوالي . مثالها ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠
 وهكذا بالعكس ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢ ويقال للاولى سلمة صاعدة وللثانية
 سلمة نازلة

٢٠٥ في السلسلة الصاعدة توجد كل حلقة باضافة الفضل المشترك الى ما
 قبلها . فان كانت الحلقة الاولى ٢ والفضل المشترك ٢ تكون السلسلة ٢ ٥ ٧
 ٩ ١١ ١٣ الى اخره . وان كانت الحلقة الاولى ت والفضل المشترك د تكون
 الحلقة الثانية ت + د والثالثة ت + د + د اي ت + ٢ د والرابعة ت + د + د + د
 + د اي ت + ٣ د والخامسة ت + د + د + د + د اي ت + ٤ د وهلم جرا . وتكون
 السلسلة ت وت + د وت + د + د وت + د + د + د وت + د + د + د + د الى اخره .
 وان كانت الحلقة الاولى والفضل المشترك متساويين اي الحلقة الاولى ت والفضل
 المشترك ت نصير الثانية ت + ت اي ٢ ت والثالثة ٢ ت + ت اي ٣ ت الى
 اخره . فتكون السلسلة ت ٢ ت ٣ ت ٤ ت الخ

وفي السلسلة النازلة توجد كل حلقة بطرح الفضل المشترك من التي قبلها فان
 كانت الحلقة الاولى ت والفضل المشترك د تكون السلسلة ت - د
 ت - ٢ د ت - ٣ د الخ

ثم ان هذا العمل بطول بنا جدا في سلسلة طويلة ولكن اذا نظرنا الى سلسلة

مثل ت ت + د ت + د ت + د ت + د ت + د الى اخره نرى ان د
اضيفت الى ت مراراً تماثل عدة الحلقات الا واحداً لان

ت + د	الحلقة الثانية هي
ت + د	والثالثة
ت + د الى اخره	والرابعة
ت + د	فتكون الحلقة الخمسون
ت + د	والحلقة المائة
ت - د	وان كانت نازلة تكون

اي ان د تضاف الى ت مراراً تماثل عدة الحلقات الا واحداً. فان فرض ت =
الحلقة الاولى ول = الاخيرة وع = عدد الحلقات وف = الفضل المشترك فلنال
ت + (ع - ١) × ف =

٢٠٦ لنا مما سبق هذه القاعدة وهي ان الحلقة الاخيرة من السلسلة الحسائية
تعديل الحلقة الاولى مضافة الى حاصل الفضل المشترك في عدة الحلقات الا واحداً.
وهكذا توجد اية حلقة فُرِضَتْ بان تحسبها الحلقة الاخيرة فتعدل عليها العبارة السابقة
ثم ان كانت الحلقة الاولى والفضل المشترك متساويين نصير العبارة ل = ت +
(ع - ١) × ت = ت + ت - ت اي ل = ت ع

٢٠٧ نرى في العبارة السابقة اربع كميات اي ت الحلقة الاولى ل الاخيرة
ع عدد الحلقات ف الفضل المشترك. فان فُرِضَ منها ثلاثٌ يمكن ان توجد منها
الاخرى

(١) لنا كما تقدم ل = ت + (ع - ١) ف = الاخيرة

(٢) بالمقابلة ل - (ع - ١) × ف = ت = الاولى

(٣) بالمقابلة والقسمة في الاولى $\frac{ل - ت}{١ - ع} = ف =$ الفضل المشترك

(٤) ايضاً بالمقابلة والقسمة في الاولى $\frac{ل - ت}{ف} + ١ = ع =$ عدد

الحلقات

ومن المعادلة الثالثة توجد اية عدة فرضت من اوساط حسابية بين عدد من
 دن عدة الحلقات تماثل الطرفين مع جميع الحلقات المتوسطة بينها. فان فرض ط
 = عدة الاوساط يكون ط + ٢ = ع اي عدة الحلقات. ثم بوضع ط + ٢ عوض ع
 في المعادلة الثالثة تصير $\frac{ل-ت}{١+ط} = ف = \text{الفضل المشترك}$

مفروض الحلقة الاولى من سلسلة صاعدة ٧ والفضل المشترك ٢ وعدة الحلقات
 ٩ ف ا هي الاخير

$$ل = ت + (ع - ١) ف = ٧ + (١ - ٩) \times ٢ = ٣١$$

والسلسلة ٧ ١٠ ١٣ ١٦ ١٩ ٢٢ ٢٥ ٢٨ ٣١

مفروض الحلقة الاخير من سلسلة صاعدة ٦٠ وعدة الحلقات ١٢ والنصل
 المشترك ٥ ف ا هي الاولى

$$ت = ل - (ع - ١) ف = ٦٠ - (١ - ١٢) \times ٥ = ٥٠$$

خذ سنة اوساط حسابية بين ١ و ٤٢

الفضل المشترك ٦ والسلسلة ١ ٧ ١٣ ١٩ ٢٥ ٣١ ٣٧ ٤٣

٢٠٨ يلزم احياناً معرفة مجموع حلقات سلسلة ويتوصل اليها بجمع الحلقات
 لا محالة. ولكن لنا طريقة اخصر من ذلك وهي انه لا بد ان يكون مجموع سلسلة
 صاعدة مثل ٣ ٥ ٧ ٩ ١١

مساوياً لمجموع سلسلة نازلة ١١ ٩ ٧ ٥ ٣

فيكون مجموع الاثنين مضاعف مجموع احدها فنجد بمجموعها مضاعف مجموع
 احدها. ثم ان اخذ نصفه يكون مجموع احدها

فلنفرض ٣ ٥ ٧ ٩ ١١

وعكسها ١١ ٩ ٧ ٥ ٣

يكون المجموع ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤

وهكذا
 وعكسها
 المجموع

٣ + ت ت + ٣ ٣ + ت ت + ٣ ٣ + ت ت + ٣

فلنا من ذلك هذه القضية وهي ان مجموع طرفي سلسلة يعدل مجموع ابي
 حلقتي فرضنا على بعد واحد من الطرفين. ولكي نجد مجموع الحلقات في السلسلتين
 لا يلزم الا ان تضرب مجموع الطرفين في عدد الحلقات اي $14 + 14 + 14$
 $0 \times 14 = 14 + 14$

وفي الثانية يكون المجموع $(2ت + 2د) \times 0$ وهذا مضاعف مجموع حلقات
 سلسلة واحد. ثم ان فرض $ت =$ الاولى $ل =$ الاخرة $ع =$ عدد الحلقات وم
 مجموع الحلقات لنا $م = \frac{ل+ت}{2} \times ع$ وهذه المعادلة مشتملة على هذه
 القاعدة وهي ان مجموع حلقات سلسلة حساية يعدل نصف مجموع الطرفين في
 عدد الحلقات

ما هو مجموع سلسلة الاعداد الطبيعية اي ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ الى ١٠٠٠
 الجواب $م = \frac{ل+ت}{2} \times ع = 1000 \times \frac{1000+1}{2} = 500500$
 ثم ان عوضنا عن $ل$ في هذه المعادلة بقيمتها في $ع$ نصير المعادلة

(١) $م = \frac{ت(١-ع) + ٢ت}{2} \times ع$ وفيها اربع كميات اي الحلقة
 الاولى والفضل المشترك وعدة الحلقات ومجموعها. وان فرض منها ثلاث نجد منها
 الرابعة. فبالتحويل نصير

$$(٢) ت = \frac{٢٢ + ف٢ - ع٢}{٢ع} = \text{الحلقة الاولى}$$

$$(٣) ف = \frac{٢٢ - ع٢}{٢ع} = \text{الفضل المشترك}$$

$$(٤) ع = \frac{٢(ت-٢) + ٢(١-ع) + ٢ت}{٢} =$$

(١) مفروض الحلقة الاولى من سلسلة صاعدة ٣ والفضل المشترك ٢ وعدد
 الحلقات ٢٠ فا هو مجموعها
 الجواب ٤٤٠

(٢) اذا وضع مائة حجر على خط مستقيم بين كل اثنين منها ذراع واحد فكم

بشي من يجمع الجميع في مكان بينه وبين الحجر الاول ذراع اذا كان كل متر مجل
جراً واحداً الجواب ١٠١٠٠ ذراع

(٢) ما هو مجموع ١٥٠ حلقة من سلسلة صاعدة مثل $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ 1 $\frac{4}{3}$

الجواب ٢٧٧٥ الى اخره $\frac{0}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{3}$

(٤) اذا كان مجموع سلسلة حسابية ١٤٥٥ والحلقة الاولى ٥ وعدد الحلقات

٣٠ فما هو الفضل المشترك الجواب ٢

(٥) مجموع سلسلة ٥٦٧ والحلقة الاولى ٧ والفضل المشترك ٢ فما هو عدد

الحلقات الجواب ٢١

(٦) ما هو مجموع ٢٢ حلقة من هذه السلسلة ١ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$

الجواب ٢٨٠ الخ

(٧) رجل اشترى ٤٧ كتاباً وكان ثمن الاول ١٠ غروش وثن الثاني ٣٠

غرشاً والثالث ٥٠ غرشاً وهلم جراً فكم بلغ ثمن الجميع

الجواب ٢٢٠٩٠ غرشاً

(٨) رجل اعطى صدقة للفقراء في اليوم الاول من السنة غرشاً وفي الثاني

غرشين وفي الثالث ثلاثة غروش وهلم جراً فكم اعطى في السنة

الجواب ٦٦٧٩٥

(٩) رجل اشترى اثواباً وكان ثمن الاول دينارين والثاني ٤ والثالث ٦ وهلم

جراً الى اخره وبلغ ثمن الجميع ١١٠ دنانير فكم ثوباً اشترى الجواب ١ اثواب

٢٠٩ في سلسلة اعداد وترية مثل ١ ٣ ٥ ٧ ٩ الى اخره تكون

الحلقة الاخيرة اقل بواحد من مضاعف عدد الحلقات ابناً لان $ل = ت + ١$

(ع - ١) ف حسباً تقدم. وفي السلسلة المفروضة $ت = ١$ و $ف = ٢$ فتكون

المعادلة $ل = ١ + (ع - ١) \times ٢ = ٢ع - ١$ وكذلك في سلسلة اعداد وترية

مثل ١ ٣ ٥ ٧ ٩ الى اخره مجموع الحلقات يعدل مربع عدد الحلقات

لان $م = \frac{1}{2}(ت + ل) \times ع$ وفي هذه السلسلة $ت = ١$ وحسباً تقدم $ل = ٢ع$

١ - فتصير المعادلة $m = \frac{1}{4}(1 + e^2 - e) = e = e^2$

مثالاً $\left\{ \begin{array}{l} 4 = 3 + 1 \\ 9 = 5 + 2 + 1 \\ 16 = 7 + 5 + 3 + 1 \end{array} \right.$ مربعات عدد الحلقات

٢١٠. اذا كان صفان من كميات في سلسلة حساية تكون مجموعاتها او فضلاتها ايضاً على سلسلة حساية لان ذلك جمع تناسبات او طرحها فقط

مثالاً	٣	٦	٩	١٢	١٥	١٨	٢١	التناسب = ٣
	٢	٤	٦	٨	١٠	١٢	١٤	التناسب = ٢
المجموع	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	التناسب = ٥
الفضلة	١	٣	٤	٥	٦	٧	٧	التناسب = ١

واذا ضرب جميع حلقات سلسلة حساية في كميته واحده او انقسم عليها تكون المحاصل او المخارج على سلسلة حساية ايضاً لان ذلك ضرب تناسبات او قسمتها

في سلسلة	٣	٥	٧	٩	١١	اذا ضرب في ٤
تصير	١٢	٢٠	٢٨	٣٦	٤٤	ثم اذا انقسم هذا على ٣
تصير	٦	١٠	١٤	١٨	٢٢	الى اخره

(١) مطلوب اربعة اعداد على سلسلة حساية مجموعها ٥٦ ومجموع مربعاتها ١٦٤

ك = الثاني $y =$ الفضل المشترك فتكون السلسلة $k - y$ ك + ك $y + 2y$

وبالشروط $(k - y) + k + (k + y) + (k + 2y) = 56$

وايضاً $(k - y)^2 + k^2 + (k + y)^2 + (k + 2y)^2 = 164$

بالاولى $4k + 2y = 56$

بالثانية $4k^2 + 4ky + 6y^2 = 164$

وتحويل هذه المعادلات لنا $k = 12$ $y = 4$

والاعداد ٢٠ ١٦ ١٢ ٨

(٣) ثلاثة اعداد في سلسلة حسابية مجموعها ٩ ومجموع كعومها ١٥٢ فا
هي هذه الاعداد الجواب ١ و ٢ و ٥

(٣) ثلاثة اعداد في سلسلة حسابية مجموعها ١٥ ومجموع مربعي الطرفين ٥٨
فا هي الاعداد

(٤) اربعة اعداد في سلسلة حسابية مجموع مربعي الاولين ٢٤ ومجموع مربعي
الآخرين ١٢٠ فا هي الاعداد الجواب ٢ ٥ ٧ ٩

(٥) لنان نجد عددًا ذا ثلاثة ارقام على سلسلة حسابية واذا انقسم العدد على
مجموع ارقامه يكون الخارج ٢٦ واذا اضيف اليه ١٩٨ ينقلب ترتيب الارقام

لنفرض الارقام ك-ى وك وك+ى فيكون العدد ١٠٠(ك-ى)
١٠+ك+(ك+ى)=١١١ك-٩٩ى

$$\text{وبالشروط } ١١١ك - ٩٩ى = ٢٦ \times ١٠٠$$

و١١١ك-٩٩ى=١٩٨+١٠٠(ك+ى)
ك=٣=ى=١ والعدد ٢٣٤

(٦) لنان نجد اربعة اعداد في سلسلة حسابية مجموع مربعي الطرفين فيها
٢٠٠ ومجموع مربعي الوسطين ١٢٦

(٧) ساع سعي الى مكان بعده ١٩٨ ميلاً. ففي اليوم الاول قطع من المسافة
٣٠ ميلاً وفي الثاني ٢٨ ميلاً وفي الثالث ٢٦ ميلاً وهم جراً في كم يوم قطع المسافة
كلها

الحلقة الاولى = ٣٠ الفضل المشترك = ٢ الجواب ٩

(٨) مطلوب اعداد على سلسلة حسابية فضلها المشترك ٢ ومجموعها يعدل
عدة الحلقات ثمان مرات واذا اضيف ١٢ الى الحلقة الثانية وانقسم المجموع على عدة
الحلقات يكون الخارج الحلقة الاولى

لنفرض ك=الاولى=ى=عدة الحلقات ك+٢=الثانية ك+(١-ى)
=٢=الاخيرة

$$\text{حسباً تقدم م} = \frac{٢ت + (١ - ع)ف}{٢} \times ع = ت = كى = ع$$

$$\text{ثم بالتعويض م} = \frac{٢ك + (١ - ى)ف}{٢} \times ى = كى + ى - ى$$

$$\text{وبالمسئلة كى} + ى - ى = ١ = ى - ١ = ك$$

$$\text{وأيضاً} \frac{ك + ٢ + ١٢}{ك - ١} = ك = ك = ٥ \text{ أو } ٢$$

$$٤ \text{ أو } ٦ = ى$$

والاعداد ٥ ٧ ٩ ١١ أو ٢ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٢

(٩) لئان نجد اربعة اعداد على سلسلة حسابية مجموعها ٢٨ وحاصلها ٥٨٥

في السلسلة الهندسية

٢١١ السلسلة الهندسية هي نسبة هندسية متصلة كما ان الحساية هي نسبة

حساية متصلة. فالاعداد ٦٤ ٢٢ ١٦ ٨ ٤ هي على نسبة هندسية

متصلة $\frac{٢٢}{٦٤}$ و اذا انقسم كل جزء على التناسب المشترك يخرج الجزء الذي يتلوه.

مثال $\frac{٦٤}{٢} = ٣٢$ و $\frac{٢٢}{٢} = ١١$ و $\frac{١٦}{٢} = ٨$ الى اخره. وهكذا اذا انعكس

الترتيب وصار المقسوم عليه المشترك مضروباً فيه. مثال $\frac{٢٢}{٨} = ٢٧٥$

٦٤ الى اخره $٨ = ٢ \times ٤$ و $١٦ = ٢ \times ٨$ و $٢٢ = ٢ \times ١١$ و $٢ \times ٢٢ =$

$= ٦٤$ الخ

ولنا من ذلك هذه القضية وهي ان الكميات التي تهبط بمقسوم عليه مشترك او

تعلو بمضرب فيه مشترك فهي على سلسلة هندسية. ويسمى المقسوم عليه او المضروب

فيه التناسب المشترك. وان جعلنا المقسوم عليه كسراً يمكن ان نحسبه المضروب فيه

ابداً كما في السلسلة السابقة فانها تهبط بالقسمة على ٢ او بالضرب في $\frac{١}{٢}$

٢١٢ في السلسلة الهندسية الصاعدة تُعرف كل حلقة بضرب التناسب

المشترك في التي قبلها. فان فرضت الاولى $ت$ والتناسب المشترك $ب$ تكون الحلقات

على هذا النسق $ت \times ب = ت ب = ت ب = الثانية$ $ت \times ب = ت ب = ت ب = الثالثة$

$ت \times ب = ت ب = ت ب = الرابعة$ $ت \times ب = ت ب = ت ب = الخامسة$ الخ وتكون

السلسلة ت ت ب ت ب ت ب ت ب الخ
 وإذا كانت الأولى والتناسب متساويين تكون السلسلة سرّد قوّات اي تكون
 الأولى ب والتناسب ب فتكون السلسلة ب ب ب ب ب ب الخ
 ٢١٣ في السلسلة النازلة توجد كل حلقة بقسمة التي قبلها على التناسب
 المشترك او ضربها في التناسب المشترك الكسري. فان كانت الحلقة الأولى ت ب
 بالقسمة على ب تصير ت ب^١ او بالضرب في ب تصير ت ب^٦ × ب^١

$$= \frac{ت ب^١}{ب} = ت ب^٠$$

وتكون السلسلة ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب الخ
 وان كانت الأولى ت والتناسب ب تكون السلسلة ت ب ت ب ت ب ت ب الخ

$$\frac{ت}{ب} \frac{ت}{ب} \frac{ت}{ب} \frac{ت}{ب} \frac{ت}{ب} \frac{ت}{ب} \frac{ت}{ب}$$

 ب^١ ت^١ الخ اوت ت ب^{-١} ت ب^{-٢} ت ب^{-٣} ت ب^{-٤} الخ وان
 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 نظرنا الى السلسلة ت ت ب ت ب ت ب ت ب الخ

نرى ان دليل القوة في كل حلقة اقل من عدد تلك الحلقة بواحد. فنرى في الثانية
 الدليل ١ وفي الثالثة الدليل ٢ وهلم جرا. فان فرض ت = الحلقة الأولى ل =
 الاخيرة ب = التناسب وع = عدد الحلقات لنا ل = ت ب ع^{-١} فلنا من
 ذلك هذه القضية وهي ان الحلقة الاخيرة من سلسلة هندسية تعدل الحلقة الأولى
 مضروبة في قوة من التناسب دليلها اقل من عدد الحلقات بواحد. ومتى كانت
 الأولى والتناسب متساويين نصير المعدلة ل = ت ب ع^{-١} = ب ع

٢١٤ اذا عُرِفَت ثلاث من الكميات المذكورة اي من ت ب ل ع تُعَرَف
 منها الاخرى

(١) لنا ما سبق ل = ت ب ع^{-١} = الاخيرة

(٢) بالقسمة ت = $\frac{ل}{ب ع - ١}$ = الأولى

(٣) بالقسمة والتجذير ب = $\sqrt[١]{\frac{ل}{ت ع - ١}}$ = التناسب

اما عدة الحلقات فتوجد من هذه المعادلة بالانساب اي اللغزثات وليس هذا موضعاً للذكر طريقتهما

ثم اننا بالمعادلة الاخيرة نجد اية عدد فُرِضَتْ من اوساط هندسية بين عددين .
 فان فرض $ط =$ الاوساط يكون $ط + ٢$ عدد الحلقات اي $ط + ٢ = ع$ ثم
 يعوض عن ع في المعادلة بنيتها فتصير $ب = \frac{١}{٢} ط + ١$ ومتى عرفنا
 التناسب نجد الاوساط بالضرب

ع ١ خذ وسطين هندسيين بين ٤ و ٢٥٦
 التناسب = ٤ والسلسلة ٤ ١٦ ٦٤ ٢٥٦

ع ٢ خذ ثلاثة اوساط هندسية بين $\frac{١}{٤}$ و $\frac{١}{٣}$ الجواب $\frac{١}{٣}$ ١ ٢
 ٢١٥ فلننظر الان الى كيفية جمع سلسلة هندسية فنرى انه اذا ضُرِبَتْ
 حلقة في التناسب يحصل حلقة اخرى . فان ضُرِبَ جميع الحلقات على هذا الاسلوب
 تحصل سلسلة جديدة شبيهة بالاولى الا في الحلقة الاولى والاخرى

مثال ٢ ٤ ٨ ١٦ ٢٢
 بالضرب في التناسب ٤ ٨ ١٦ ٢٢ ٦٤

فان طرح الثانية من الاولى لا يبقى سوى الحلقة الاولى من الاولى والاخرى
 من الثانية . وهكذا ان فُرِضَ ت ت ت ت ب ت ب ت ب ت ب ع-١
 فان ضربت كل حلقة في ب نصيرت ب ت ب ت ب ت ب ت ب ع-١
 ت ب ع وان فُرِضَ م = مجموع الحلقات فلنا م = ت + ت + ت + ت ب
 + ت ب ع-١ + ت ب ع-١ وبالضرب في ب م = ت ب + ت ب + ت ب + ت ب
 + ت ب ع-١ + ت ب ع

وبطرح الاولى من الثانية يبقى ب م - م = ت ب ع - ت
 وبالقسمة على ب - ١ م = $\frac{ت ب ع - ت}{١ - ب}$

وت ب ع هي الحلقة الاخيرة من سلسلة جديدة وهي تساوي حاصل التناسب

في الحلقة الاخيرة من السلسلة المفروضة اي ب ل

$$\frac{\text{ب ل} - \text{ت}}{١ - \text{ب}} = \text{م}$$

فلنا ما سبق هذه القاعدة لاستعلام مجموع حلقات سلسلة هندسية وهي ان تاخذ حاصل التناسب في الاخيرة ثم تطرح منه الاولى وتقسّم الباقي على التناسب الا واحداً
(١) سلسلة هندسية فيها الحلقة الاولى ٦ والاخيرة ١٤٥٨ والتناسب ٢ فا

$$\text{هو مجموع الحلقات الجواب م} = \frac{\text{ب ل} - \text{ت}}{١ - \text{ب}} = \frac{٦ - ١٤٥٨ \times ٢}{١ - ٢} = ٢١٨٤$$

(٢) سلسلة نازلة كانت فيها الحلقة الاولى $\frac{1}{٣}$ والتناسب $\frac{1}{٣}$ وعدد

الحلقات ٥ فا هو مجموع السلسلة

$$\text{الحلقة الاخيرة} = \text{ت} = \text{ب}^{-٤} = \left(\frac{1}{٣}\right)^٤ = \frac{1}{٨١}$$

$$\text{والمجموع} = \frac{\frac{1}{٣} - \frac{1}{٨١}}{١ - \frac{1}{٣}} = \frac{١٢١}{١٦٢}$$

(٣) ما هو مجموع هذه السلسلة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الى اخر الى ١٢ حلقة

الجواب ٢٦٥٧٢٠

(٤) ما هو مجموع عشر حلقات من هذه السلسلة ١ $\frac{٢}{٣}$ $\frac{٤}{٩}$

الجواب ١٧٤٠٧٥
٥٩٠٤٩

الخ $\frac{٨}{٢٧}$

٢١٦ كميات على سلسلة هندسية هي مناسبة لفضلاتها

لنفرض سلسلة ت ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب الخ فحسب كيفية

السلسلة ت : ت ب :: ت ب : ت ب :: ت ب : ت ب :: ت ب : ت ب :: ت ب : ت ب

اخر. ثم في كل زوج يطرح السابق من تاليه فتصيرت : ت ب :: ت ب - ت : ت ب - ت

: ت ب - ت ب :: ت ب - ت ب : ت ب - ت ب الخ

اي نسبة الاولى الى الثانية كنسبة فضلة الاولى والثانية الى فضلة الثانية والثالثة.

وكنسبة فضلة الثانية والثالثة الى فضلة الثالثة والرابعة وهم جراً الى اخر

فرغ إذا كانت كميات على سلسلة هندسية تكون فضلاتها أيضاً على سلسلة هندسية

مثالاً ٢ ٩ ٢٧ ٨١ ٢٤٣ الى اخره
وفضلاتها ٦ ١٨ ٥٤ ١٦٢ ايضاً على سلسلة

مسائل

(١) مطلوب ثلاثة اعداد على سلسلة هندسية مجموعها ١٤ ومجموع مربعاتها ٨٤

لنفرض الاعداد ك وى ول

بالشروط ك : ى :: ى : ل اي ك ل = ى

و ك + ى + ل = ١٤ وك + ى + ل = ٨٤ الاعداد ٢ و ٤ و ٨

(٢) مطلوب ثلاثة اعداد على سلسلة هندسية حاصلها ٦٤ ومجموع كعابها ٥٨٤

ك = الحلقة الاولى وى = التناسب فتكون السلسلة ك كى كى

بالشرط الاول ك × كى × كى = ٦٤ اي ك = ٢

بالتالي ك + كى + كى = ٥٨٤ ك = ٢ ى = ٢

والاعداد ٢ ٤ ٨

(٣) مطلوب ثلاثة اعداد على سلسلة هندسية مجموع الاول والثالث ٥٢

ومربع الوسط ١٠٠ الجواب ٢ ١٠ ٥٠

(٤) مطلوب اربعة اعداد على سلسلة هندسية مجموع الاولين ١٥ ومجموع

الاخيرين ٦٠ لنفرض السلسلة ك كى كى كى فنجد

الاعداد ٥ ١٠ ٢٠ ٤٠

(٥) رجل قسم ٢١٠ دينار بين بنو الثلاثة وكانت اقسامهم على سلسلة

هندسية. وكان للاول ٩٠ ديناراً اكثر من الاخير فكم كان قسم كل واحد منهم

(٦) مطلوب ثلاثة اعداد على سلسلة هندسية وفضلة اكبرها واصغرها ١٥

ونسبة فضلة مربعي الاكبر والاصغر الى مجموع مربعات الاعداد الثلاثة :: ٥ : ٧

الجواب ٥ ١٠ ٢٠

(٧) مطلوب أربعة اعداد على سلسلة هندسية الثانية منها اقل من الرابعة
 أربعة وعشرين ونسبة مجموع الطرفين : مجموع الوسطين :: ٧ : ٢

الجواب ١ ٢ ٣ ٤ ٢٧

(٨) رجل استخدم خادمًا الى مدة ١١ سنة . ووعده ان يعطيه في السنة الاولى
 حبة قمح و غلة هذه الحبة في الثانية و غلة الغلة في الثالثة وهم جراً الى نهاية المئة
 المذكورة . فان اثمرت كل حبة عشر حبات كل سنة فكم حبة تبليغ

الجواب ١١١١١١١١١١١٠

(٩) رجل هندي اخترع الشطرنج وقدمه الى الملك فاعجبه جداً وقال له
 مها طلبت اعطيك . فطلب الرجل حبة قمح للبيت الاول من رقعة الشطرنج
 وحبتين للثاني وارب حبات للثالث وثمانى للرابع وهم جراً الى الاربعة والستين بيتاً
 فكم حبة اخذ



الفصل السادس عشر

في الغير المتناهيات ونظير الغير المتناهي

٢١٧ الغير المتناهي بحسب مفهومه المطلق شيء لا يقبل زيادة ولا يتوهم له
 زيادة . وهذا هو المراد به في الاديات والالهيات . واما في العدد فلا يمكن تصوره
 اذ يمكن ان يزداد عدد حتى يتجاوز اي عدد فرض . وبحسب ذلك يكون العدد
 الاعظم ما يستحيل الوصول اليه . ومما زيد عدد يمكن ان يتوهم له زيادة فيكون
 المراد بالغير المتناهي في التعليمات غير المراد في غيرها كما مر

٢١٨ الكمية التعليمية اذا توهمت زيادتها فوق حدود مفروضة سميت غير
 متناهية . والمراد بالحدود المفروضة ما يستطيع العقل ادراكه . وعلى هذا المعنى تكون
 الاعداد الطبيعية التي هي ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الى اخره غير متناهية لانها مهما
 زيدت يمكن ان تزداد ايضاً . وبناء على هذا يمكن ان يقال في غير متناو انه اعظم من
 غير متناو اخر . مثاله ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ الى غير نهاية و٤ ٤ ٤ ٤ ٤

الى غير نهاية. فهما زاد السردان يكون الثاني مضاعف الاول وهكنا ت + ت +
 ت + ت + الخ و ت + ت + ت + ت + ت + الخ. يكون الثاني تسعة
 امثال الاول

يجب ان نميز بين كمية غير متناهية وعدة اجزاء غير متناهية اذ قد يمكن ان
 نعدد الاجزاء الى غير نهاية وتكون الكمية كلها متناهية وصغيرة. مثالة اذا اخذ
 واحد ثم نصفه ثم رعه وهلم جرا يكون لنا $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$ الى اخره
 فهما تعددت الاجزاء لا يمكن ان تفوق الواحد. وهكذا $\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$
 الى اخره لا يمكن ان تفوق الثانية

٢١٩ اذا هبطت كمية تحت حد مفروض سميت نظير الغير

$$\frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.00} \quad \frac{1}{1.0}$$

وعلى المعنى المذكور يمكن قسمة كمية الى غير نهاية. والكمية التي هي اصغر ما يكون
 لا يمكن الوصول اليها اذ لا يمكن تجزئها الى حرة لا يوم تجزئها ايضا وعلى هذا المعنى
 ايضا يمكن ان يكون نظير غير متناه اصغر من نظير غير متناه اخر. مثالة

$$\frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.00} \quad \frac{1}{1.0} \quad \text{الى اخره} \quad \frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.00} \quad \frac{1}{1.0}$$

الى اخره. فيكون الثاني نصف الاول مهما تعددت الاجزاء. وهكذا

$$\frac{1}{4.000} \quad \frac{1}{4.000} \quad \frac{1}{4.00} \quad \frac{1}{4.0} \quad \text{و} \quad \frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.000} \quad \frac{1}{1.00} \quad \frac{1}{1.0}$$

٢٢٠ اذا حدثت في الاعمال الجبرية كمية نظير الغير المتناهي يمكن طرحها
 من العمل بدون ان يجعل فرقا في الحاصل اذ لا اعتبار لما هو صغير بهذا المقدار
 حتى لا يشعر بخصوره او غيابه. مثالة في تحويل $\frac{1}{4}$ الى كسر عشري فان قسمنا
 الصورة على المخرج يكون لنا $\frac{1}{4}$ وهي تعدل $\frac{1}{4}$ تقريبا و $\frac{23}{100}$ اكثر

تقريباً و $\frac{222}{1000}$ أكثر تقريباً وهلم جراً حتى يصير الفرق بين $\frac{1}{3}$ والكسر العشري صغيراً جداً لا اعتبار له

ونرى ما سبق انه يمكن لكيفية ان تقترب الى اخرى الى غير نهاية بدون ان تبلغ اليها. مثاله في تحويل $\frac{1}{3}$ الى كسر عشري مهما امتد في منازل الكسر العشري لا يمكن ان يبلغ الى $\frac{1}{3}$ تماماً. ومهما تعددت المنازل فلا بد ان يبقى بينها وبين $\frac{1}{3}$ فرق ولو كان صغيراً الى غير نهاية. وفي كميات من هذا النوع سميت احدها حد الاخرى. فان $\frac{1}{3}$ هو حد $\frac{222}{1000}$ الى اخره و $\frac{2}{3}$ هو حد $\frac{66666}{100000}$. الخ الى غير نهاية. ثم ان نظير الغير المنتهي وان لم يكن له اعتبار في ذاته ان وقع مضروباً فيه او مقسوماً عليه يكون له احياناً اعتبار كلي. واذا كان نظير الغير المنتهي لا يفرق عن صفر بما يشعر به فيدل عليه احياناً بصفر ويدل على الغير المنتهي بهذه العلامة ∞

٢٢١ لما كان الغير المنتهي اعظم من نظير الغير المنتهي بما لا يوصف كان يمكن عند ارتباطها بعلامة الجمع او الطرح اخراج نظير الغير المنتهي من العمل بالكلية. وهكذا اذا ارتبط نظير الغير المنتهي بكمية متناهية. ولكن اذا ضرب غير متناه في متناه يزداد بذلك الغير المنتهي كقيمة الكميات. مثاله $2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2$ الخ \times يكون المحاصل $8 \ 8 \ 8 \ 8 \ 8$ الخ اي اربعة امثال الاولى. واذا انقسم غير متناه على متناه ينقص الاول كقيمة الكميات مثاله $6 \ 6 \ 6 \ 6 \ 6$ الخ \div $2 = 2 = 2 = 2 = 2$ الخ اي نصف الاولى. وان ضربت كمية متناهية في نظير الغير المنتهي يكون المحاصل نظير الغير المنتهي. مثاله اذا فرض $ل =$ المتناهية و $0 =$ نظير الغير المنتهي لنا $ل \times 0 = 0$. لانه لو كان المضروب فيه واحداً لكان المحاصل مساوياً للمضروب. وان كان اقل من واحد يكون المحاصل اقل من المضروب. وهنا فرضنا المضروب فيه اقل من واحد الى غير نهاية فيكون المحاصل اقل من المضروب فيه الى غير نهاية. واذا انقسمت كمية متناهية على نظير الغير المنتهي يكون الخارج غير متناه اي $ل \div \infty = 0$ لانه كلما قل المقسوم عليه زاد

المخرج وهنا قد قلّ المقسوم عليه الى غير نهاية فزاد المخرج الى غير نهاية. ومثله
 $2 = 2 + 6$ و $20 = 2 + 6$ و $200 = 2 + 6$ و $2000 = 2 + 6$ الخ
 واذا انقسمت متناهية على غير متناهية يكون المخرج نظير الغير المتناهي اب
 $\frac{1}{\infty} = 0$. لانه كلما زاد المقسوم عليه قلّ المخرج. فان زاد المقسوم عليه الى غير
 نهاية يقلّ المخرج الى غير نهاية



الفصل السابع عشر

في القسمة على المركب وفي العاد الأكبر

٢٢٢ اذا اردت القسمة على مقسوم عليه مركب فاقسم الجزء الاول من
 المقسوم على الاول من المقسوم عليه واضرب كل المقسوم عليه في المخرج واطرح
 الحاصل من المقسوم. ثم انزل من اجزاء المقسوم ما يقضي وهم جراً الى نهاية العمل
 وهذه صورته وامثلته

(١) اقسام ت س + ب س + ت د + ب د على ت + ب

$$\begin{array}{r} \text{ت + ب} \text{ (ت س + ب س + ت د + ب د) (س + د)} \\ \underline{\text{ت س + ب س}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ت د + د ب} \\ \underline{\text{ت د + ب د}} \end{array}$$

تنبيه. قبل القسمة يجب ترتيب الاجزاء حتى يكون الحرف الاول في المقسوم
 عليه اولاً في المقسوم. وان تكون القوة العليا فيها اولاً وتكتب بقية القوات على
 رتبة قواتها

(٢) اقسام ت^٢ ب + ب^٢ + ت^٢ ب + ت^٢ على ت^٢ + ب^٢ + ت^٢ ب فان

اخذنا ت^٢ للجزء الاول من المقسوم عليه يجب ان ناخذ ت^٢ للاول في المقسوم ونكتب
 البقية حسب قوات ت

$$\begin{array}{l} \text{ت} + \text{ب} + \text{ب}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب} + \text{ب}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب} + \text{ب}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ب}^{\text{ا}} \end{array}$$

ويجب في هذه الاعمال ملاحظة العلامات حسب القواعد المتقدمة في الطرح والضرب والقسمة

(٢) اقسام ٢ ك - ٢ ت ك - ٢ ت ك - ٢ ت ك + ٢ ت ك + ٢ ت ك -
ك على ٢ ت - ي فترتيب الاجزاء حسب قوات ت

$$\begin{array}{l} \text{٢ ت ك} - \text{٢ ت ك} - \text{٢ ت ك} + \text{٢ ت ك} + \text{٢ ت ك} - \text{٢ ت ك} + \text{ك} \\ \hline \text{٢ ت ك} - \text{٢ ت ك} \\ \hline \text{٢ ت ك} + \text{٢ ت ك} \\ \hline \text{٢ ت ك} - \text{٢ ت ك} \\ \hline \text{٢ ت ك} + \text{٢ ت ك} \\ \hline \text{٢ ت ك} - \text{٢ ت ك} \\ \hline \text{٢ ت ك} + \text{٢ ت ك} \end{array}$$

٢٢٢ قد رأينا في الضرب ان بعض الاجزاء احيانا تفي وعند القسمة تعود هذه الاجزاء فيكون في الخارج اجزائه لم تَر في المنسوم
(٤) اقسام ت + ك على ت + ك

$$\begin{array}{l} \text{ت} + \text{ك} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك} + \text{ت} + \text{ك} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(٥) ت} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ك} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \\ \hline \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} - \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} + \text{ت}^{\text{ا}} + \text{ك}^{\text{ا}} \end{array}$$

(٦) اقسام ت^٤ + ت^٣ + ت^٢ + ت + ب + ت + ٢ + س + ٢ + س على ت + ا

الخارج ت^٣ + ت + ب + ٢ + س

(٧) اقسام ت + ب - س - ت - ك - ب + ك + س + ك على ت + ب - س

الخارج ا - ك

(٨) اقسام ٢ - ١٢ + ت^٢ ك + ١١ ت^٢ ك - ٨ ت^٢ ك + ٢ ك^٤ على

٢ ت^٣ - ت^٢ ك + ك^٢ الخارج ت^٢ - ٦ ت^٢ ك + ٢ ك^٢

٢٢٤ اذا بقيت بقية بعد انزال جميع الاجزاء تكتب فوق المقسوم عليه على صورة كسرية كما في الحساب

مثال ٩ (ت + ب) ت + س + ب + س + ت + د + ب + د + ك (س + د) + $\frac{ك}{ت + ب}$

$\frac{ت + س + ب + س}{ت + د + ب + د + ك}$
$\frac{ت + د + ب + د}{ت + د + ب + د}$
$\frac{ت + د + ب + د}{ك}$

مثال ١٠ (د - ح) ت - د - ح + ب - د - ب + ح + ي (ت + ب) + $\frac{ي}{ح - د}$

$\frac{ت - د - ح}{ب - د - ب + ح}$
$\frac{ب - د - ب + ح}{ب - د - ب + ح}$
$\frac{ب - د - ب + ح}{ي}$

(١١) اقسام ٦ ت^٢ ك + ٢ ك^٢ - ٢ ت^٢ ب - ب^٢ ي + ٢ ت^٢ س + س^٢ ي + ح على ٢ ت + ي

الخارج ٢ ك^٢ - ب + س + ٢ ت + ي

(١٢) اقسام ت^٢ ب - ٢ ت^٢ + ٢ ت^٢ ب - ٦ ت^٢ - ٤ ب + ٢ ت^٢ على ب - ٢

الخارج ت^٢ + ٢ ت - ٤ + $\frac{١٠}{٢ - ب}$

(١٤) ت (ب + ت) ت + س + س + ب + ت + د + ب + د (س + ب) + $\frac{١٠}{٢ - ب}$

$\frac{ت + س + س + ب}{ت + د + ب + د}$
$\frac{ت + د + ب + د}{ت + د + ب + د}$
$\frac{ت + د + ب + د}{ت + د + ب + د}$

(١٤) انقسم ت + مآى + ت ر مآى + رى على ت + مآى
الحارج ا + ر مآى

(١٥) انقسم ك^٢ - ك^٣ + ك^٢ - ك^٢ - ت^٢ على ك - ت

(١٦) انقسم آ^٢ - آ^١ + آ^١ + آ^٢ - آ^١ - آ^١ على آ - آ^١

(١٧) انقسم ك^٦ - ١ على ك - ١

(١٨) انقسم ك^٤ - ك^٩ + ك^٦ - ك^٣ على ك^٢ + ك^٢ - ك^١ - ١

(١٩) انقسم ت^٤ + ت^٤ + ت^٢ + ب^٢ على ت^٢ + ت^٢ + ب

(٢٠) انقسم ك^٤ - ت^٢ + ك^٢ + ت^٢ - ك^٢ - ت^٢ على ك^٢ - ت^٢ + ك^٢ + ت^٢

٢٢٥ اذا انقسمت فضلة قوتين على فضلة كميتهما الاصيلتين يخرج من ذلك

سلسلة قوات

مثال (أ - ت) + (أ - ت) = أ + ت

(أ - ت) + (أ - ت) = أ + ت + أ + ت

(أ - ت) + (أ - ت) = أ + ت + أ + ت + أ + ت

(أ - ت) + (أ - ت) = أ + ت + أ + ت + أ + ت + أ + ت

ويبرهن ذلك بالضرب

وهكذا يبرهن ان فضلة قوات كميتهن اذا كان دليلها عدد شفع يمكن قسمتها

على مجموع الكميتهن

مثال (أ - ت) + (أ + ت) = أ - ت

و (أ - ت) + (أ + ت) = أ - ت + أ + ت

و (أ - ت) + (أ + ت) = أ - ت + أ + ت + أ - ت + أ + ت

ت^٤ - أ

ومجموع قوتين من كميتهن ان كان الدليل وزناً يُقسم على مجموع الكميتهن

مثال (أ + ت) + (أ + ت) = أ - ت + أ + ت

(أ + ت) + (أ + ت) = أ - ت + أ + ت + أ - ت + أ + ت

$$(ي^٧ ت^٧) + (ي + ت) = ي^٦ ت^٦ - ي^٥ ت^٥ + ي^٤ ت^٤ - ي^٣ ت^٣ + ي^٢ ت^٢ - ي$$

ت ي + ت^٦

في العاد الأكبر للكميتين

٢٢٦ لكي تجد العاد الأكبر اقسم احدى الكميتين على الاخرى والمقسوم عليه على الباقي ثم المقسوم عليه الثاني على الباقي الثاني وهلم جرا الى ان لا يبقى شيء فيكون المقسوم عليه الاخير العاد الأكبر. وان اريد العاد الأكبر لثلاث كميات يجب اخذ لاثنتين منها ثم العاد الأكبر بين الثالثة والعاد الأكبر الاول وهكذا مهما تعددت الكميات

٢٢٧ في اخذ العاد الأكبر لكميات مركبة يجب احيانا تنقيص المقسوم عليه او زيادة المقسوم. ويمكن ذلك بدون تغيير العاد الأكبر اذا ضرب او انقسم احدها على كمية لا يقسم عليها الاخر وليس فيها جزء ينقسم عليه الاخر. مثالة ان العاد الأكبر بين ت ب و ت س هوت ان ضربت احداهما في د فيكون العاد الأكبر بين ت ب د و ت س هوت ايضا. وان فرض ت ب و ت س د يكون العاد الأكبر بينهما ت ايضا. واذا انقسم ت س د على د يبقى ت س فيكون ت العاد الأكبر بينهما كما كان. ومحسب ذلك يمكن تسهيل العمل في اخذ العاد الأكبر بقسمة المقسوم عليه على كمية ليست بمقسوم عليه المقسوم او ضرب المقسوم في كمية لا تعدد المقسوم عليه

مثال اول ما هو العاد الأكبر بين ٦ ت + ١١ ت ك + ٢ ك و ٦ ت + ٧ ت ك - ٣ ك

وهذه صورة العمل

$$\begin{array}{r} ٦ ت + ٧ ت ك - ٣ ك \\ ٦ ت + ١١ ت ك + ٢ ك \\ \hline ٦ ت + ٧ ت ك - ٣ ك \end{array}$$

اقسم على ٢ ك + ٤ ت ك + ٦ ت

$$\begin{array}{r} ٢ ت + ١١ ت ك + ٢ ك \\ ٦ ت + ٧ ت ك - ٣ ك \\ \hline ٦ ت + ٩ ت ك \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٢ ت ك - ٣ ك \\ ٢ ت ك - ٣ ك \\ \hline \end{array}$$

فالعاد الأكبر بين الكميتين ٢ ت + ٣ ك

- ٣ ما هو العاذاً الأكبرين ك^٢ - ب^١ ك^١ وك^١ + ٢ ب^١ ك^١ + ب^١
 الجواب ك + ب
- ٣ ما هو العاذاً الأكبرين س^١ ك^١ + ك^١ وت^١ س^١ + ت^١ ك^١ الجواب س + ك
- ٤ ما هو العاذاً الأكبرين ٣ ك^٢ - ٢٤ ك^١ - ٩ و ٢ ك^١ - ١٦ ك^١ - ٦
 الجواب ك^٢ - ٨ ك^١ - ٣
- ٥ ما هو العاد الأكبرين ت^١ - ب^١ وت^١ - ب^١ وت^١ - ب^١ الجواب ت^١ - ب^١
- ٦ ما هو العاد الأكبرين ك^٢ - ت^١ وك^١ - ت^١ وت^١ - ك^١ - ت^١
 الجواب ك + ١
- ٧ ما هو العاذاً الأكبرين ك^١ - ١ وك^١ + ١
 الجواب ك + ١
- ٨ ما هو العاد الأكبرين ت^١ - ت^١ - ب^١ - ٢ ب^١ وت^١ - ٢ ت^١ + ب^١ - ٢
 ما هو العاد الأكبرين ت^١ - ٤ ك^١ وت^١ - ٤ ت^١ - ك^١ - ت^١ + ك^١
- ٩ ما هو العاد الأكبرين ت^١ - ت^١ ب^١ وت^١ + ٢ ت^١ + ب^١



الفصل الثامن عشر

في ترقية الكميات الثنائية وسطها

٢٢٨ قد رأينا سابقاً كيفية ترقية الكميات بالضرب غير أنها إذا كانت القوة المطلوبة عالية يطول بها العمل جداً. وقد اخترع الفيلسوف اسحق نيوتون قاعدة مخصصة لترقية الكميات الثنائية ولشدة اعتبارها عند علماء هذا الفن كتبوها على قبة في كيسة وستمنستر في لندن

٢٢٩ إذا ضربت كمية مثل ت + ب فلنا هذه القوات

$$(ت + ب)^1 = ت^1 + ٢ ت ب + ب^1$$

$$(ت + ب)^2 = ت^2 + ٢ ت ب + ب^2$$

$$(ت + ب)^4 = ت^4 + ٤ ت^3 ب + ٦ ت^2 ب^2 + ٤ ت ب^3 + ب^4$$

$$(ت + ب) = ٥ ت + ١٠ ت ب + ١٠ ت ب^٢ + ٥ ت ب^٣ + ب^٤$$

فترى من ذلك ان الدلائل جارية على اسلوب واحد ابداً. اي ان دليل ت في الجزء الاول ودليل ب في الجزء الاخير يعدل دليل اسم القوة المفروضة. وان دلائل ت تهبط بواحد في كل جزء. وان دلائل ب تعلق بواحد في كل جزء بعد الاول

واذا قطعنا النظر عن المسميات نرى ما سبق ان دلائل اية قوة فرضت من كمية ثنائية تعدل اسم القوة المفروضة في الجزء الاول والاخير وان دلائل الاصلية تهبط ودلائل التابعة تعلق واحداً في كل جزء

تنبيه. يراد بالاصلية الجزء الاول من الكمية الثنائية وبالتابعة الجزء الثاني. مثاله في ت + ب سميت ت الاصلية وب التابعة

ثم ان قيل ما هي القوة الثامنة من ت + ب بنقطع النظر عن المسميات فالحجواب

$$ت^٨ + ت^٧ ب + ت^٦ ب^٢ + ت^٥ ب^٣ + ت^٤ ب^٤ + ت^٣ ب^٥ + ت^٢ ب^٦ + ت ب^٧ + ب^٨$$

ثم نرى عدد الاجزاء اكثر من الاحاد في اسم القوة بواحد ابداً. فاذا نرى في المربع ثلثة اجزاء وفي المكعب اربعة وفي القوة الرابعة خمسة وفي الخامسة ستة وهلم جراً ٢٣٠ ثم لكي نجد المسميات اذا نظرنا الى القوت المتقدمة (٢٢٩) نرى

٢	=	٤	=	١	٢	١	مسميات المربع			
٢	=	٨	=	١	٢	٢	١	ومسميات المكعب		
٤	=	١٦	=	١	٤	٦	٤	٢	ومسميات القوة الرابعة	
٥	=	٢٥	=	١	٥	١٠	١٠	٥	١	ومسميات القوة الخامسة

فترى ان مسمى الجزء الاول هو واحد ابداً. وان مسمى الجزء الثاني يعدل دليل القوة المفروضة. ومن ثم اذا ضرب مسمى جزءه في دليل الكمية الاصلية وانقسم المحاصل على دليل التابعة + ١ يكون من ذلك مسمى الجزء الذي يتلوه

واذا نظرنا الى المسميات المذكورة آنفاً نرى انها اولاً تزيد الى حد معلوم ثم تهبط

مثلا زادت فتكون متساوية في الجزء الاول والاخير وفي الثاني والذي قبل الاخير وفي الثالث والذي قبل ما قبل الاخير. فاذا عرفنا مسميات نصف الاجزاء نعرف منها مسميات البقية

وفي اية قوة فرضت من كمية ثنائية مثل ت + ب يعدل مجموع المسميات تلك القوة من اثنين كما ترى قبيل هذا

٢٢١ ان الفضاءا الماضي ذكرها قد انحصرت في نظرية واحدة تسمى النظرية

الثنائية وهي

انه في كل قوة من كمية ثنائية يكون دليل الاصلية مساويا لاسم القوة. ومن ثم يهبط بواحد في كل جزء. ودليل التابعة يبتدي بواحد في الجزء الثاني. ومن ثم يعلو بواحد في كل جزء

مسمى الجزء الاول واحد ومسمى الجزء الثاني يعدل دليل القوة المفروضة. ومن ثم اذا ضرب مسمى جزء في دليل الاصلية وانقسم على دليل التابعة + ا يكون من ذلك مسمى الجزء التالي له

وتكتب هذه النظرية في عبارة جبرية هكذا (ت + ب) = ت^ن

$$+ ن \times ت^{ن-1} + ب + ن \times \frac{1-ن}{3} ت^{ن-2} ب \text{ الى اخره}$$

مثال اول ما هي القوة السادسة من ك + ي

$$\text{الجواب } ك^6 + 6 ك^5 ي + 15 ك^4 ي^2 + 20 ك^3 ي^3 + 15 ك^2 ي^4 + 6 ك ي^5 + ي^6$$

$$ك^6 + ي^6$$

$$\bar{3} (د + ح) = د^3 + 3 د^2 ح + 3 د ح^2 + ح^3$$

ما هي القوة الخامسة من ك + ي

بوضع ت عوض ك ووضع ب عوض ي لنا

$$(ت + ب)^5 = ت^5 + 5 ت^4 ب + 10 ت^3 ب^2 + 10 ت^2 ب^3 + 5 ت ب^4 + ب^5$$

$$+ ب$$

ثم يترجع ك^٢ و ٢^١ عوض ت وب لنا
 ك^١ + ١٥ ك^١ + ٩٠ ك^١ + ٢٧٠ ك^١ + ٤٠٥ ك^١ + ٢٤٢ ك^١
 ٤ ماهي القوة السادسة من ٢ ك + ٢^١ ي
 الجواب ٧٢٩ ك^١ + ٢٩١٦ ك^١ + ٤٨٦٠ ك^١ + ٤٢٢٠ ك^١
 ٢١٦٠ ك^١ + ٥٧٦ ك^١ + ٦٤ ك^١

٢٢٢ الكمية الفضلية ترقى كالاجمالية غير ان علاماتها تتغير فان (ت - ب)
 = ت^٢ - ٢ ت ب + ب^٢

و(ت - ب)^٢ = ت^٢ - ٢ ت ب + ب^٢
 و(ت - ب)^٤ = ت^٤ - ٤ ت^٣ ب + ٦ ت^٢ ب^٢ - ٤ ت ب^٣ + ب^٤ الخ
 فزى ان كل جزء يقع فيه قوة وترية من الكمية التابعة تكون علامته سلبية
 القوة السادسة من ك - ي = ك^٦ - ٦ ك^٥ ي + ١٥ ك^٤ ي^٢ - ٢٠ ك^٣ ي^٣
 + ١٥ ك^٢ ي^٤ - ٦ ك^١ ي^٥ + ي^٦

٢٢٢ متى كان احد جزوي كيمه ثنائيه واحداً يمكن تركه الا من الجزء الاول
 او الاخير لان كل قوه من واحد واحد وضرب كيمه في واحد لا يغيرها شيئاً. مثاله
 (ك + ١)^٢ = ك^٢ + ٢ ك + ١
 وذاك = ك^٢ + ٢ ك + ١

فلا داعي الى كتابة الواحد الاحفظ الدليل لاجل معرفة المسميات. وليس لها
 لزوم ايضاً من هذا القبيل لاننا نعرف الدلائل من كون مجموع الدليلين في كل جزء
 يعدل اسم القوة المفروضة

مثاله (١ - ي)^٦ = ١ - ٦ ي + ١٥ ي^٢ - ٢٠ ي^٣ + ١٥ ي^٤ - ٦ ي^٥ + ي^٦
 اننا نرى ما سبق ان العبارة الدالة على قوة الجزء الاول من جذرها واحد هي
 بسيطة جداً. فانا نحول ثنائيه ما الى اخرى الجزء الاول منها واحد يمكن الدلالة
 على كل قوه منها بالعبارة المذكورة. مثاله ت + ك + ت = (١ + $\frac{ك}{ت}$) ت +
 ك = ت × (١ + $\frac{ك}{ت}$) فاذا

$$(ت + ك) = ت^2 \times (١ + \frac{ك}{ت}) \text{ وبالابسط تصير}$$

$$ت^2 \times (١ + \frac{ك}{ت} + \frac{ك}{ت} + \frac{ك}{ت}) \text{ وقس على ذلك}$$

٢٢٤ متى كان دليل قوة مفروضة من ثنائية صحيحاً ايجابياً تنتهي السلسلة حسباً تقدم. ومتى كان دليل القوة المفروضة سلبية لا تنتهي السلسلة بل يمكن الامتداد فيها الى غير نهاية ككثير من الكسور العشرية. مثاله لو قيل ابسط $\frac{١}{(ت + س)}$ او $(ت + س)^{-١}$ لقليل $ت^{-٢} - ٢ت^{-٣} + س^{-٢} - ٢ت^{-٣} - ٤ت^{-٤} + ٤ت^{-٥} + س^{-٤} - ٤ت^{-٥}$ الخ

فهرى هنا المسميات تعلو في كل جزء بواحد والعلامات ايجابية وسلبية بالتداول ٢٢٥ ثم ان النظرية الثنائية تفيد جداً في تجذير الثنائيات لانها تدل على الجذر كما تدل على القوة غير ان دليل القوة صحيح ودليل الجذر كسر مثاله $(ت + ب)^{\frac{١}{٢}}$ فان كانت ن عوضاً عن ٢ مثلاً تكون العبارة دالة على قوة وان كانت عوضاً عن $\frac{١}{٢}$ مثلاً تكون جذراً

اذا ابسط جذر بواسطة النظرية الثنائية فالسلسلة لا تنتهي لان السلسلة انما تنتهي عند ما يصير دليل الاصلية صفراً حتي تنفي المسميات. والكسر لا يمكن ان ينتهي الى صفر بطرح واحد منه على التوالي. فان كان الدليل في الجزء الاول $\frac{١}{٢}$ يكون في الثاني $\frac{١}{٢} - ١ = -\frac{١}{٢}$ وفي الثالث $-\frac{١}{٢} - ١ = -\frac{٣}{٢}$ وفي الرابع $-\frac{٣}{٢} - ١ = -\frac{٥}{٢}$ مثاله لو قيل ما هو الجذر المالمالي من $ت + ب$ اي $(ت + ب)^{\frac{١}{٢}}$ لقليل $ت^{\frac{١}{٢}} + \frac{١}{٢}ت^{-\frac{١}{٢}} - \frac{١}{٨}ت^{-\frac{٣}{٢}} + \frac{١}{١٦}ت^{-\frac{٥}{٢}}$ الخ

مثال اول ابسط $(ت + ك)^{\frac{١}{٢}}$ بوضع ب عوض ت تصير $(ب + ك)^{\frac{١}{٢}}$

$$\text{وبسطها} = ب^{\frac{١}{٢}} + \frac{١}{٢}ب^{-\frac{١}{٢}} - \frac{١}{٨}ب^{-\frac{٣}{٢}} + \frac{١}{٤٨}ب^{-\frac{٥}{٢}} - \frac{١}{١٦}ب^{-\frac{٧}{٢}} + \dots$$

$$-\frac{10}{248} \text{ ب} - \frac{1}{2} \text{ ك} \text{ الى اخرو}$$

$$\text{وذاك} = \text{ب} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ب} - \frac{10}{284} \text{ ك} \text{ الخ}$$

ثم بترجيح ت عوض ب نصير

$$\text{ت} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ت} + \frac{1}{8} \text{ ك} - \frac{10}{284} \text{ ت} \text{ الخ}$$

٣ ايسط (١ + ك) ١

$$\text{الجواب ١} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ت} + \frac{1}{8} \text{ ك} - \frac{10}{284} \text{ ك} \text{ الخ}$$

٣ ايسط م اي (١ + ١) ١

$$\text{الجواب ١} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ت} + \frac{1}{8} \text{ ك} - \frac{10}{284} \text{ ك} \text{ الخ}$$

٤ ايسط (ت + ك) ١ اوت ١ (١ + ت) ١

$$\text{الجواب ت} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ت} + \frac{1}{8} \text{ ك} - \frac{10}{284} \text{ ت} \text{ الخ}$$

٥ ايسط (ت + ب) ١ اوت ١ (١ + ب) ١

$$\text{الجواب ت} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ت} + \frac{1}{8} \text{ ك} - \frac{10}{284} \text{ ت} \text{ الخ}$$

٦ ايسط (ت - ب) ١

$$\text{الجواب ت} + \frac{1}{2} \text{ ك} - \frac{1}{8} \text{ ت} + \frac{1}{8} \text{ ك} - \frac{10}{284} \text{ ت} \text{ الخ}$$

٧ ايسط (ت + ك) - ١ ٨ ايسط (١ - ك) ٥

٩ ايسط (١ + ك) - ٥ ١٠ ايسط (ت + ك) - ١

٢٢٦ ثم ان النظرية الثنائية نستعمل في كميات لها اكثر من جزوين بالتعويض عن الاجزاء حتى نغول الى جزوين. ثم عند ترجيع المعوض عنها تبسط التي كان لها دلائل منفردا. مثاله ما هو كعب ت + ب + س عوض عن ب + س واجعل ح = ب + س فنكون العبارة ت + ح و(ت + ح) = ت + ٢ + ح + ٢ ت ح

+ ح^٢ ثم بترجع قيمة ح لنا (ت + ب + س) = ت^٢ + ٢ت^٢ × (ب + س) + ت^٢ × (ب + س) + ت^٢ × (ب + س) + ت^٢ × (ب + س) ثم ترفي ب + س حسب ما تقدم

امثلة

١ ما هي القوة الثامنة من (ت + ب)

الجواب ت^٨ + ٨ت^٧ب + ٢٨ت^٦ب^٢ + ٥٦ت^٥ب^٣ + ٧٠ت^٤ب^٤ + ٥٦ت^٣ب^٥ + ٢٨ت^٢ب^٦ + ٨ت^١ب^٧ + ب^٨

٢ ما هي القوة السابعة من ت - ب

٣ ابسط $\frac{1}{1-t}$ او (١ - ت)^{-١}

الجواب ١ + ت + ت^٢ + ت^٣ + ت^٤ + ت^٥ + ت^٦ + ت^٧ + ... الخ

٤ ابسط $\frac{t}{t-b} \times (t-b)^{-١}$

الجواب ح × ($\frac{1}{t} + \frac{b}{t^2} + \frac{b^2}{t^3} + \frac{b^3}{t^4} + \dots$) الخ

او ($\frac{t}{t} + \frac{b}{t} + \frac{b^2}{t^2} + \frac{b^3}{t^3} + \dots$) الخ

٥ ابسط (ت + ب)^{١/٢}

الجواب ت + $\frac{b}{٢ت}$ - $\frac{b^2}{٨ت^٣}$ + $\frac{b^٣}{١٦ت^٥}$ الخ

٦ ابسط (ت + ي)^{-٤}

الجواب $\frac{١}{ت^٤} - \frac{٤ي}{ت^٥} + \frac{٦ي^٢}{ت^٦} - \frac{٤ي^٣}{ت^٧} + \frac{٢ي^٤}{ت^٨}$ الخ

٧ ابسط (س + ك)^{١/٢}

الجواب س × ($\frac{١}{س} + \frac{ك}{٢س^٢} - \frac{ك^٢}{٨س^٣} + \frac{ك^٣}{١٦س^٤} + \dots$) الخ

٨ ابسط $\frac{d}{s^2+k^2} \times (s+k)^{-١}$

الجواب $\frac{d}{س^٢} \times (١ - \frac{ك}{س} + \frac{ك^٢}{س^٢} - \frac{ك^٣}{س^٣} + \dots)$ الخ

$\frac{٣ \times ٧ \times ٥ \times ١}{٨ \times ٦ \times ٤ \times ٢}$ الخ

٩ ما هي القوة الخامسة من (ت + ي)

- ١٠ ما هي القوة الرابعة من ت + ب + ك
- ١١ ابط (ت^٢ - ك) ك^١
- ١٢ ابط (١ - ي^٢) ي^٢
- ١٣ ابط (ت - ك) ك^١
- ١٤ ابط ح (ت^٢ - ي^٢) ي^٢

الفصل التاسع عشر

في تجذير الكميات المركبة

٢٢٧ قاعدة. رتب الكميات على موجب قوات احد حروفها حتى تكون العليا اولاً. وهكذا على التوالي. ثم تاخذ جذر الجزء الاول فيكون لك الجزء الاول من الجذر المطلوب. وترقي ذلك الجزء الى قوة من اسم دليل الجذر المطلوب وتطرحه من الكمية نفسها ثم تنزل الجزء الثاني وتقسمه على الجذر الذي اخذته بعد ترفيقته الى قوة دليلها اقل من دليل الجذر المطلوب بواحد وضربه في دليل الجذر المطلوب فيكون الخارج الجزء الثاني من الجذر. ثم ترقي الجزءين من الجذر الى قوة من اسم دليل الجذر المطلوب وتطرحها من الباقي وتقسّم كما تقدم وهذه صورة العمل

ما هو الجذر الكمي من

$$\begin{array}{r}
 \text{ت}^٣ + \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - ١١ \text{ت} + ٦ \text{ت}^٢ + ١٢ \text{ت} - ٨ \text{ت} + \text{ت} - ١ \\
 \hline
 \text{ت}^٣ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \quad \text{ت}^٢ \\
 \hline
 \text{ت}^٣ + \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - ١١ \text{ت} + ٦ \text{ت}^٢ + ١٢ \text{ت} - ٨ \text{ت} + \text{ت} - ١ \\
 \hline
 \text{ت}^٣ + \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - ١١ \text{ت} + ٦ \text{ت}^٢ + ١٢ \text{ت} - ٨ \text{ت} + \text{ت} - ١ \\
 \hline
 \text{ت}^٣ + \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - \text{ت}^٢ - ١١ \text{ت} + ٦ \text{ت}^٢ + ١٢ \text{ت} - ٨ \text{ت} + \text{ت} - ١
 \end{array}$$

لا يحتاج الى اترال اكثر من جزء واحد من الجذر لان القسمة تجري على جزء واحد منه فقط

٣ ما هو الجذر الرابع من

$$\begin{array}{r}
 ت٤ + ٨ت٤ + ٢٤ت٤ + ٢٢ت + ١٦(ت + ٢ \\
 \hline
 ت٤ \\
 \hline
 ت٤ + ٨ت٤ \\
 \hline
 ت٤ + ٨ت٤ + ٢٤ت٤ + ٢٢ت + ١٦
 \end{array}$$

٣ ما هو الجذر الخامس من $ت٥ + ٥ت٤ + ١٠ت٣ب + ١٠ت٢ب + ٥ت١ب + ١٠ت٢ب + ٥ت١ب + ١٠ت٢ب + ٥ت١ب$

٤ ما هو الجذر الكعبي من $ت٦ + ٦ت٥ب + ١٢ت٤ب٢ + ٨ت٣ب٣$

الجواب ت - ٢ب

٥ ما هو الجذر المالى من

$$\begin{array}{r}
 ت٤ - ١٢اتب + ٩ب٢ + ١٦اتح - ٢٤ابح + ٤ح٢ \\
 \hline
 ت٤ \\
 \hline
 ت٤ - ١٢اتب \\
 \hline
 ت٤ - ١٢اتب + ٩ب٢ + ١٦اتح \\
 \hline
 ت٤ - ١٢اتب + ٩ب٢ + ١٦اتح + ٢٤ابح + ٤ح٢
 \end{array}$$

هنا كانت القوة التي هي اقل بواحد من اسم الجذر القوة الاولى فلم ترتق ت

قبل القسمة عليها

٢٢٨ الجذر المالى يوخذ غالباً على موجب قاعة كفاعنة علم الحساب لذلك وهي ان ترتب الكمية حسب قوات احد احرفها. ثم تاخذ جذر الجزء الاول للجزء الاول من الجذر المطلوب وتطرح قوته من الكمية نفسها. ثم تنزل جزءين آخرين ونقسم على مضاعف الجذر الموجود ونضيف الخارج الى الجذر والى المقسوم عليه. ثم نضرب المقسوم عليه في الجزء الاخير من الجذر الموجود وتطرح الحاصل من المقسوم ثم تنزل جزءين آخرين وتكرر العمل الى هذا الاسلوب الى نهايته

مثال اول ما هو الجذر المالى من

$$\begin{aligned} & \text{ت} + \text{آ} + \text{ب} + \text{ب} + \text{آ} + \text{ت} + \text{س} + \text{س} + \text{آ} + \text{ب} + \text{س} + \text{س} + \text{آ} + \text{ت} + \text{ب} + \text{س} \\ & \frac{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}}{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}} + \frac{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}}{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}} + \frac{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}}{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}} \\ & \frac{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب} + \text{س} + \text{س} + \text{آ} + \text{ت} + \text{ب} + \text{س} + \text{س} + \text{آ} + \text{ت} + \text{ب} + \text{س} + \text{س} + \text{آ} + \text{ت} + \text{ب}}{\text{آ} + \text{ت} + \text{ب}} \end{aligned}$$

٣ ما هو الجذر المائلي من

$$\begin{aligned} & 1 - 4\text{ب} + 4\text{ب}^2 + \text{آ} - 4\text{ب}^3 + \text{ب}^4 - 1 \\ & \frac{1}{\text{آ} - 2} - \frac{4\text{ب} + 4\text{ب}^2 - 4\text{ب}^3 - 4\text{ب}^4}{\text{آ} - 2} \\ & \frac{1 - 4\text{ب} + 4\text{ب}^2 + \text{آ} - 4\text{ب}^3 + \text{ب}^4 - 1}{\text{آ} - 2} \end{aligned}$$

٣ ما هو الجذر المائلي من $\text{ت}^7 - \text{آ}^2 + \text{ت}^4 - \text{آ}^2 + \text{ت}^2$

الجواب $\text{ت}^2 - \text{آ} + \text{ت}$

٤ ما هو الجذر المائلي من $\text{ت}^4 + \text{آ}^2 + \text{ب}^4 - \text{ب}^2 - \text{آ}^2 - 8\text{ب} + 4$

الجواب $\text{ت}^2 + \text{آ} - \text{ب}$

يسهل العمل احياناً بجل دليل الجذر الى جزئين

$$\text{مثال} \quad \text{ت}^4 = \text{ت}^2 \times \text{ت}^2 \quad \text{وت} \quad \text{ت}^4 = \text{ت}^2 \times \text{ت}^2$$

اي ان الجذر الرابع = الجذر المائلي من الجذر المائلي

والجذر السادس = الجذر المائلي من الجذر الكعبي

والجذر الثامن = الجذر المائلي من الجذر الرابع

١ ما هو الجذر المائلي من $\text{ك}^4 - \text{ك}^2 + \text{ك}^6 - \text{ك}^4 + \text{ك} + 1$

٢ ما هو الجذر الكعبي من $\text{ك}^7 - \text{ك}^6 + \text{ك}^5 - \text{ك}^4 + \text{ك}^3 + 10\text{ك}^2 - 10\text{ك} + 1$

$1 - \text{ك} + 1$

٣ ما هو الجذر المائلي من $\text{ك}^4 - \text{ك}^2 + \text{ك}^4 + \text{ك}^2 - \text{ك}^6 + \text{ك} + 9$

٤ ما هو الجذر الرابع من $\text{ت}^6 - 9\text{ت}^2 + \text{ك} + 16\text{ت}^2 - \text{ك} - 16$

$\text{ت}^2 + 18\text{ك}$

٥ ما هو الجذر الخامس من $\text{ك}^5 + \text{ك}^5 + \text{ك}^5 + \text{ك}^5 + \text{ك}^5 + 10\text{ك} + 1$

٦ ما هو الجذر السادس من ت - ٦ ت ب + ١٥ ت ب - ٢ ت - ٢٠ ت
 ب + ١٥ ت ب - ٦ ت ب + ب

في جذور كميات ثنائية صماء

٢٢٩ نلزم أحيانا الدلالة على الجذر المالي من كمية على صورة ت + م ب
 التي نسمي ثنائية او فضلية صماء بواسطة مجموع اخرين صاوين او فضلتهما ونستدل
 على عبارة جبرية هذه الدلالة من هذه الفضاءا الثلاث
 الاولى ان جذر صحيح لا يمكن ان يتركب من جزوين احدهما منطوق والاخر اصم
 فان كان ممكنا فلنفرض

$$م ت = ك + م ي \quad \text{فتربيع الجانبيين نصير}$$

$$ت = ك + ٢ ك م ي + ي$$

وبالتحويل $م ي = \frac{ت - ك - ي}{٢ ك}$ وهب منطقة وذاك خلاف

المفروض

الثانية انه في كل معادلة على صورة ك + م ي = ت + م ب تكون الاجزاء
 المنطقية على الجانبيين متساوية والصماء كذلك فان لم تكن ك = ت لنفرض ك =
 ت + ل

ثم بالتعويض ت + ل + م ي = ت + م ب وبالمقابلة م ب = ل + م ي
 اي يكون م ب مركبا من جزوين احدهما منطوق والاخر اصم وقد تبهرن ان ذلك
 لا يمكن وهكذا يبرهن انه في المعادلة ك - م ي = ت - م ب تكون الاجزاء المنطقية
 على الجانبيين متساوية والصماء كذلك

الثالثة اذا فرض $م ت = ك + م ي$ يكون $م ب = ك - م ي$

لانه بتربيع الاولى نصير $م ت + م ب = ك + ٢ ك م ي + ي$ وحسب القضية الثانية
 $ت = ك + ي$

$$م ب = ٢ ك م ي$$

بالطرح ت - م ب = ك - ٢ ك م ي + ي

بالتعويض $م ب = ك - م ي$

٢٤٠ ثم لننظر الى كيفية استخراج عبارة دالة على جذر كية ثنائية او فضلية

صفاً ما سبق

$$\text{ولفرض } \sqrt{ا + ب} = \sqrt{ا} + \sqrt{ب} = ك + هـ$$

$$\text{اذا } \sqrt{ا - ب} = \sqrt{ا} - \sqrt{ب} = ك - هـ$$

بتربيع الجانبين فيها لنا $\sqrt{ا + ب} + \sqrt{ا - ب} = ك + هـ + ك - هـ = ٢ك$ $\sqrt{ا + ب} + \sqrt{ا - ب} = ٢ك$ $\sqrt{ا + ب} = ٢ك - \sqrt{ا - ب}$

و $\sqrt{ا - ب} = ٢هـ - \sqrt{ا + ب}$ $\sqrt{ا - ب} + \sqrt{ا + ب} = ٢هـ$ $\sqrt{ا - ب} = ٢هـ - \sqrt{ا + ب}$

بضرب الاولين $\sqrt{ا - ب} \sqrt{ا + ب} = (٢ك - \sqrt{ا - ب}) (٢هـ - \sqrt{ا + ب})$

بجمع هاتين $\sqrt{ا - ب} + \sqrt{ا + ب} = ٢هـ$ $\sqrt{ا - ب} = ٢هـ - \sqrt{ا + ب}$

$$\text{و } \sqrt{ا - ب} = ٢هـ - \sqrt{ا + ب}$$

ب طرحها $\sqrt{ا - ب} - \sqrt{ا + ب} = ٢هـ - \sqrt{ا + ب} - \sqrt{ا + ب} = ٢هـ - ٢\sqrt{ا + ب}$

$$\sqrt{ا - ب} - \sqrt{ا + ب} = ٢هـ - ٢\sqrt{ا + ب}$$

وقد فرض ان $\sqrt{ا + ب} = \sqrt{ا} + \sqrt{ب} = ك + هـ$

$$\text{و } \sqrt{ا - ب} = \sqrt{ا} - \sqrt{ب} = ك - هـ$$

$$\text{اذا } \sqrt{ا + ب} + \sqrt{ا - ب} = \sqrt{ا} + \sqrt{ب} + \sqrt{ا} - \sqrt{ب} = ٢\sqrt{ا}$$

$$\text{و } \sqrt{ا + ب} - \sqrt{ا - ب} = \sqrt{ا} + \sqrt{ب} - (\sqrt{ا} - \sqrt{ب}) = ٢\sqrt{ب}$$

ثم بوضع د عوض $\sqrt{ا - ب}$ نصير

$$(١) \sqrt{ا + ب} + \sqrt{ا - ب} = \sqrt{ا} + \sqrt{ب} + \sqrt{ا} - \sqrt{ب} = ٢\sqrt{ا}$$

$$(٢) \sqrt{ب} - \sqrt{ب} = \sqrt{ب} - \sqrt{ب} = \sqrt{ب} - \sqrt{ب}$$

مثال اول ما هو الجذر الممالي من $\sqrt{ب} + ٣$ و $\sqrt{ب} - ٣$

هنا $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$ $٣ = ب$

$١ = ٨$

$$١ + \sqrt{ب} = \frac{١-٢}{٢} + \frac{١+٢}{٢} = \sqrt{ب} + ٢$$

الجواب $\sqrt{ب} + ٢$

$\sqrt{ب} + ١١$ ما هو الجذر الممالي من

الجواب $١ - \sqrt{ب}$

$\sqrt{ب} - ٦$ ما هو الجذر الممالي من

الجواب $\sqrt{ب} + ٢$

$\sqrt{ب} + ٧$ ما هو الجذر الممالي من

الجواب $\sqrt{ب} - \sqrt{ب}$

$\sqrt{ب} - ٧$ ما هو الجذر الممالي من



الفصل العشرون

في السرد الغير المتناهي

٢٤١ انه في تجذير كمية او في قسمة كمية على اخرى يحدث احيانا اننا لانستطيع الوصول الى الجذرا او الى الخارج بالتمام ولكن نمتد في العمل الى غير نهاية والحادث من ذلك يُسمى سردا غير متناه

٢٤٢ الكسر يُبسط احيانا كثيرة الى سرد غير متناه بقسمة الصورة على المخرج لان قيمة الكسر هي الخارج من تلك القسمة وان لم يوجد المخرج في الصورة مرارا معلومة يبقى بهد كل قسمة باقي فيمتد في العمل الى غير نهاية مثالة لوقيل ابسط

الى سرد غير متناه لقييل

$$\frac{١}{١-ب}$$

$$\begin{array}{r} ١ - ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ + ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ - ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ + ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ - ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ + ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ - ب \\ + \\ - ب \\ \hline ١ + ب \end{array}$$

وعلى هذا المتوال يكون السرد $1 + ت + ت^2 + ت^3 + ت^4 + ت^5 + ت^6 + ت^7 + ت^8$
 ثم لكي يقترب السرد الى قيمة الكسر في كل جزء منه أكثر فأكثر يقتضي ان يكون
 الجزء الاول من المقسوم عليه أكبر من الثاني كما نرى من المثال السابق فان كان $ت$
 أكبر من واحد يبعد كل جزء من السرد أكثر فأكثر عن قيمة الكسر الحقيقية لانه
 بعد كل قسمه يبقى باقٍ يجب اضافته الى الخارج او طرحه منه وكل ما كان هذا الباقي
 اعظم ابتعد عن القيمة الحقيقية ولكن ان كان $ت$ اصغر من واحد كما لو فرض $ت$

$$\frac{1}{3} = ت^2 = \frac{1}{4} \text{ وت } \frac{1}{8} = ت^3 = \frac{1}{16} \text{ وت } \frac{1}{27} = ت^4 = \frac{1}{81} \text{ الخ}$$

ويكون السرد $\frac{1}{3} = \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{3} = 2 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots$

$\frac{1}{74} + \dots$ مثال ٢ ايسر $\frac{1}{1+t}$

هنا يكون السرد كما تقدم في $\frac{1}{1-t}$ غير ان كل جزء دليله وتري
 تكون علامته سلبية فلنا $\frac{1}{1+t} = 1 - ت + ت^2 - ت^3 + ت^4 - ت^5 + ت^6 - ت^7 + ت^8 - \dots$

(٢) ايسر $\frac{c}{b-t}$ الى سرد غير متناه

$$\frac{c}{b-t} = \frac{c}{b} + \frac{c}{b} \cdot \frac{t}{b} + \frac{c}{b} \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 + \dots$$

$$= \frac{c}{b} + \frac{c}{b} \cdot \frac{t}{b} + \frac{c}{b} \cdot \frac{t^2}{b^2} + \dots$$

فيكون السرد $\frac{c}{b} + \frac{c}{b} \cdot \frac{t}{b} + \frac{c}{b} \cdot \frac{t^2}{b^2} + \frac{c}{b} \cdot \frac{t^3}{b^3} + \dots$

(٤) اَبسط $\frac{1}{1-t}$ الى سرِد غير متناهٍ

$$1 + t + t^2 + t^3 + t^4 + \dots$$

٢٤٣ تحوّل كِبيةً الى سرِد غير متناهٍ بجذريها حسباً تقدم في الفصل التاسع

عشر

مثال آ اَبسط $t^2 + 2t + 1$ باستخراج الجذر المألبي

$$t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2$$

$$1 + \frac{2t}{1+t} + \frac{t^2}{1+t}$$

$$1 + \frac{2t}{1+t} + \frac{t^2}{1+t}$$

$$1 + \frac{2t}{1+t} + \frac{t^2}{1+t} = \frac{1+t+2t+t^2}{1+t} = \frac{(1+t)^2}{1+t} = 1+t$$

آ اَبسط $t^2 - 2t + 1$

$$1 - 2t + t^2 = (1-t)^2$$

٢ اَبسط $t^2 + 1$

$$1 + \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1+t^2} + \dots$$

٤ اَبسط $1+k$

$$1 + \frac{k}{1+k} + \frac{k^2}{1+k^2} + \dots$$

كل كِبية ثنائية لها دليلٌ سَلبيٌّ او كسريٌّ تُبسط الى سرِد غير متناهٍ حسب النظرية الثنائية. انظر الامثلة في آخر الفصل الثامن عشر

في المسميات الغير المتعينة

٢٤٤ لنا واسطة اخرى لبسط عبارة جبرية وهي ان يؤخذ سرِدٌ له مسمياتٌ

غير معينة ثم نستعلم قيمتها فلنفرض ان عبارة جبرية ما تعدل هذا السرد

$$t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2$$

الاول بصير الجانب الثاني صفراً والامر واضح ان المعادلة تكون حينئذٍ صحيحة لان

$$\text{السرد} = \text{العبارة} \text{ فاذا السرد} - \text{العبارة} = 0$$

ثم ان عين لكل المسميات تَبَّ سَ الح قيمات حتى تكون قيمة كل جزء صفراً
فالامر واضح ان الكل = ٠ ونستعلم قيمة كل مسمى من المعادلة التي وقع فيها

مثال اول ابسط $\frac{ت}{س + ب ك}$

لنفرض $\frac{ت}{س + ب ك} = ت + ب ك + س ك + س ك + د ك + ر ك$ الح

بضرب الجانبيين في س + ب ك ونقل ت نصير ٠ = (ت س - ت) + (ت ب + ت ك)

$٠ = (ت س - ت) + (ت ب + ت ك) + (س ب + س ك) + (س د + س ر) ك$ الح

فان جعل (ت س - ت) و (ت ب + ت ك) و (س ب + س ك) و (س د + س ر) س

كل واحد = ٠ يكون الكل = ٠ فلنا

$ت س - ت = ٠$ $\frac{ت}{س} = ت$

$ت ب + ت ك = ٠$ $\frac{ت ب}{س} = - ت ك$

$س ب + س ك = ٠$ $\frac{س ب}{س} = - س ك$

$س د + س ر = ٠$ $\frac{س د}{س} = - س ر$

اي كل واحد من هذه المسميات = الذي قبله $\times - \frac{ب}{س}$

فلنا اذا بالتعويض عن المسميات بهذه القيمات

$\frac{ت}{س + ب ك} = \frac{ت}{س} + \frac{ت ب}{س ك} + \frac{ت ك}{س ب} + \frac{ت ب ك}{س د} + \frac{ت د}{س ر} + \frac{ت ر}{س د}$ الح

آ ابسط $\frac{ت + ب ك}{د + ح ك + س ك}$

لنفرض $\frac{ت + ب ك}{د + ح ك + س ك} = ت + ب ك + س ك + د ك + ح ك + ر ك$ الح

ثم بالضرب في المخرج ونقل ت + ب ك الى الجانب الاخر نصير ٠ = (ت د + ت ح + ت ر) + (ب د + ب ح + ب ر) + (س د + س ح + س ر) + (د ح + د ر) + (ح ر)

وتحويل هذه المعادلات كما تقدم لنا $\frac{ت}{د} = ب$ $\frac{ت}{د} = ب$ $\frac{ح}{د} = ت$ $\frac{ب}{د} = ح$

$$\bar{س} = \frac{ح}{د} - \frac{ب}{د} \quad \bar{د} = \frac{ح}{د} - \frac{س}{د}$$

وبالتعويض عن المسميات لنا

$$\frac{ت + ب ك}{د + ح ك + س ك} = \frac{ت}{د} - \left(\frac{ح}{د} - \frac{س}{د} \right) - \left(\frac{ح}{د} - \frac{ب}{د} + \frac{س}{د} \right) ك$$

$$\bar{٣} \text{ ابسط } \frac{٢ + ١ ك}{١ - ك - ك}$$

الجواب ١ + ٢ ك + ٤ ك + ٧ ك + ١١ ك + ١٨ ك + ٢٩ ك الخ
الذي فيه نرى مسمى ك = مجموع مسمي الجزئين السابقين

$$\bar{٤} \text{ ابسط } \frac{د}{ب - ت ك}$$

$$\text{الجواب } \bar{٥} \frac{د}{ب} (١ + \frac{ت ك}{ب} + \frac{ت ك}{ب} + \frac{ت ك}{ب} + \frac{ت ك}{ب} + \frac{ت ك}{ب} \text{ الخ})$$

$$\bar{٥} \text{ ابسط } \frac{١ - ك}{١ - ك - ك - ك}$$

الجواب ١ + ك + ٥ ك + ١٣ ك + ٤١ ك + ١٢١ ك + ٣٦٥ ك الخ

$$\bar{٦} \text{ ابسط } \frac{١}{١ - ك - ك + ك}$$

الجواب ١ + ك + ٢ ك + ٢ ك + ٢ ك + ٢ ك + ٢ ك + ٤ ك الخ

$$\bar{٧} \text{ ابسط } \frac{ت}{١ - ب ك} \quad \bar{٨} \text{ ابسط } \frac{١ - ك}{١ - ك + ٥ ك + ٦ ك}$$

$$\bar{٩} \text{ ابسط } \frac{ت + ب ك}{١ - د ك} \quad \bar{١٠} \text{ ابسط } \frac{١ + ك}{١ - ك}$$

نبذة

في جمع الاسراد

٢٤٥ يراد بمجموع السرد كمية يكون الفرق بينها وبين قيمة السرد جميعه قليلاً جداً لا يعتد به وتسمى تلك القيمة حد السرد مثاله الكسر العشري ٠.٢٢٢٢٢٢٢٢.

يقترّب الى $\frac{١}{٣}$ الى غير نهاية ولا يصل اليه بالتمام فيكون $\frac{١}{٣}$ حد الكسر

$$٠.٢٢٢٢٢٢٢٢ = \frac{٢}{١٠} + \frac{٢}{١٠٠} + \frac{٢}{١٠٠٠} + \frac{٢}{١٠٠٠٠} \text{ الخ فان تعددت}$$

اجزاه السرد الى غير نهاية يكون الفرق بينه وبين $\frac{1}{3}$ صغيراً الى غير نهاية

٢٤٦ اذا هبطت اجزاه سرد بمقسوم عليه مشترك يعرف مجموعته بقاعدة جبرية سلسله هندسيه

فقد راينا سابقاً ان $m = \frac{b - t}{1 - b}$ اي المجموع = حاصل الجزء الاكبر في التناسب الا الجزء الاصغر مقسوماً على التناسب الا واحداً وفي سرد هابط يكون الجزء الاصغر صغيراً الى غير نهاية فيحسب لاشي فتصير العبارة

$$m = \frac{b - t}{1 - b} \text{ او } m = \frac{b}{1 - b}$$

مثال آ ما هو مجموع هذا السرد

$$1 + \frac{2}{10} + \frac{2}{100} + \frac{2}{1000} + \frac{2}{10000} + \dots$$

الجزء الاعظم = $\frac{2}{10}$ والتناسب = ١٠

$$m = \frac{b}{1 - b} = \frac{\frac{2}{10} \times 10}{1 - \frac{2}{10}} = \frac{2}{1 - 2} = \frac{2}{-1} = -2$$

٢ ما هو مجموع هذا السرد $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots$

$$m = \frac{b}{1 - b} = \frac{1 \times 2}{1 - 2} = \frac{2}{-1} = -2$$

٢ ما هو مجموع هذا السرد $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots$

$$\text{الجواب } \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

٢٤٨ ثم انه يوجد مجموع بعض انواع السرد بواسطة الطرح لانه حسب قواعد الكسور

$$\frac{1}{2 \times 2} = \frac{2 - 2}{2 \times 2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4 \times 2} = \frac{2 - 4}{4 \times 2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{0 \times 4} = \frac{4-0}{0 \times 4} = \frac{1}{0} - \frac{1}{4}$$

فان جعلت الكسور الواقعة عن اليسار في سردي فالامر واضح انه يعدل فضلة السردين المركبين من الكسور عن اليمين. وتوجد تلك الفضلة بسهولة لانه ان طرح الجزء الاول من احد هذين السردين فالباقي يعدل السرد الاخر

فلنفرض سردياً غير متناهٍ $\frac{1}{7 \times 0} + \frac{1}{0 \times 4} + \frac{1}{4 \times 2} + \frac{1}{2 \times 2}$ الخ
الخ لئلا نجد مجموعة فنصنع منه سردياً جديداً بطرح الضلع الثاني من الخارج وليكن مجموع هذا السرد الجديد = م

$$\text{اي } م = \frac{1}{0} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \text{الخ}$$

$$\text{اذا } م - \frac{1}{2} = \frac{1}{0} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \text{الخ}$$

$$\text{وبالطرح } \frac{1}{7 \times 0} + \frac{1}{0 \times 4} + \frac{1}{4 \times 2} + \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{2} + \text{الخ}$$

مثال آ ما هو مجموع السرد $\frac{1}{7 \times 4} + \frac{1}{0 \times 2} + \frac{1}{4 \times 2} + \frac{1}{2 \times 1}$ الخ

$$\text{لنفرض } م = \frac{1}{0} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + \text{الخ}$$

$$\text{اذا } م - \frac{2}{2} = \frac{1}{0} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \text{الخ}$$

$$\text{بالطرح } \frac{2}{7 \times 0} + \frac{2}{7 \times 4} + \frac{2}{0 \times 2} + \frac{2}{4 \times 2} + \frac{2}{2 \times 1} = \frac{2}{2} + \text{الخ}$$

$$\text{او } \frac{1}{7 \times 0} + \frac{1}{7 \times 4} + \frac{1}{0 \times 2} + \frac{1}{4 \times 2} + \frac{1}{2 \times 1} = \frac{2}{4} + \text{الخ}$$

آ ما هو مجموع سردي اجزائهم هذه

$$\text{الخ } \frac{1}{12 \times 10 \times 8} + \frac{1}{10 \times 8 \times 6} + \frac{1}{8 \times 6 \times 4} + \frac{1}{6 \times 4 \times 2}$$

فبترك الجزء الاخير من الخارج والطرح لنا $\frac{1}{8} + \frac{4}{7 \times 4 \times 2}$

$$\text{الخ } \frac{4}{12 \times 10 \times 8} + \frac{4}{10 \times 8 \times 6} + \frac{4}{8 \times 6 \times 4}$$

$$+ \frac{1}{1 \times 8 \times 6} + \frac{1}{8 \times 6 \times 4} + \frac{1}{6 \times 4 \times 2} = \frac{1}{12} \text{ او } \frac{1}{12 \times 10 \times 8} \text{ الخ}$$

٤ ما هو مجموع هذا السرد

$$\text{الخ } \frac{1}{6 \times 5 \times 4} + \frac{1}{5 \times 4 \times 3} + \frac{1}{4 \times 3 \times 2} + \frac{1}{3 \times 2 \times 1}$$

الجواب $\frac{1}{4}$

(٢٤٩) طريقة اخرى لجمع اسراد جمعها ممكن

افرض سرداً هابطاً فيه قوات كمية غير ثابتة القيمة مثل ك وليكن مجموعته = م
ثم اضرب جانبي المعادلة في كمية مركبة من ك وكمية اخرى ثابتة واجعل للكاف قيمة
حتى تكون قيمة الكمية المركبة المضروب فيها صفراً فان نقل جزءه او اكثر الى الجانب
الاول يعدل الجانب الثاني مثالة

$$(1) \text{ افرض } م = 1 + \frac{ك}{1} + \frac{ك}{2} + \frac{ك}{3} + \frac{ك}{4} + \frac{ك}{5} + \frac{ك}{6} \text{ الخ}$$

اضرب الجانبين في ك - ١ لنا

$$+ \frac{ك}{5 \times 4} + \frac{ك}{4 \times 3} + \frac{ك}{3 \times 2} + \frac{ك}{2 \times 1} + 1 - = (ك - 1) \times م$$

الخ $\frac{ك}{6 \times 5}$

فان فرض ك - ١ = ٠ يصير الجانب الاول اي م $\times (ك - 1) = ٠$ ثم ينقل

$$- \text{ الى الجانب الاول لنا } 1 = \frac{1}{2 \times 1} + \frac{1}{3 \times 2} + \frac{1}{4 \times 3} + \frac{1}{5 \times 4} + \frac{1}{6 \times 5} \text{ الخ}$$

$$(2) \text{ مفروض } م = 1 + \frac{ك}{1} + \frac{ك}{2} + \frac{ك}{3} + \frac{ك}{4} + \frac{ك}{5} \text{ الخ}$$

اضرب الجانبين في ك - ١ فلنا

$$م \times (ك - 1) = 1 - \frac{ك}{2} - \frac{ك}{3} - \frac{ك}{4} - \frac{ك}{5} \text{ الخ}$$

ثم ان فرض ك = ١ يكون ك - ١ = ٠ وينقل جزءه الى الجانب الاول لنا

$$\frac{٢}{٧ \times ٥} + \frac{٢}{٦ \times ٤} + \frac{٢}{٥ \times ٣} + \frac{٢}{٤ \times ٢} + \frac{٢}{٣ \times ١} = \frac{٢}{٢} = \frac{١}{٢} + ١$$

$$(٣) \text{ مفروض م} = \frac{ك}{٤} + \frac{ك}{٣} + \frac{ك}{٢} + ١$$

اضرب الجانبيين في ٢ ك - ٢ ك + ١ فلنا

$$\frac{٦ ك}{٤ \times ٣ \times ٢} + \frac{٥ ك}{٣ \times ٢ \times ١} + \frac{٥ ك}{٢} - ١ = (١ + ٢ ك - ك) \times م$$

$$+ \frac{٧ ك}{٥ \times ٤ \times ٣} الخ$$

وان فرض ك = ١ لنا

$$\frac{٨}{٦ \times ٥ \times ٤} + \frac{٧}{٥ \times ٤ \times ٣} + \frac{٦}{٤ \times ٣ \times ٢} + \frac{٥}{٣ \times ٢ \times ١} = \frac{٢}{٢}$$

فترى من المثالين الاخيرين ان سردين مختلفين قد يكونان من قيمة واحدة

نبذة في تعكيس الاسراد

٢٥٠ لكي تعكس سرداً مثل هذا

$$ك = ت + ن + ب + ن + س + ن + د + ر + ن + الخ$$

اي لتجد قيمة ن في اجزاء من ك افرض سرداً له مسميات غير معينة

$$\text{فلنفرض } ن = ت + ك + ب + ك + س + ك + د + ك + ر + ك + الخ$$

ثم لتجد قيمة قوات ن بموجب هذا المفروض لنا


$$ن = ت + ك + ك + ت + ب + ك + ت + س + ك + ب + س + ك + الخ$$

$$ن = ت + ك + ك + ت + ب + ك + ت + س + ك + ب + س + ك + الخ$$

$$ن = ت + ك + ك + ت + ب + ك + ت + س + ك + ب + س + ك + الخ$$

$$ن = ت + ك + ك + ت + ب + ك + ت + س + ك + ب + س + ك + الخ$$

ثم بالتعويض عن قوات ن في السرد الاول بهذه القيات لنا



ثم بمقابلة ك وجعل سميات قوت ك مساوية لصفير لنا ت - ا = ١ .

ت هـ + ب ت^٢ = ٠ .

ت م + ا ب ت^٢ هـ + م ت^٢ = ٠ .

ت د + ا ب ت^٢ م + ب ت^٢ ا + م ت^٢ د + د ت^٢ = ٠ .

ت ر + ا ب ت^٢ م + ا ب ت^٢ د + م ت^٢ ا + م ت^٢ د + د ت^٢ ا + ر ت^٢ = ٠ .

تحويل هذه المعادلات لنا ت = $\frac{١}{ب}$ -- = $\frac{ب}{ت}$

$$\frac{٥٠ - ٢ب - ٥ت + ١د}{٢ت} = \bar{د} \quad \frac{٢٢ - ٢ب - ٢س}{٢ت} = \bar{س}$$

$$\frac{١٤ب - ٢١ت + ٢س + ٦ت + ٢ب - ٥ت - ١ر}{٢ت} = \bar{ر}$$

هذه اذا قيمات السميئات الغير المعينة في السرد الذي فرضناه سابقاً اي ن =
 ت ك + ب ك + س ك + د ك + ر ك + الح
 ثم لنفرض سرداً

$$ك = ن - \frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} - \frac{١}{٤} + \frac{١}{٥} - \frac{١}{٦} + \frac{١}{٧} - \frac{١}{٨} + \frac{١}{٩} - \frac{١}{١٠} + \dots$$

حيث يكون ت = ١ ب = $\frac{١}{٣}$ س = $\frac{١}{٤}$ د = $\frac{١}{٥}$

ر = $\frac{١}{٥}$ فحسب قيمات السميئات المذكورة لنا
 ت = $\frac{١}{٣}$ ب = $\frac{١}{٤}$ س = $\frac{١}{٥}$
 د = $\frac{١}{٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢}$ ر = $\frac{١}{٢ \times ٢}$

$$ا\bar{ذ}ان = ك + \frac{ك}{٢} + \frac{ك}{٣ \times ٢} + \frac{ك}{٤ \times ٣ \times ٢} + \frac{ك}{٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢} + \dots$$

في السرد الدائر

٢٥١ في هذا السرد ١ + ك + ٢ + ٤ + ك + ٧ + ك + ١١ + ك + ١٨ + ك
 نرى ان مجموع كل مسميين متوالين يعدل الذي يليهما عن اليسار اي ١ + ٢ = ٣
 ٤ + ٧ = ١١ وكل جزء بعد الثاني يعدل الذي قبله في ك مع الذي قبل
 ذلك في ك

في هذا السرد ١ + ك + ٢ + ك + ٣ + ك + ٤ + ك + ٥ + ك + ٦ + ك نرى كل
 جزء بعد الثاني = ٢ ك في الجزء الذي قبله - ك في الذي قبل ذلك فالاسراد التي
 هي على هذا النسق اي التي يعرف كل جزء منها ما قبله يسمي سرداً دائراً ومسميات
 ك وك اي ٢ + ١ - ١ تسمى قياس النسبة

$$في هذا السرد ١ + ٤ + ك + ٦ + ك + ١١ + ك + ٢٨ + ك + ٦٣ + ك الح$$

نرى كل جزء بعد الثالث = ٢ ك في الذي قبله - ك في الذي قبل ذلك +
 ٢ ك في الثالث قبل ذلك فيكون قياس النسبة ٢ - ١ + ٢

لنفرض سرداً دآبراً ت + ب + س + د + ي + ف الخ
 فان كان قياس النسبة مركباً من جزئين كالاول المفروض سابقاً فليكونا م ون
 ثم س = ب م ك + ت ن ك = الجزء الثالث

$$\begin{aligned} \text{د} = \text{س م ك} + \text{ب ن ك} &= \text{الرابع} \\ \text{ي} = \text{د م ك} + \text{س ن ك} &= \text{الخامس} \end{aligned}$$

ان كان قياس النسبة مركباً من ثلاثة اجزاء مثل الثاني المفروض سابقاً فلتكن

$$م + ن + ر$$

$$\begin{aligned} \text{ثم د} = \text{س م ك} + \text{ب ن ك} + \text{ت ر ك} &= \text{الجزء الرابع} \\ \text{ي} = \text{د م ك} + \text{س ن ك} + \text{ب ر ك} &= \text{الخامس} \\ \text{ف} = \text{ي م ك} + \text{د ن ك} + \text{س ر ك} &= \text{السادس الخ} \end{aligned}$$

٢٥٢ في كل سردٍ دآبرٍ يوجد قياس النسبة بتحويل معادلتين من هذه
 المعادلات ان كان مركباً من جزئين وتحويل ثلاثٍ منها ان كان مركباً من ثلاثة
 اجزاء

فلنفرض ك = ١ ولناخذ الجزء الرابع والخامس مما سبق ذكرها واذا فرضنا ك
 = ١ فلنا

$$\left\{ \begin{aligned} \text{د} = \text{س م} + \text{ب ن} \\ \text{ي} = \text{د م} + \text{س ن} \end{aligned} \right. \text{لنا ان نجد قيمة م ون}$$

بتحويل هاتين المعادلتين لنا

$$\begin{aligned} \frac{\text{س ي} - \text{د د}}{\text{س س} - \text{ب د}} = \text{ن} & \quad \frac{\text{د س} - \text{ب ي}}{\text{س س} - \text{ب د}} = \text{م} \end{aligned}$$

ثم في هذا السرد ١ + ٢ ك + ٥ ك + ٧ ك + ٩ ك + ١١ ك الخ
 ت ب س د ي ف

ان جعل ك = ١ فلنا

$$1 - \frac{27 - 9 \times 5}{7 \times 2 - 20} = \text{ن} \quad 2 = \frac{9 \times 2 + 5 \times 7}{7 \times 2 - 20} = \text{م}$$

فيكون قياس النسبة ٢ - ١

٢٥٢ متى عرفنا قياس النسبة لسرد هابط نجد من ذلك مجموع السرد

$$\left. \begin{array}{l} \text{ت} \quad \text{ب} \quad \text{س} \quad \text{د} \quad \text{ي} \quad \text{ف} \\ \text{ت} + \text{ب} + \text{ك} + \text{س} + \text{ك} + \text{د} + \text{ك} + \text{ي} + \text{ك} + \text{ف} + \text{ك} \text{ الخ سرداً دابراً} \\ \text{قياس النسبة له م + ن} \end{array} \right\} \text{نفرض}$$

فيكون ت = الجزء الاول ب = الثاني

$$\text{س} = \text{ب} \times \text{م} + \text{ك} + \text{ت} \times \text{ن} + \text{ك} = \text{الثالث}$$

$$\text{د} = \text{س} \times \text{م} + \text{ك} + \text{ب} \times \text{ن} + \text{ك} = \text{الرابع}$$

$$\text{ي} = \text{د} \times \text{م} + \text{ك} + \text{س} \times \text{ن} + \text{ك} = \text{الخامس الخ}$$

فترى هنا م ك مضروباً في كل جزء الأول والاخير ون ك في كل جزء
الأخيرين وان وهم امتداد السرد الى غير نهاية يمكن ترك الاخيرين كما لا قيمة لها
(ع ٢٢) وان فرض ع = مجموع السرد فلنا

$$\text{ع} = \text{ت} + \text{ب} + \text{م} + \text{ك} \times (\text{ب} + \text{س} + \text{د} \text{ الخ}) + \text{ن} + \text{ك} \times (\text{ت} + \text{ب} + \text{س} \text{ الخ})$$

$$\text{وع} - \text{ت} = \text{ب} + \text{س} + \text{د} \text{ الخ} \quad \text{وع} - \text{ت} + \text{ب} + \text{س} \text{ الخ}$$

$$\text{فاذاع} = \text{ت} + \text{ب} + \text{م} + \text{ك} \times (\text{ع} - \text{ت}) + \text{ن} + \text{ك} \times \text{ع}$$

$$\text{وبتحويل هذه المعادلة تصيرع} = \frac{\text{ت} + \text{ب} - \text{ت} \text{ م} - \text{ك}}{\text{ا} - \text{م} - \text{ك} - \text{ن} + \text{ك}}$$

$$\text{مثال آ ما هو مجموع} 1 + 6 + \text{ك} + 12 + \text{ك} + 18 + \text{ك} + 24 + \text{ك} \text{ الخ}$$

قياس النسبة = ٦ + ١

$$\text{اذات} = 1 \quad \text{ب} = 6 = \text{ك} \quad \text{م} = 1 \quad \text{ن} = 6$$

$$\text{والمجموع} = \frac{\text{ك} + 1}{1 - \text{ك} - 6 + \text{ك}}$$

$$\text{آ ما هو مجموع} 1 + 2 + \text{ك} + 4 + \text{ك} + 7 + \text{ك} + 11 + \text{ك} + 18 + \text{ك} + 29 + \text{ك} \text{ الخ}$$

$$\text{الجواب} \frac{2 + 1}{1 - \text{ك} - 2 + \text{ك}}$$

٣ ما هو مجموع $١ + ك + ٥ ك + ١٢ ك + ٤١ ك + ١٢١ ك + ٣٦٥ ك$ الخ

الجواب $\frac{١ - ك}{١ - ٢ ك + ٣ ك}$

٤ ما هو مجموع $١ + ٢ ك + ٣ ك + ٤ ك + ٥ ك$ الخ

الجواب $\frac{١}{١ - (ك - ١)}$

٥ ما هو مجموع $١ + ٣ ك + ٥ ك + ٧ ك + ٩ ك + ١١ ك$ الخ

الجواب $\frac{١ + ك}{١ - (ك - ١)}$

٦ ما هو مجموع $١ + ٢ ك + ٨ ك + ٢٨ ك + ١٠٠ ك$ الخ

الجواب $\frac{١ - ك}{١ - ٣ ك + ٢ ك}$

في ترتيب الفضلات

٢٥٤ لكي نجد قيمة بعض اجزاء سردي الى حد ما يلزم التدقيق المقصود في

عمل ما يبوخذ عده رتب من فضلات اجزاء السرد مثاله ان فرض سرد

١ ٨ ٢٧ ٦٤ ١٢٥ بطرح كل جزء ما بعده

لنا ٧ ١٩ ٢٧ ٦١ الرتبة الاولى من الفضلات

١٢ ١٨ ٢٤ الرتبة الثانية

٦ ٦ الثالثة وهلم جرا

فان فرضت ب س دى ف الخ

فلناب - ت س - ب د - س ي - د ف - ي الخ = الاولى

س - ٢ ب + ت د - ٢ س + ب ي - ٢ د + س ف - ٢ ي + د الخ =

الثانية =

د - ٢ س + ٢ ب - ت ي - ٢ د + ٢ س - ب ف - ٢ ي + د -

س الخ = الثالثة

ي - ٤ د + ٦ س - ٤ ب + ت ف - ٤ ي + ٦ د - ٤ س + ب الخ = الرابعة

ف - ٥ ي + ١٠ د - ١٠ س + ٥ ب - ت الخ = الخامسة

فان لاحظنا مسميات هذه الاجزاء نرى مسميات الاجزاء

	1	2	1		في الرتبة الثانية
	1	2	2	1	في الثالثة
	1	4	6	4	في الرابعة
	1	5	10	10	في الخامسة

وهي اذا كسميات قوت كميات ثنائية فتكون مسميات ع عك من رتب فضلات

$$1 \text{ ع} \times \frac{1-ع}{2} \times \frac{1-ع}{2} \times \frac{1-ع}{3} \times \frac{1-ع}{3} \text{ الخ}$$

200 ثم لكي نجد عبارة عمومية دالة على جزء ما في سرد مثل ت ب س د

الخ لنفرض د' د'' د''' الخ = الجزء الاول في الرتبة الاولى والثانية والثالثة والرابعة الخ

اذا د' = ب - ت

د'' = س - 2ب + ت

د''' = د - 2س + 2ب - ت

د'''' = ي - 4س + 6د - 4ب + ت الخ

بالمقابلة نجد قيمات اجزاء السرد المفروض اي ت ب س د الخ

ب = ت + د'

س = ت + 2د' + د''

د = ت + 2د' + 2د'' + د'''

ي = ت + 4د' + 6د'' + 4د''' + د''''

فاذا لنا هذه العبارة للدلالة على ع جزء من سرد اوله ت

$$ت + (ع-1)د' + (ع-2)د'' + (ع-3)د''' + \dots + \frac{1-ع}{2} د'''' \dots$$

مثال اول ما هو الجزء العشرون من هذا السرد

الخ	21	10	10	6	3	1
الرتبة الاولى من فضلات	=	6	5	4	3	2

الثانية = 1 1 1 1

الثالثة =

هنا ت = 1 د' = 2 د'' = 1 د''' = 0

والجزء العشرون = 1 + 28 + 171 = 210

والجزء الخمسون = 1275

مثال ٣ ما هو الجزء العشرون من 1 2 3 4 5 الخ

السرد 1 8 27 64 125 الخ

الرتبة الاولى من فضلات = 7 19 37 61

الثانية = 12 18 24

الثالثة = 6 6

هنات = 1 = د' 7 = د' 12 = د'' 6 = د'''

والجزء العشرون = 8000

٣ ما هو الجزء الثاني عشر من 1 2 6 12 20 30 الخ

الجواب 106

٤ ما هو الجزء الخامس عشر من 1 2 3 4 5 6 الخ

الجواب 225

٢٥٦ لنا ايضا هذه العبارة الثالثة على مجموع اجزاء من سرد اوله ت

$$ع + ع \frac{1-ع}{2} + ع \frac{1-ع}{3} \times \frac{1-ع}{2} + ع \frac{1-ع}{3} \times \frac{1-ع}{2} \times \frac{1-ع}{3}$$

$$\times \frac{1-ع}{4} + الخ$$

مثال اول ما هو مجموع 20 جزءا من 1 2 3 4 5 6 7 8 الخ

السرد 1 2 3 4 5 6 7 8

الرتبة الاولى من فضلات = 2 2 2 2

الثانية = . . .

هنات = 1 = د' 2 = د'' . = د'''

$$اذاً المجموع = 20 + 20 \times \frac{1-20}{2} = 20 \times 20 = 400 اي ع$$

٣ ما هو مجموع 20 جزءا من 1 2 3 4 5 الخ

ت = 1 = د' 2 = د'' 3 = د''' . = د'''' ومجموع عشرين جزءا = 2870

٣ ما هو مجموع ٥٠ جزءاً من ١ ٢ ٣ ٤ الخ
 ت = ١ = د = ٧ = د = ١٢ = د = ٦ = د = ٠

المجموع ١٦٢٥٦٣٥

٤ ما هو مجموع ١٥ جزءاً من ٢ ٦ ١٢ ٢٠ الخ
 ٥ ما هو مجموع ٢٠ جزءاً من ١ ٣ ٦ ١٠ الخ
 ٦ ما هو مجموع ١٢ جزءاً من ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الخ



الفصل الحادي والعشرون

في المعادلات التامة من الدرجة الثالثة

٢٥٧ متى وجد في معادلة مكعب المجهول ومرعوه سميت معادلة تامة من الدرجة الثالثة وهذه عبارة عمومية لمعادلات من هذا النوع بعد نقل الاجزاء الى جانب واحد

$$ت ك^٢ + ب ك + ر = د$$

ولا بد لكل معادلة من هذا النوع من ثلاثة اجوبة كما ان المعادلات من الدرجة الثانية لها جوابان

فلو فرضنا $(ك - ١) \times (ك - ٢) \times (ك - ٣) = ٠$ لكان لنا من ذلك ك - ١ - ٢ + ٣ = ٠

ولكي تعدل هذه الكميات صفراً لا بد ان يكون احد الاضلاع التي حصلت المعادلة منها صفراً اي تكون ك - ١ = ٠ وك = ١ او ك - ٢ = ٠ وك = ٢ او ك - ٣ = ٠ وك = ٣ واذا عوضنا عن المجهول بكمية اخرى اية كانت غير واحدة من هذه الثلاث لم يكن المحاصل صفراً فلا يكون للمعادلة غير هذه الاجوبة الثلاثة واجوبة المعادلات هذه تسمى اصولها

٢٥٨ لاجل ايضاح كيفية استعمال اصول معادلة من هذا النوع لنفرض ك - ف ك - ق ك - ر

وبضرب الاولى في الثانية لنا ك^١ - (ف + ق) ك + ف ق وان ضربت هذه في ك - ر فلنا

ك^٢ - (ف + ق + ر) ك^١ + (ف ق + ف ر + ق ر) ك - ف ق ر وهذه العبارة تعدل صفراً متى كان

وك = ق او ك - ر = ٠ . وك = ر فلنعوض عن هذه المعادلة باخرى مثل ك^١ - ت ك^١ + ب ك - س = ٠ فلكي تكون الاصول الثلاثة على ما تقدم اي ك =

ف او ك = ق او ك = ر بلزم ان يكون

$$(١) \quad ت = ف + ق + ر$$

$$(٢) \quad ب = ف ق + ف ر + ق ر$$

$$(٣) \quad س = ف ق ر$$

فنرى ان الجزء الثاني من المعادلة مشتمل على مجموع اصولها الثلاثة . وان الجزء الثالث منها مشتمل على مجموع حاصل كل اثنين اثنين من الاصول الثلاثة . والجزء الرابع مشتمل على حاصل الاصول الثلاثة . ونرى ايضاً ان كل معادلة من الدرجة الثالثة لا يكون لها اصولٌ منطقةً الا الكميّات التي تفني الجزء الرابع منها . فمن حيث ان ذلك الجزء هو حاصل الاصول الثلاثة لا بد ان يقبل الانقسام على كل واحدٍ منها . ومن ذلك نستدل بسهولة على الكميّات التي يجب ان نستخدمها في تفنيشنا على اصول المعادلة . فلو فرض ك^٢ = ك + ٦ لكان لنا بالمقابلة ك^١ - ك - ٦ = ٠ . ومن حيث ان هذه المعادلة ليس لها اصول منطقة الا التي تنقسم ٦ عليها نعلم ان تلك الاصول هي ثلاثة من هذه الاربعة اي ١ ٢ ٣ ٦ لان ٦ لا تنقسم الا على هذا الاربعة

$$\text{فان فرض ك} = ١ \text{ لنا } ١ - ١ - ١ = ٦ -$$

$$\text{وان فرض ك} = ٢ \text{ لنا } ٢ - ٢ - ٨ = ٦ -$$

$$\text{وان فرض ك} = ٣ \text{ لنا } ٣ - ٣ - ٢٧ = ٦ -$$

$$\text{وان فرض ك} = ٦ \text{ لنا } ٦ - ٦ - ٢١٦ = ٦ -$$

فلنا من ذلك ك = ٢ واحد من الاصول الثلاثة

فيكون ك - ٢ ضلعاً من الاضلاع التي حصلت المعادلة من ضرب بعضها

في بعض . ونجد الاخر بالتقسمة هكذا

$$\begin{array}{r} ٢ - ك(٢ - ك) - ك - ك(ك) + ٢ + ك \\ \hline ٢ - ك - ك \\ \hline ٢ - ك - ك \\ \hline ٢ - ك - ك \\ \hline ٢ - ك - ك \\ \hline ٢ - ك - ك \end{array}$$

ثم $ك + ٢ + ك = ٠$ $ك + ٢ + ك = ٢$ $ك = ٢ - ٢ = ٠$ و $٢ - ٢ = ٠$ فيكون الاصلان الآخران وهيين

٢٥٩ هذا متى كان للقوة العليا من المجهول مسمى هو واحد وبقية قوائمه سميات صحيحة

وان لم يكن كذلك يجب تحويل المعادلة الى الحالة المشار اليها فلنفرض

$$ك - ٢ - ك + ٢ + ك = \frac{١}{٤} - ك + \frac{٢}{٤}$$

فمن حيث ان في السميات ارباعاً لنفرض $ك = \frac{١}{٣}$ ثم بالتعويض عن ك في المعادلة لنا

$$\frac{١}{٣} - ٢ - \frac{١}{٣} + ٢ + \frac{١}{٣} = \frac{١}{٤} - \frac{١}{٣} + \frac{٢}{٤}$$

١ - ١ + ١ = ١ فنكون الاصول $١ = ١$ $٢ = ٢$ $٣ = ٣$ وارجاع

$$ك = \frac{١}{٣} = ك \quad ١ = ك \quad ٢ = ك$$

٢٦٠ لنفرض معادلة مسمي القوة العليا منها غير واحد وجزؤها الاخير واحد مثل هذه

$$\begin{array}{r} ٦ - ك(٦ - ك) - ك - ك(ك) + ١ + ك \\ \hline ٦ - ك - ك \\ \hline ٦ - ك - ك \\ \hline ٦ - ك - ك \\ \hline ٦ - ك - ك \end{array}$$

ثم لنفرض $ك = \frac{١}{٦}$ وبالتعويض لنا

$$\frac{١}{٦} - ٦ - \frac{١}{٦} + ٦ + \frac{١}{٦} = \frac{١}{٦} - \frac{١}{٦} + \frac{١}{٦}$$

$$١ - ١ + ١ = ١$$

فلو اردنا امتحان المعادلة بجميع الاعداد التي يمكن انقسام ٢٦ عليها لاطال بد

العمل فلنفرض ك = $\frac{1}{د}$ ثم بالتعويض لنا

$$١١ + د٦ - د٦ = ١ - \frac{٦}{د} + \frac{١١}{د} - \frac{٦}{د}$$

$$١١ + د٦ - د٦ = ١ - \frac{٦}{د} + \frac{١١}{د} - \frac{٦}{د}$$

٢٦١ متى كانت العلامات في المعادلة ايجابية وسلبية بالتداول كما في

المعادلات المذكورة انفاً وفي هذه ك - ت ك + ب ك - س = ٠ تكون جميع الاصول ايجابية. ولو كانت جميع العلامات ايجابية كما في هذه ك + ت ك + ب ك + س = ٠

لكانت جميع الاصول سلبية كما يتضح من ضربها مثاله ك = ٢ = ك = ٣ = ك = ٤ = بالمقابلة ك - ٢ = ٠ ك - ٣ = ٠ ك - ٤ = ٠

$$\text{وبالضرب } (ك - ٢) \times (ك - ٣) \times (ك - ٤) = ٠ \text{ فـ } ٢٦ + ك = ٢٤ -$$

ولو فرض ك = ٢ = ك = ٣ = ك = ٤ =

لكان ك = ٢ = ٠ ك = ٣ = ٠ ك = ٤ = ٠

فالضرب لنا ك + ٩ = ك + ٢٦ = ك + ٢٤ = ٠

فنرى ان عدد الاصول السلبية بمائل مرار تغيير العلامات في المعادلة. وعدد

الاصول الايجابية بمائل مرار تتابع العلامات المتشابهة

$$\text{وفي هذه المعادلة } ك^٢ + ك^٢ - ٣٤ = ٠ \text{ ك + ٥٦ = ٠}$$

نرى العلامات تتغير من + الى - ثم من - الى + اي مرتين و+ يتبع + مرة

واحدة فقط. ونستدل بذلك ان للمعادلة اصلين ايجابيين واصلاً واحداً سلبياً. ولا بد

ان ٥٦ يقبل الانقسام على هذه الاصول و٥٦ ينقسم على ١ ٢ ٤ ٧ ٨

$$١٤ \text{ } ٢٨ \text{ } ٥٦ \text{ فاذا فرضنا } ك = ٢ \text{ فلنا } ٢ = ٨ + ٤ - ٦٨ - ٥٦ = ٠ \text{ فاذاً}$$

ك = ٢ هو اصل واحد. ولكي نجد الاخرين نقسم على

$$ك (٢ - ك) + ك^٢ - ٣٤ = ٠ \text{ ك + ٥٦ = ٠ (ك + ٣ - ك - ٢٨)}$$

$$\begin{array}{r} ٣ - ك^٢ \\ ٣ - ك^٢ \\ \hline ٦ - ك \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٢٨ - ك + ٥٦ \\ ٢٨ - ك + ٥٦ \\ \hline ٥٦ + ك - ٢٨ \\ ٥٦ + ك - ٢٨ \end{array}$$

والخارج ك^٢ + ك^٢ - ٢٨ = ٠ وك^٢ + ك^٢ = ٢٨ ك = ٤ وك = -٧
 (مسئلة ١) ما عددان فضلتهما ١٢ واذا ضرب حاصلهما في مجموعهما كان
 الحاصل ١٤٥٦٠

لنفرض ك = اصغرها. وك + ١٢ = اكبرها. وحاصلهما ك^٢ + ١٢ ك ومجموعهما
 ٢ ك + ١٢ وهذا في حاصلها يعطينا ٢ ك^٢ + ٢٦ ك^٢ + ١٤٤ ك = ١٤٥٦٠
 وبالقسمة على ٢ ك^٢ + ١٣ ك + ٧٢ = ٧٢٨٠ ولواردنا ان نفتح جميع
 الاعداد التي تقبل ٧٢٨٠ الانقسام عليها لطلال بنا العمل ولكن نرى ان ينقسم
 على ٨ فلنفرض ك = ٢ ي ثم بالتعويض لنا ٨ ي^٢ + ٧٢ ي + ١٤٤ = ٧٢٨٠
 وبالقسمة على ٨ لنا ي^٢ + ٩ ي + ١٨ = ٩١٠ و ٩١٠ يقبل الانقسام على
 ١٠ و ٢٠ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ الى اخره فلا داعي لامتحان ١ و ٢ وه لاننا نراها من
 اول وهلة صغيرة فلنفتح اولاً ٧ اية نفرض ي = ٧ فلنا ٢٤٢ + ٤٤١ +
 ١٢٦ = ٩١٠ فاذا ي = ٧ فاذا ك = ١٤ هو واحد من اصول المعادلة
 ونجد الاخرين بالقسمة هكذا

$$\begin{array}{r}
 (٧ - ي) (٩ + ي) + ١٨ - ٩١٠ = (٩ + ي) (١٦ + ي) - ٩١٠ \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 ١٦ ي + ٩١٠ \\
 - ٩ ي - ١٨ \\
 \hline
 ١١ ي - ١٢٠ \\
 \hline
 ٩١٠ - ١٢٠ \\
 \hline
 ٩١٠ - ١٢٠
 \end{array}
 \end{array}$$

فلنا ي^٢ + ١٦ ي = ١٢٠ - ٩١٠ = -٧٩٠ وهي كمية وهية. وذلك
 بدل على ان الاصلين الآخرين وهيان فاذا ك = ١٤ و ١٢ + ١٤ = ٢٦
 (مسئلة ٢) ما عددان فضلتهما ١٨ ومجموعهما في فضلة مكعبيهما = ٢٧٥١٨٤
 لنفرض اكبرها = ك فيكون اصغرها ك + ١٨ وكعب الاكبر ك^٣ وكعب
 الاصغر ك^٣ + ٥٤ ك^٢ + ٩٧٢ ك + ٥٨٢٢ وفضلة كعبيهما ٥٤ ك^٣ + ٩٧٢ ك^٢
 + ٥٨٢٢ اي ٥٤ (ك^٣ + ١٨ ك + ١٠٨) وهذا في ٢ ك + ١٨ اي ٢ (ك +
 ٩) يعطينا
 ١٠٨ (ك^٣ + ٢٧ ك^٢ + ٢٧٠ ك + ٩٧٢) = ٢٧٥١٨٤ وبالقسمة على
 ١٠٨ نصير

$$ك + ٢٧ + ٢٧٠ ك + ٩٧٢ = ٢٥٤٨$$

$$اي ك + ٢٧ + ٢٧٠ ك = ١٥٧٦$$

و١٥٧٦ يقبل الانقسام على ١ و٢ و٤ و٨ الى اخره ونرى من اول وهلك ان ١ و٢ اصغرا ما يلزم واذا امتحنا المعادلة باربعة نجدها صحيحة. فاذا ك = ٤ هي واحد من اصول المعادلة. وبالقسمة على ك-٤ لنا ك + ٣١ + ك = ٣٩٤ .

وتحويلها لنا ك = $\frac{1076}{4} - \frac{972}{4} + \frac{31}{4}$ وهي كميات وهمية. فيكون

$$\text{العددان المطلوبان } ٤ \text{ و } ١٨ = ٢٢$$

(مسئلة ٢) ما عددان فضلتهما ٧٢٠ واذا ضرب اصغرها في جذر اكبرها يكون

الحاصل ٢٠٧٢٦ . لنفرض الاصغر ك والاكبر ك + ٧٢٠ فلنا ك + ك = ٧٢٠ .

$$٨١ \times ٤ \times ٨ \times ٨ = ٢٠٧٢٦ =$$

بتربيع الجانبيين ك + ٧٢٠ = ك × ٨ × ٨ × ٤ × ٨١

ثم لنفرض ك = ٨ ي فبا التعويض لنا

$$٨١ \times ٤ \times ٨ \times ٨ = ٨ ي \times ٧٢٠ + ٨ ي$$

بالقسمة على ٨ لنا ي = ٩٠ + ي

ثم لنفرض ي = ٢ ل فالبتعويض لنا

$$٨١ \times ٤ \times ٨ = ٩٠ \times ٤ + ٢ ل$$

بالقسمة على ٨ لنا ل = ٤٥ + ل

ثم لنفرض ل = ٩ م فلنا بتعويض

$$٩ \times ٤ = ٩ م \times ٤٥ + ٩ م$$

بالقسمة على ٩ لنا م = ٥ + م

$$٩ \times ٤ = (٥ + م) \times ٩ \quad \text{اي}$$

اذا م = ٤ و م = ٥ + م = ٩ = م = ٤

فلنا ل = ٤٦ ي = ٧٢ ك = ٥٧٦ = الاصغر

$$\text{والاكبر} = ١٢٩٦ = ٧٢٠ + ٥٧٦$$

ولنا طريقة اخرى لحل هذه المسئلة

لنفرض اكبرها ك فالاصغر ك - ٧٢٠

بالضرب في $\frac{١}{٢٠}$ لنا $ك' - ٧٢٠ = ٢٠٧٣٦$

اي $ك' - ٧٢٠ = ١٢ \times ٢٧ \times ٦٤$

لنفرض $ك = ٤$ ي فلنا $٦٤ - ٧٢٠ = ٤ \times ١٢ \times ٢٧$

بالقسمة على ٦٤ لنا $١ - ٤٥ = ١٢ \times ٢٧$

لنفرض $٢ = ١٢$ فلنا $٢٧ - ١٢٥ = ١٢ \times ٢٧$

بالقسمة على ٢٨ لنا $١ - ٥ = ١٢$

وهنا نرى من اول نظرة ان $٢ = ٢$ ومن ثم لنا

$٩ = ٩ = ٣٦ = ٣٦ = ١٢٩٦ = ١٢٩٦ = ١٢٩٦$ اكبرها

(مسئلة ٤) ما عددان فضلتهما ١٢ واذا ضربت هذه الفضلة في مجموع كميها

كان الحاصل ١٠٢١٤٤

لنفرض $ك =$ اصغرها و $ك + ١٢ =$ اكبرها

كعب الاول = $ك'$ وكعب الثاني = $ك' + ٣٦ + ٣٦ + ٤٣٢ + ٤٣٢ + ١٧٢٨$ فلنا

$١٢ (٢ ك' + ٣٦ + ٣٦ + ٤٣٢ + ٤٣٢ + ١٧٢٨) = ١٠٢١٤٤$

بالقسمة على ١٢ و ٢ لنا $ك' + ١٨ + ١٨ + ٢١٦ + ٢١٦ + ٨٦٤ = ٤٢٥٦$

اي $ك' + ١٨ + ٢١٦ = ٣٣٩٢ = ٨ \times ٨ \times ٥٢$

لنفرض $ك = ٢$ ي ونقسم على ٨ فلنا

$٤٢٤ = ٥٢ \times ٨ = ٩ + ٩ + ٥٢$

و ٤٢٤ يقبل الانقسام على ١ و ٢ و ٤ و ٨ و ٥٢ الى اخره

لنفرض $٤ = ٤$ فلنا $٦٤ + ١٤٤ + ٢١٦ = ٤٢٤$

فاذا $٤ = ٤$ $٨ = ٨$ $١٢ = ٢٠$

(مسئلة ٥) رجال عقدوا شركة على شرط ان يضع كل واحد منهم في راس

المال من الدنانير ما يماثل عدد الشركاء عشر مرات فربحوا في المائة ٦ اكثر من

عدد الشركاء وكان كل الربح ٢٩٢ ديناراً فكم عدد الشركاء

لنفرض $ك =$ عدد الشركاء ثم $١٠ ك =$ ما وضعه كل واحد و $١٠ ك =$ ما

وضعه جميعهم والربح في المائة $ك + ٦$ فيكون ربح دينار واحد $\frac{ك + ٦}{١٠}$

$$\text{وهذا في } ١٠ ك = \frac{ك٦ + ك٢}{١٠} = \text{الربح كله}$$

$$\text{فلنا } ٢٩٢ = \frac{ك٦ + ك٢}{١٠}$$

$$\text{و } ٣٩٢٠ = ك٦ + ك٢$$

لنفرض ك = ٢ ي ثم نقسم على ٨ فلنا

$$٤٩٠ = ي٣ + ي٢$$

و ٤٩٠ يقبل الانقسام على ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ الى اخره

فترى من اول وهلة ان ١٠ هي اكثر ما يلزموا و ٢ و ٥ اصغر ما يلزم.

فلنفرض ي = ٧ فلنا

$$١٤ = ك ي = ٧ فاذا ٤٩٠ = ١٤٧ + ٣٤٣$$

الشركاء ١٤ وكل واحد وضع في راس المال ١٤٠ ديناراً

(مسئلة ٦) شركاء في تجارة كان راس ماهر ٨٢٤٠ ديناراً فاضاف اليه كل شريك من الدنانير ما يماثل عدد الشركاء ٤٠ من فربحوا في المائة من الدنانير ما يماثل عدد الشركاء وعند قسمة الربح اخذ كل واحد من الدنانير ما يماثل عدد الشركاء عشر مرات وبقي ٢٢٤ ديناراً فكم عدد الشركاء

لنفرض ك = الشركاء و ٤٠ ك = ما اضافة كل واحد من راس المال و ٤٠ ك ما اضافة الجميع و ٤٠ ك + ٨٢٤٠ = راس المال كله بعد الاضافات المذكورة

وربح في المائة ك فيكون كل الربح $\frac{ك٤٠}{١٠٠} + \frac{ك٨٢٤٠}{١٠٠}$ اي $\frac{ك٢}{١٠} +$

$\frac{٤١٢}{١٠} ك$ ومن هذا المبلغ اخذ كل واحد ١٠ ك والكل اخذوا ١٠ ك

$$\text{وبقي } ٢٢٤ \text{ فلنا } \frac{ك٢}{١٠} + \frac{٤١٢ ك}{١٠} = ٢٢٤ + ك$$

$$٠ = ٥٦٠ - ك٢٠٦ + ك٢$$

فترى العلامات تتغير ثلاث مرات فنكون الاصول جميعها ايجابية و ٥٦٠ يقبل الانقسام على ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ الخ فان فرضنا ك = ٤ نجد ان المعادلة لانصح وكذلك اذا فرضنا ك = ٥ واذا فرضنا ك = ٧ نجد المعادلة صحيحة فاذاً

ك = ٧ ونجد الاصلين الاخرين بالقسمة فلنا بعد القسمة ك' - ١٨ = ٨٠ + ٠ = ٠
 ك = ٩ ± ١ اي ك = ٨ او ١٠ وكل واحد من هذه الاجوبة الثلاثة يطابق شروط
 المسئلة هكذا

<u>١٠</u>	<u>٨</u>	<u>٧</u>	عدد الشركاء
٤٠٠	٢٢٠	٢٨٠	كل واحد اضاف ٤٠ ك
٤٠٠٠	٢٥٦٠	١٩٦٠	الكل اضافوا ٤٠ ك'
٨٢٤٠	٨٢٤٠	٨٢٤٠	راس المال
١٢٢٤٠	١٠٨٠٠	١٠٢٠٠	= ٨٢٤٠ + ٤٠ ك'
١٢٢٤	٨٦٤	٧١٤	ربحوا في المائة ما يماثل عدد الشركاء ٧١٤
١٠٠	٨٠	٧٠	كل واحد اخذ
١٠٠٠	٦٤٠	٤٩٠	الكل اخذوا
٢٢٤	٢٢٤	٢٢٤	فبقي

(مسئلة ٧) ما عددان مجتمعهما ١٢ وان ضرب كل واحد في جذر الاخر
 كان مجموع الحاصلين ٢٠

لنفرض احدهما ك' والاخرى

$$(١) \text{ بشروط المسئلة } ك' + ي = ١٢$$

$$(٢) \text{ اضع } ٢ ك' \text{ الى الجانبين } ك' + ٢ ك' ي + ١٢ = ٢ ك' ي + ١٢$$

$$(٣) \text{ بالتجزير } ك' + ي = ١٢ \text{ } ٢ ك' ي + ١٢ = ٢ ك' ي$$

$$(٤) \text{ بالشرط الثاني } ك' + ي = ٢٠$$

$$\text{اي } ك' (ك' + ي) = ٢٠$$

$$(٥) \text{ بالقسمة } ك' + ي = \frac{٢٠}{ك'}$$

$$(٦) \text{ بالمساواة بين (٢) و(٥) } \frac{٢٠}{ك'} = ٢ ك' ي + ١٢$$

$$(٧) \text{ بالترقية } ٢ ك' ي + ١٢ = \frac{٩٠٠}{ك'}$$

$$(٨) \text{ بالمجبر } ٢ ك' ي + ١٢ ك' = ٩٠٠$$

(٩) افرض كى = ف ٢ ف + ١٢ ف = ٩٠٠

اي $٤٥٠ = ف + ٦ \frac{١}{٣} ف$

او اذا فرض ك + ى = س وكى = ف

فلنا من (٤) كى (ك + ى) = ف س

و $ك + ٢ كى + ى = س$

اي $ك + ٢ ف + ى = س$

و $ك + ى = س - ٢ ف$

ومن (١) لنا $١٢ = س - ٢ ف$

بالمقابلة $١٢ - س = ٢ ف$

لنا من (٤) $٣٠ = ف س$

بالقسمة ف $\frac{٣٠}{س} = ٢ ف$

وبالمساواة $\frac{٦٠}{س} = ١٢ - س$

بالمجبر $٦٠ = س - ١٢ س$

افرض $٥ = س$ فلنا $١٢٥ - ٦٠ = ٦٠$

و $٦ = ف$ $٣٠ = ف س$

$٥ = ى + \frac{٦}{س}$ $\frac{٦}{س} = ك$ $٦ = كى$

$٤ = ى$ $٢ = ك$ $٩ = ى$



الفصل الثاني والعشرون

في حل المعدلات من كل درجة بالاستقراء

٢٦٢ قد تقدم القول ان حاصل اصول معادلة ما يعدل جزءها الاخير.

فن النظر الى هذا الجزء يمكننا ان نفرض احد الاصول فرضاً تقريبياً. واذا فرضنا للاصل قيمتين وامتنحناها بالتعويض بهما عن المجهول في المعادلة نجد الخطأ. ثم نصلح المفروضين على موجب هذه النسبة

نسبة فضلة الخطأين الى فضلة المفروضين كالمفروض الاصغر الى الاصلاح المقتضي له
ونكرر هذا العمل حتى نصل الى المطلوب ونسَمِّي هذه الطريقة استقراءً. ويسهل العمل اذا فرضنا عددين فضلتهما ١٠ او ١٠٠ الى اخره

(١) مفروض ك^٢ - ٨ ك^٢ + ١٧ ك - ١٠ = ٠ مطلوب قيمة ك
نرى في هذه المعادلة ان العلامات تغيرت ثلاث مرات فيقتضي ان تكون
الاصول الثلاثة ايجابية وان يكون حاصلها ١٠ ومجموعها ٨ (٢٥٨)
فلنفرض احدها ١٥ او ٢٥

بالاول	بالتالي
ك ^٢ = ١٢٢٦٥١	١٤٠٦٠٨
٨ ك - = ٢٠٨٠٨	- ٢١٦٢٢
١٧ ك = ٨٦٧	٨٨٤
١٠ - = ١٠٠ -	١٠٠ -
الخطآن = ١٢٧١ +	٢٦٨٨ +
بالطرح	١٢٧١
فضلة الخطأين	١٤١٧ +

ثم بالنسبة ١٤ : ١ : ٠١ :: ١٢٧ : ٠٩ : ٠٩ اي ٠٩ : ٠٩ يجب طرحها
من المفروض الاول فلنا $١٥ - ٠٩ = ٠٦$
ثم لنفرض ك = ١٥ او ٢٥

بالاول	بالتالي
ك ^٢ = ١٢٥٧٥١	١٢٦٥٠٦
٨ ك - = ٢٠٠٨	- ٢٠١٦
١٧ ك = ٨٥١٧	٨٥٢٤
١٠ - = ١٠ -	١٠ -
الخطآن = ١٢١ +	٢٤٦ +

$$\text{وبالطرح } ٢٤٦ = ١٢١ - ١٢٥$$

$$\text{ثم } ١٢٥ : ١ : ١٢١ :: ١ : ١ : \text{اصلاح}$$

$$\text{وا } ٥ : ١ = ٥ : ١ \text{ وهي تطابق المعادلة فلنا } ٥ = ٥ \text{ واحد من}$$

الاصول الثلاثة. وبالقسمة

$$\text{ك} - ٥ = ٨ \text{ ك} + ١٧ - \text{ك} - ١٠ = \text{ك} - ٣ + ٢ = ٥$$

وباتمام الترييع الى اخره ك = ٢ او ١ وهذه الاصول الثلاثة اي ٥ و ٢ و ١ بعد

تبدل علاماتها ليكون مجتمعا - ٨ وحاصلها - ١٠

$$(٢) \text{ ما هي اصول هذه المعادلة } ٨ \text{ ك} - ٢ \text{ ك} + ٤ \text{ ك} + ٤٨ = ٥$$

الجواب - ٢ + ٤ + ٦

$$(٣) \text{ ما هي اصول هذه المعادلة } ١٦ \text{ ك} - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} - ٥٠ = ٥$$

الجواب ١ ٥ ١٠

$$(٤) \text{ ما هي اصول هذه المعادلة } ٢ \text{ ك} + ٢ \text{ ك} - ٣٣ \text{ ك} = ٩٠$$

الجواب ٦ - ٥ - ٢

(٥) مطلوب اصل من اصول هذه المعادلة تقريبا وهي $٩ \text{ ك} + ٢ \text{ ك} + ٨٠ = ٤$

$$٨٠ = ٤ \text{ ك}$$

(٦) مطلوب اصل من اصول هذه المعادلة تقريبا وهي $٢ \text{ ك} + ٢ \text{ ك} + ١٠٠ = ١٠٠$

طريقة اخرى

لنفرض $r =$ عدداً قد وجدنا بالامتحان انه يعدل قيمة المجهول ك تقريبا.

ولنفرض $l =$ الفرق بين r والاصل الحقيقي ك ثم في المعادلة المفروضة نعوض عن

ك بواسطة $r \pm l$ ونسقط الاجزاء المئوية قوات من l فتصير المعادلة بسيطة.

مثالة

$$(١) \text{ مفروض } ١٦ \text{ ك} - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} = ٥٠$$

$$\text{لنفرض } ١٦ \text{ ك} = r - l$$

$$٥٠ = \begin{cases} ١٦ \text{ ك} - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} = r - l - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} + r - l \\ ١٦ \text{ ك} - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} = r - l - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} + r - l \\ ١٦ \text{ ك} - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} = r - l - ٢ \text{ ك} + ٦٥ \text{ ك} + r - l \end{cases}$$

باسقاط الاجزاء التي فيها ل و ل لنا

$$ر٠٠١٦ + ر٠٦٥ - ر٠٢٢ + ر٠٢٢ - ر٠٢٢ = ٥٠$$

$$و ل = \frac{ر٠٦٥ - ر٠١٦ + ر٠٠٠}{٦٥ - ر٠٢٢ + ر٠٢٢ -}$$

ثم لنفرض $ر = ١١$ فإذا ل $= \frac{٦٠}{٧٦} = ٠.٧٩$ تقريباً

$$ك = ر - ل اي = ١١ - ٠.٧٩ = ١٠.٢١$$

ثم افرض $ر = ١٠.٢١$ في المعادلة الاخيرة فلنا ل $= ١١٨.٠$ و $ر - ل =$

$$١٠.١٢$$

افرض $ر = ١٠.١٢$ فلنا ل $= ١٠.١٢$

$$و ر - ل = ١٠.١٢ - ١٠.١٢ = ٠ = ك$$

(٢) نطلب اصلاً هذه المعادلة تقريباً وهي $ك٢ + ١٠ك + ٥ = ٢٦٠٠$

الجواب ١١٠٠.٦٧

(٣) ما هي اصول هذه المعادلة $ك٢ + ٢ك - ١١ = ك٢ = ١٢$

(٤) ما هي اصول هذه المعادلة $ك٤ + ٤ك - ٧ك - ٢٤ = ك٢ = ٢٤$



الفصل الثالث والعشرون

في المسائل الغير المحدودة وهي السبالة

٢٦٤ ان كانت المعادلات التي تتركب من شروط مسألة اقل عدداً من

مجاهيلها تكون المسئلة غير محدودة. ويمكن ان يفرض لاحد المجاهيل اية قيمة كانت

فتخرج البقية بالنسبة الى المفروض. وفي مسائل هذا الباب تستعمل القواعد السابقة

ولكن ينبغي التبصر والاحتيال لكي توجد الطريقة الفضلى لاستعمالها في كل مسألة

بفردهما. فلو طلب عددان صحيجان ايجابيان مجنعهما عشرة وفرضنا احدهما ك والاخر

ى كان لنا $ك + ى = ١٠$ $ك - ١٠ = ى$ فكمية ى لم نحدد بالمسئلة سوى ان

تكون صحيجة ايجابية فيمكن ان نفرض لها اية قيمة صحيجة كانت من ١ الى ١٠ ولكن

يجب ان تكون ك ايضاً صحيحة ايجابية فلا تُفرض ي أكثر من ١٠ والألكانت ك سلبية فلا تكون ي أكثر من ٩

فان فرض ي = ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ فان فرض ي = ٩ تكون ك = ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ والمجموعات الاربع الاخيرة هي مثل الاربع الاولى. فيكون للمسئلة خمسة اجوبة

(مسئلة ١) اقسم ٢٥ الى قسمين احدهما قابل الانقسام على ٢ والاخر على ٣ لنفرض احدها ٢ ك والاخر ٢ ي

$$\text{فلنا } ٢ ك + ٢ ي = ٢٥ = ك \frac{٢ - ٢٥}{٢}$$

فترى من هذا الكسر ان ٢ ي اقل من ٢٥ فيكون ي اقل من ٨ واذا قسمنا صورة الكسر على المخرج فلنا ك = ١٢ - ي + $\frac{٢ - ١}{٢}$ فترى ان ١ - ي او بالاحرى ي - ١ يقبل الانقسام على ٢

$$\text{فلنفرض } ي - ١ = ٢ ل \text{ فاذا } ي = ٢ ل + ١$$

وبالتعويض ك = ١٢ - ٢ ل - ١ - ١ = ١١ - ٢ ل ولا يمكن ان تكون ي أكثر من ٨ فنفرض ل ابي عدد كان على شرط ان لا يكون ٢ ل + ١ أكثر من ٨ فلا بد ان تكون ل اقل من ٤ ولا تكون أكثر من ٣

$$\begin{array}{llll} \text{فان فرض ل} & = & ٠ & \text{ل} = ١ & \text{ل} = ٢ & \text{ل} = ٣ \\ \text{لنا} & ي = ١ & ي = ٢ & ي = ٥ & ي = ٧ \\ \text{و} & ك = ١١ & ك = ٨ & ك = ٥ & ك = ٢ \end{array}$$

فاذا ٢ ك + ٢ ي = ٢٢ + ٢ او ١٦ + ٩ او ١٠ + ١٥ او ٤ + ٢١

(مسئلة ٢) اقسم ١٠٠ الى قسمين احدهما يقبل الانقسام على ٧ والاخر على ١١ لنفرض القسمين ٧ ك و ١١ ي فلنا ٧ ك + ١١ ي = ١٠٠ = ك $\frac{١٠٠ - ٢}{٧}$

فاذا ٢ - ٢ ي او ٤ ي - ٢ يقبل الانقسام على ٧ وان كان ٤ ي - ٢ يقبل الانقسام

اربعة اجوبة فاذا فرض ل = ٠ لناك = ٢ ي = ٧٤ $٢٨ = ١٩ \times ٢$ و $٦٦٢ = ١٢ \times ٧٤$

ل = ١ ك = ١٥ ي = ٥٥ $٢٨٥ = ١٩ \times ١٥$

و $٧١٥ = ١٢ \times ٥٥$

ل = ٢ ك = ٢٨ ر = ٢٦ $٥٢٢ = ١٩ \times ٢٨$

و $٤٦٨ = ١٢ \times ٢٦$

ل = ٣ ك = ٤١ ي = ١٧ $٧٧٩ = ١٩ \times ٤١$ و $٢٢١ = ١٢ \times ١٧$

(مسئلة ٦) رجل انفق ١٧٧٠ ديناراً في شراء خيل وبقر وكان ثمن راس الخيل ٢١ ديناراً وثمان راس البقر ٢١ ديناراً فكم رأساً اشترى من كل جنس لنفرض ك = الخيل وى = البقر فلذا

$٢١ ك + ٢١ ي = ١٧٧٠$ اي $٢١ ي = ١٧٧٠ - ٢١ ك$ $١٧٦٤ = ٢١ ك - ٦$

$١٠ ك - ٨٤ = ي + \frac{١٠ - ٦}{٢١} ك$

فلا بد من ان $١٠ ك - ٦$ يقبل الانقسام على ٢١ وكذلك نصفها اي $٥ ك - ٣$ فلنفرض $٥ ك - ٣ = ٢١ ل$ فلنا $٥ ك = ٢١ ل + ٣$ وبالتعويض $١٠ ك - ٨٤ = ٢١ ل + ٣$ فلنفرض $١٠ ك - ٨٤ = ٢١ ل + ٣$

$١٠ ك - ٨٧ = ٢١ ل$

$١٠ ك - ٨٤ = ٢١ ل + ٣$ اي $١٠ ك - ٨٧ = ٢١ ل$

فلا بد ان تكون ر أكبر من صفرٍ واقل من ٤

فلنفرض $ر = ١$ فلنا $ك = ٩$ ي = ٧١ $٢٧٩ =$ ثمن الخيل و $١٤٩١ =$ ثمن البقر

$ر = ٢$ فلنا $ك = ٣٠$ ي = ٤٠ $٩٣٠ =$ ثمن الخيل $٨٤٠ =$ ثمن البقر

$ر = ٣$ ك = ٥١ ي = ٩ $١٥٨١ =$ ثمن الخيل $١٨٩ =$ ثمن البقر

٢٦٥ في المسائل المتقدم ذكرها كانت المعادلات على هيئة $ت ك + ب ي = س$ وكانت $ت$ وب وس كميات ايجابية صحيحة. وقيمة $ك$ وى كذلك. ولكن

ان كانت ب سلبية والمعادلة على هيئة ت ك - ب ي = س تكون المسائل من نوع اخر غير المتقدمة ولها اجوبة كثيرة الى ما لا نهاية له. ومثاله لو قيل اي عدد ين فضلها ٦

فلو فرضنا اصغرها ك واكبرها ي لكان لنا

ي - ك = ٦ ي = ٦ + ك فيمكننا ان نفرض بآء اي عدد شئنا كما هو واضح من اول نظري

٢٦٦ متى كان س = ٠ تكون ت ك = ب ي

كما لو قيل نريد عدداً يقبل الانقسام على ٥ وعلى ٧

ولنفرضه ن فلنا ن = ٥ ك ون = ٧ ي وه ك = ٧ ي ك = $\frac{٧ ي}{٥}$ فلان

٧ لا يقبل الانقسام على ٥ فلا بد ان ي يقبل الانقسام عليها. فلنفرض ي = ٥ ل فاذا

ك = ٧ ل فتكون ن = ٣٥ ل ويمكننا ان نفرض ل اي عدد شئنا. فلنا ٢٥

٧٠ ١٠٥ ١٤٠ ١٧٥ ٢١٠ الى اخره

ولو زيد على الشروط المذكورة ان العدد يقبل الانقسام على ٩ ايضاً لكان لنا

ما تقدم ن = ٣٥ ل ولنفرض ن = ٩ ر ل = ٣٥ ر ٩ = ر $\frac{٣٥ ل}{٩}$ ولا بد

ان ل يقبل الانقسام على ٩ فلنفرض ل = ٩ س فلنا ر = ٣٥ س ون =

٩ × ٣٥ س = ٣١٥ س فلنا ٣١٥ و ٦٣٠ و ٩٤٥ الى اخره

٢٦٧ ان لم تكن س = ٠ فتعسر المسئلة اكثر فلو قيل ما العدد الذي

يقبل الانقسام على ٥ واذا انقسم على ٧ بقي ٢ فلنا ٥ ك = ن و ٧ ي + ٢ = ن فاذا

٥ ك = ٧ ي + ٢ $\frac{٢ + ٧ ي}{٥} = ك$ $\frac{٢ + ٧ ي + ٥}{٥} = ك$

ي + $\frac{٢ + ٧ ي}{٥}$ فلنفرض ٢ + ٧ ي = ٥ ل

ل = $\frac{٢ + ٧ ي}{٥}$ فاذا ك = ي + ل = ٢ + ٧ ي = ٥ ل

$\frac{٢ - ل}{٢} + ل = \frac{٢ - ل}{٢}$ ولنفرض ل = ٢ = ٢ ر فاذا ل

٢ + ٢ ر = ٥ ٦ + ر = ٥

$$ك = ي + ل = (٥ + ر٦) + (٢ + ر٣) = ٧ + ر٩$$

فإذا $ن = ٣٥ + ر٤٥$ فيمكن ان نفرض ر اي عدد صحيح شيئاً ايجابياً
 او سلبياً اذ يكفي ان تكون ن ايجابية. فان فرض $ر = -١$ لنا $ن = ١٠$
 وبإضافة ٢٥ لنا ٤٥ ٨٠ ١١٥ ١٥٠ الى اخره

ثم ان حل مسائل من هذا النوع يتيسر او يتعسر حسب النسبة الواقعة بين
 الاعداد المقسوم عليها ومن المسائل السهلة هذه

اي عدد اذا انقسم على ٦ يبقى ٢ واذا انقسم على ١٢ يبقى ٢ فلنفرض العدد
 ن فلنا

$$ن = ٦ + ك٢ = ١٢ + ي٢ = ٢ + ك٦ = ١٢ + ي٢ = ٢ + ك٦ = ٦ + ك١٢ = ١٢ + ي٢$$

$$ك = \frac{١٢ + ي١}{٦} = ٢ + \frac{ي١}{٦} \text{ لنفرض } ي = ١ + ٦ = ٧$$

$$ي = ٦ - ل = ١ - ك = ٢ + ي١ = ١٢ - ل٢$$

$$ن = ١٠ - ٧٨ = ١٠$$

$$ن = ٦٨ = ١٤٦ = ٢٢٤ = ٣٠٢ = ٣٨٠ \text{ الى اخره}$$

(مسئلة ٨) اي عدد ن اذا انقسم على ٢٩ يبقى ١٦ واذا انقسم على ٥٦ يبقى ٢٧

$$\text{لنفرض } ن = ٢٩ + ف١٦ = ٥٦ + ق٢٧$$

$$٢٩ + ف١٦ = ٥٦ + ق٢٧ = ١١ + ق٥٦ = ٢٩ + ف٢٩$$

$$ف = \frac{١١ + ق٥٦}{٢٩} = ق + \frac{١٧ + ق١١}{٢٩} \text{ افرض } \frac{١٧ + ق١١}{٢٩}$$

$$= ر \text{ ثم } ٢٩ + ر١٧ = ١١ + ق١١ = \frac{١١ - ر٢٩}{١٧} + ر٢ = \frac{١١ - ر٥}{١٧}$$

$$\text{افرض } \frac{١١ - ر٥}{١٧} = س١٧ \text{ ثم } ١٧ - ر٥ = ١١ - ر$$

$$\frac{١١ + س١٧}{٥} + ٢ = \frac{١١ + س٢}{٥}$$

$$\text{افرض } \frac{١١ + س٢}{٥} = ت٥ = ١١ + س٢$$

$$س = \frac{١١ - ت٥}{٢} + ت٢ = \frac{١١ - ت٥}{٢}$$

$$\text{افرض } \frac{11-ت}{٣} = د \quad ت = 11 + د٢$$

فقد خلصنا من الكسور ولنعوّض عن كل كمية بقيمتها

$$ت = 11 + د٢$$

$$س = ٢٢ + د٥$$

$$ر = ٧٧ + د١٧$$

$$ق = ١٧٦ + د٢٩$$

$$ف = ٢٥٢ + د٥٦$$

$$ن = ٩٨٨٢ + د٥٦ \times ٢٩ = ١٦ + (٢٥٢ \times ٢٩) + د٥٦ \times ٢٩$$

$$\text{ون} = ٩٨٨٢ + د٢٩ \times ٥٦ = ٢٧ + (١٧٦ \times ٥٦) + د٢٩ \times ٥٦$$

$$\text{اي ن} = ٢١٨٤ + د٢١٨٤ + ٩٨٨٢ \text{ و} \frac{٩٨٨٢}{٢١٨٤} = ٤ + \text{فلا تكون د اقل}$$

من - ٤ وعلى هذا المفروض لنا ن = ١١٤٧ وان فرضنا د = ك - ٤ فلنا ن =

٢١٨٤ ك + ١١٤٧ وها على سلسلة حسابية الحلقة الاولى منها ١١٤٧ وفضلها

المشترك ٢١٨٤ فلنا ١١٤٧ و ٢٢٣١ و ٥٥١٥ و ٧٦٩٩ و ٩٨٨٢ الى اخره

(مسئلة ٩) رجال ونساء جمعوا صدقة فدفع كل رجل ٢٥ غرشاً وكل امرأة

١٦ غرشاً. فكان ما دفعه النساء جميعهن اكثر مما دفعه الرجال جميعهم بغرش

واحد. فكم رجلاً وكم امرأة كانوا

لنفرض الرجال ق والنساء ف فلنا

$$١٦ ف = ٢٥ ق + ١ \quad \frac{١ + ق٩}{١٦} + ق = \frac{١ + ق٢٥}{١٦} = ف$$

$$ق + ٩ ق = ١٦ ر \quad ق + ٩ ق = ١٦ ر$$

$$ق = \frac{١ - ر١٦}{٩} + ر = \frac{١ - ر٧}{٩} + ر \quad ٩ س = ٧ - ر$$

$$ر = \frac{١ + س٩}{٧} + س = \frac{١ + س٢}{٧} + س \quad ٧ ت = ٢ + س$$

$$س = \frac{٧ - ت٧}{٣} + ت = \frac{١ - ت}{٣} + ت = ٢ + ت$$

باخراج ٢ ت من الجانين لنا ٢ = د - ت - ١

ت = د + ١ ثم بالتعويض في هذه المعادلات

ت = د + ١ س = ٢ ت + د = ٢ + د + ١

ر = س + ت = ٤ + د + ١

ق = ر + س = ٧ + د + ١٦

ف = ق + ر = ١١ + د + ٢٥

فكان عدد النساء ١١ + د + ٢٥ وعدد الرجال ٧ + د + ١٦ فنفرض د أي عدد صحيح شيئاً فلنا الرجال = ٧ ٢٢ ٢٩ ٥٥ ٧١ الى اخره والنساء ١١ ٢٦ ٦١ ٨٦ ١١١ الى اخره

وعلى موجب الجواب الاول دفعت النساء ١٧٦ والرجال ١٧٥ غرشاً

(مسئلة ١٠) رجل اشترى خيلاً وبقراً وكان ثمن راس الخيل ٢١ ديناراً وثمان راس البقر ٢٠ ديناراً فكان ثمن البقر بقدر ثمن الخيل و٧ دنانير زيادة فكم رأساً اشترى من كل جنس

لنفرض ف = البقر وق = الخيل فلنا

$$ف = \frac{٢١ + ق}{٢} = ق + \frac{١١ + ق}{٢} \Rightarrow ق = ٢٠ \quad ر + ق = ٢٠$$

١١ + ق = ٧

$$ق = \frac{٧ - ر}{١١} + ر = \frac{٧ - ر + ١١ر}{١١} \Rightarrow ٧ - ر = ١١س$$

$$ر = \frac{٧ + ١١س}{٩} = س + \frac{٧ + ٢س}{٩} \Rightarrow ٩ = ت + س$$

٢س + ٧

$$س = \frac{٩ - ت}{٢} = ت + \frac{٧ - ت}{٢} \Rightarrow ٢ = د + ت$$

٧ - فلنا ت = د + ٢

$$س = ٤ + د = ٢٨ + د$$

$$ر = س + ت = ٣٥ + د$$

$$ق + ر = س = ٦٢ + ٥٢٠ =$$

$$ف = ق + ر = ٩٨ + ٥٢١ =$$

ونجد قيمة ف وق الصغرى اذا فرضنا $د = -٢$

$$\text{فلنا البقر} = ٥ \quad ٢٦ \quad ٦٧ \quad ٩٨ \quad ١٢٩ \quad ١٦٠ \text{ الى اخره}$$

$$\text{فلنا الخيل} = ٢ \quad ٢٢ \quad ٤٢ \quad ٦٢ \quad ٨٢ \quad ١٠٢ \text{ الى اخره}$$

(مسئلة ١١) اي عدد اذا انقسم على ١١ يبقى ٣ واذا انقسم على ١٩ يبقى ٥

$$\text{لنفرض } ن = ١١ف + ٢ \quad ن = ١٩ق + ٥ \quad ١١ف = ١٩ق + ٢$$

فاذا تصرفنا في هذه المسئلة على نسق المسائل المتقدم ذكرها يكون لنا مجمل

الاعداد الواقعة فيها

$$٨ + ١١ \times ١ = ١٩ \quad ف + ق = ر$$

$$٢ + ٨ \times ١ = ١١ \quad ق + ر = س$$

$$٢ + ٢ \times ٢ = ٨ \quad ر = ٢س + ت$$

$$١ + ٢ \times ١ = ٢ \quad س + ت = د$$

$$٠ + ١ \times ٢ = ٢ \quad ت + د = ٢$$

$$\text{ثم لنا } ت = ٢ + د = ٢ \quad س + د = ٢$$

$$٦ + د = ٨ \quad ق + د = ٨$$

$$١٤ + د = ١٩ \quad \text{لنفرض } د = ٠$$

فلنا $ن = ١١ف + ٢ = ١١(١٩ + د) + ٢ = ١٠٧ + د٢٠٩$ ولكن

$٠ = د٢٠٩$ فاذا ١٠٧ هو اقل عدد تصح عليه شروط المسئلة

(مسئلة ١٢) ما العدد الذي اذا انقسم على ١١ يبقى ٣ واذا انقسم على ١٩

يبقى ٥ واذا انقسم على ٢٩ يبقى ١٠

قدمى حساب الشرطين الاولين في المسئلة السابقة فلنا هنا زيادة عما هناك

$$ن = ٢٩ف + ١٠ \quad \text{وقد وجدنا هناك ان}$$

$$ن = ١٠٧ + د٢٠٩ \quad \text{لنفرض هنا } ن = ٢٠٩ق + ١٠٧$$

$$\text{فلنا } ٢٩ف + ١٠ = ٢٠٩ق + ١٠٧ \quad \text{اي}$$

$$٢٩ف = ٢٠٩ق + ١٤٧ \quad \text{ثم لنا حسبنا تقدم}$$

$$\begin{aligned} 6 + 29 \times 7 &= 209 & \text{ف} &= 7 \text{ ق} + \text{ر} \\ 0 + 6 \times 4 &= 24 & \text{ق} &= 4 \text{ ر} + \text{س} \\ 1 + 0 \times 1 &= 6 & \text{ر} &= \text{س} + \text{ت} \\ 0 + 1 \times 0 &= 0 & \text{س} &= 0 \text{ ت} - 147 \end{aligned}$$

ثم بالتعويض س = ٥ ت - ١٤٧

$$\text{ر} = 6 \text{ ت} - 147 \quad \text{ق} = 29 \text{ ت} - 720$$

$$\text{ف} = 209 \text{ ت} - 0292$$

ن = ٦٠٦١ ت - ١٥٢٤٥٨ ونجد العدد الاقل

اذا فرضنا ت = ٢٦ ثم ن = ٤١٢٨

(مسئلة ١٣) على كم طريقة يمكن دفع ١٠٠ غرش في بشالك بسعر ٥ غروش

وانصاف المانوت بسعر ٩ غروش

لفرض ٥ ك = البشالك ٩ ي = ٥ انصاف المانوت

$$٥ ك + ٩ ي = ١٠٠ \quad ٥ ك = ١٠٠ - ٩ ي$$

$$٢٠ = ٥ ي - \frac{٤ ي}{٥}$$

فاذا ي تقبل الانقسام على ٥ فلنفرض $\frac{٥ ي}{٥} = \text{ف}$ ف ي = ٥ ف ك = ٢٠

$$٥ ف - ٤ = ٢٠ - ٩ ف \quad \text{فاذا تكون ف اقل من } \frac{٢٠}{٩} \text{ ابي اقل من } ٢$$

واكثر من صفراي ١ فلنفرض ف = ١ فاذا ك = ١١ ١١ = ٥ × ١١ = ٥٥

$$٥ = ٥ \text{ و } ٥ = ٩ \times ٥ = ٤٥ \text{ و } ٤٥ = ٥٥ + ١٠٠ = ١٠٠ \text{ ابي ليس لذلك الا}$$

طريقة واحدة

(مسئلة ١٤) على كم طريقة يمكن دفع ١٠٠ غرش غوازي بسعر ٢٠ غرشاً

وفرنكات بسعر ٤ غروش. لنفرض الغوازي = ٢٠ ك والفرنكات = ٤ ي

$$٢٠ ك + ٤ ي = ١٠٠ \quad ٤ ي = ١٠٠ - ٢٠ ك$$

$$٥ = ٢٥ - ٥ ك \quad \text{لنفرض } ٢٥ - ٥ ك = \text{ف} \text{ ثم}$$

$$٥ ك = ٢٥ - \text{ف} \quad ٥ = \frac{\text{ف}}{٥} \quad \text{لنفرض ف} = ٥ د \quad ٥ = ٥ - د$$

٥ = د فلا بد ان تكون د اكثر من صفر واقل من ٥ اي للمسئلة اربعة اجوبة.
فعلى فرض

$$1 = د \quad 4 = ك \quad ٥ = ي \quad اي \quad 100 = 20 + 80$$

$$2 = د \quad 3 = ك \quad 10 = ي \quad اي \quad 100 = 40 + 60$$

$$3 = د \quad 2 = ك \quad 15 = ي \quad اي \quad 100 = 60 + 40$$

$$4 = د \quad 1 = ك \quad 20 = ي \quad اي \quad 100 = 80 + 20$$

(مسئلة ١٥) ثلثون نفرا من رجال ونساء واولاد اتفقوا ٥٠ دينارا وكل رجل منهم اتفق ٢ دنانير وكل امرأة دينارين وكل ولد دينارا واحدا. فكم كان كل فريق

لفرض الرجال = ف والنساء = ق والاولاد = ر

$$فلنا (١) \quad ف + ق + ر = 20$$

$$وايضاً (٢) \quad ٢ف + ٢ق + ر = 50$$

$$من الاولى لنا ر = 20 - ف - ق$$

$$فترى ان ف + ق اقل من 20$$

$$وبالتعويض في (٢) \quad ٢ف + ٢ق + 20 - ف - ق = 50$$

$$بالمقابلة والجمع \quad ق = 20 - ٢ف$$

$$بنقل ف واحدة \quad ق + ٢٠ = ٢ف$$

وذلك ايضا اقل من 20 فبشروط المسئلة لا تكون ف اكثر من 10 ويمكن

ان نفرض ف اي عدد شينا من 1 الى 9 فلنا

$$ف = 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9$$

$$ق = 18 \quad 16 \quad 14 \quad 12 \quad 10 \quad 8 \quad 6 \quad 4 \quad 2$$

$$ر = 11 \quad 12 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 18 \quad 19$$

(مسئلة ١٦) رجل اشترى من البقر والمعزى والغنم 100 راس بمائة دينار

وكان ثمن الراس من البقر $\frac{1}{3}$ دينار وثمان الراس من المعزى $\frac{1}{4}$ دينار وثمان الراس

من الغنم $\frac{1}{5}$ دينار. فكم راسا اشترى من كل جنس

لفرض ف = البقر ق = المعزى و ر = الغنم

فلنا (١) $f + q + r = 100$

(٢) $100 = r \frac{1}{3} + q \frac{1}{3} + f \frac{2}{3}$

اضرب في ٦ $600 = r \cdot 2 + q \cdot 8 + f \cdot 21$

بالاولى لنا $r = 100 - f - q$

عوضاً عن ر في (٢) $200 = q \cdot 5 + f \cdot 18$

$5 = q \cdot 18 - 200 = q \cdot \frac{18}{5} - 60$

فلا بد ان f تقبل الانقسام على ٥ فلنفرض $f = 5s$ فلنا $q = 60 - 18s$

١٨ س

$r = 100 - 5s + 18s = 100 + 13s$ فيمكن ان نفرض قيمة s اي عددٍ شئنا على شرط ان q

لا تصير بذلك سلبية فلا يمكن ذلك الا على فرض s اقل من ٤

فلنا $s = 1 \quad 2 \quad 3$

$f = 5 \quad 10 \quad 15$

$q = 6 \quad 24 \quad 42$

$r = 79 \quad 66 \quad 52$

٢٦٧ في اختراع مسائل من هذا الباب ينبغي الاحتراس من استحاليتها. ولا

بد في ذلك من ملاحظة ما سنذكره هنا. فنضع عوض المعادلتين اللتين في المسئلة

السابقة هاتين $k + y + l = t$

$f + k + y + g + h = b$

حيث تكون f, g, h, t, b معلومات

فان فرضنا f اكبر من g وح اصغر من g وضرينا الجانبين في f اي

$(k + y + l) \cdot f = f \cdot t$ فلا شك ان تكون $f + k + y + l > f$ ل اكبر

من $f + k + y + g + h$ وتكون $f + t$ اكبر من b اي $b < f + t$ وايضاً اذا

فرضنا $(k + y + l) < f$ = $h + t$ تكون $h + k + y + g + h < f + t$ اصغر من $f + k$

$+ g + h + l$ وتكون $h + t$ اصغر من b اي $b < h + t$ فاذا ان لم تكن b

اصغر من $f + t$ واكبر من $h + t$ تستحيل المسئلة فاذاً يجب ان نفع b بين الحدين

$f + t$ و $h + t$ ولا يجب ان تكون قريبة جداً من احدها والا فلا يمكن استعمال

الاحرف الأخر في المسئلة السابقة ت = ١٠٠ ف = $\frac{٣}{١}$ ح = $\frac{١}{١}$ والمحلان
ها ٢٥٠ و ٥٠ وان فرضنا ب = ٥١ عوض ١٠٠ كما في المسئلة فلنا
ك + ي + ل = ١٠٠

$$\frac{١}{٢} ك + \frac{١}{٢} ي + \frac{١}{٢} ل = ٥١ \quad \text{اضرب الاولى في ٢}$$

$$٢ ك + ٢ ي + ٢ ل = ٢٠٠ \quad \text{اضرب الثانية في ٦}$$

$$٢١ ك + ٨ ي + ٢ ل = ٢٠٦$$

$$\text{بالطرح } ١٨ ك + ٥ ي = ٦$$

وذاك محال لانه يفرض كون ك و ي صحيحين

(مسئلة ١٧) صابغ عنه من الفضة ثلاثة انواع

الاول في كل ٨ دراهم منه ٧ فضة ودرهم زيف

الثاني . . . $\frac{٥}{٢}$. . .

الثالث . . . $\frac{٤}{٢}$. . .

فاراد ان بصوغ مصاغاً وزنه ٢٤٠ درهماً في كل ٨ دراهم منه ٦ دراهم فضة
ودرهمان زيف فكم درهماً يجب ان ياخذ من كل صنف

لفرض ما يجب اخذهُ من النوع الاول = ك ومن الثاني = ي ومن الثالث

$$ل فلنا ك + ي + ل = ٢٤٠ ويكون في الكل ٧ ك + $\frac{٥}{٢}$ ي + $\frac{٤}{٢}$ ل$$

من الفضة الخالصة ووزن هذا المزيج = ٢٤٠ درهماً و $\frac{٢٤٠}{٨} = ٣٠$

$$\text{و } ٢٠ \times ٦ = ١٨٠ = \text{الفضة الخالصة في المزيج}$$

$$\text{فلنا } ١٨٠ = ٧ ك + \frac{٥}{٢} ي + \frac{٤}{٢} ل$$

$$\text{اضرب في ٢ } ١٤ ك + ١١ ي + ٤ ل = ٣٦٠$$

$$\text{اضرب الاولى في ٢ } ١٤ ك + ١١ ي + ٤ ل = ٣٦٠$$

$$\text{بالطرح } ٥ ك + ٢ ي = ٩٠$$

$$\text{من الاولى } ٣٠ - ك = ي$$

$$\text{وايضاً } ٢٠ - ٩٠ = ك \quad ٥ ك - ٤٥ = ي$$

لنفرض ك = ٢ د فلنا $٥٠ - ٤٥ = ي$

وايضاً $١٥ - د٢ = ل$

فلابد ان تكون د اكبر من ٤ واصغر من ١٠ فلنا

٩	٨	٧	٦	٥ = د
١٨	١٦	١٤	١٢	ك = ١٠
.	٥	١٠	١٥	ي = ٢٠
١٢	٩	٦	٣	ل = ٠

(مسئلة ١٨) رجل اشترى من الخيل والبقر والحجير والغنم ١٠٠ رأس بمائة دينار وكان ثمن رأس الخيل ١٠ دنانير وثمانين رأس البقر ٥ دنانير وثمانين الحمار دينارين وثمانين رأس الغنم نصف دينار فكم اشترى من كل جنس. لنفرض الخيل = ف البقر = ق الحجير = ر والغنم = س

فلنا (١) $١٠٠ = س + ر + ق + ف$

و (٢) $١٠٠ = ف + ٥ ق + ٢ ر + \frac{١}{٣} س$

اضرب في ٢ $٢٠٠ = ٢ ف + ١٠ ق + ٤ ر + س$

بالطرح $١٠٠ = ١٩ ف + ٩ ق + ٢ ر$

بالمقابلة والتقسمة $٢٣ = ر + \frac{١}{٣} ف - ٦ ف - \frac{١}{٣} ف - ٢ ق$ اي

$$٢٣ = ر - ٦ ف - ٢ ق + \frac{١ - ف}{٣}$$

فاذا $١ - ف$ او $١ - ف$ يقبل الانقسام على ٣

لنفرض $١ - ف = ٣ ت$ $٢ = ٣ ت + ١$ $ق = ٣ ر - ٢٧ - ١٩ ت$

$٣ - ق = ٣ س = ٧٢ + ٢ ق + ١٦ ت$

فاذا تكون $١٩ ت - ٢ ق$ اقل من ٢٧ وعلى هذا الشرط نفرض ك و ت

اي عدد شيناً

(١) $٠ = ت$ (٢) $١ = ت$

$٤ = ف$ $١ = ف$

$ق = ق$ $ق = ق$

$$ر = ٢ - ٨ = ٢$$

$$ر = ٢ - ٢٧ = ٢$$

$$س = ٢ + ١١٨ = ٢$$

$$س = ٢ + ٧٢ = ٢$$

ولا يمكن ان نفرض ت = ٢ لان بذلك نصير رسليية. وعلى المفروض الاول لانكون ق اكثر من ٩ وعلى الثاني لانكون اكثر من ٢ فعلى الاول لنا

$$ق = ١ \quad ٢ \quad ٣ \quad ٤ \quad ٥ \quad ٦ \quad ٧ \quad ٨ \quad ٩ \quad ١٠$$

$$ف = ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١ \quad ١$$

$$ق = ٠ \quad ١ \quad ٢ \quad ٣ \quad ٤ \quad ٥ \quad ٦ \quad ٧ \quad ٨ \quad ٩$$

$$ر = ٢٧ \quad ٢٤ \quad ٢١ \quad ١٨ \quad ١٥ \quad ١٢ \quad ٩ \quad ٦ \quad ٣ \quad ٠$$

$$س = ٧٢ \quad ٧٤ \quad ٧٦ \quad ٧٨ \quad ٨٠ \quad ٨٢ \quad ٨٤ \quad ٨٦ \quad ٨٨ \quad ٩٠$$

$$وعلى الثاني ت = ١ \quad ٢ \quad ٣$$

$$ف = ٤ \quad ٤ \quad ٤$$

$$ق = ٠ \quad ١ \quad ٢$$

$$ر = ٨ \quad ٥ \quad ٢$$

$$س = ٨٨ \quad ٩٠ \quad ٩٢$$

(مسئلة ١٩) مطلوب ثلثة اعداد صحيحة اذا ضرب الاول منها في ٣ والثاني

في ٥ والثالث في ٧ يكون مجموع الحواصل ٥٦٠. واذا ضرب الاول في ٩ والثاني

في ٢٥ والثالث في ٤٩ يكون مجموع الحواصل ٢٩٢٠

$$\text{لنفرض (١) } ٣ك + ٥ي + ٧ل = ٥٦٠$$

$$\text{(٢) } ٩ك + ٢٥ي + ٤٩ل = ٢٩٢٠$$

$$\text{اضرب الاولى في ٣ } ٩ك + ١٥ي + ٢١ل = ١٦٨٠$$

$$\text{بالطرح } ١٠ي + ٢٨ل = ١٢٤٠$$

$$\text{بالقسمة على ٢ } ٥ي + ١٤ل = ٦٢٠$$

$$\text{وبالمقابلة والقسمة } ٥ي = ١٢٤ - \frac{١٤ل}{٥}$$

$$\text{لنفرض ل = ٥ د فاذا } ٥ي = ١٢٤ - ١٤د$$

$$\text{ثم بالتعويض في الاول لنا } ٣ك - ٢٥د + ٦٢٠ = ٥٦٠$$

$$\text{اي } ٣ك - ٢٥د = ٦٠$$

ك = $\frac{20}{3} - 20$ فلنفرض د = ٢ ت

فإذا ك = ٢٥ ت - ٢٠ ي = ١٢٤ - ٤٢ ت. ل = ١٥ ت فتكون
ت أكبر من صفر واصغر من ٢ ولنا جوابان فقط اي

ت = ١ ك = ١٥ ي = ٨٢ ل = ١٥

ت = ٢ ك = ٥٠ ي = ٤٠ ل = ٢٠

(مسئلة ٢٠) مطلوب عدنان مجتمعهما مع حاصلهما ٧٩

لنفرض العددين ك وى فلنا ك + ي + ك = ٧٩ ك + ي = ٧٩

ك - ي = $\frac{٧٩ - ك}{١ + ك} - ١ = \frac{٨٠}{١ + ك}$ فنرى ان ٨٠ يقبل

الانقسام على ١ + ك و ٨٠ يقبل الانقسام على ١ ٢ ٤ ٥ ٨ ١٠ ١٦
٢٠ ٤٠ ٨٠

فإذا ك = ٠ ١ ٢ ٤ ٧ ٩ ١٥ ١٩ ٢٩ ٧٩

ي = ٧٩ ٢٩ ١٩ ١٥ ٩ ٧ ٤ ٣ ١ ٠

ومن هذ العشرة الخمسة الاخيرة مثل الخمسة الاولى. فلنا في الحقيقة ٥ اجوبة

فقط وهي

ك = ٠ ١ ٢ ٤ ٧

ي = ٧٩ ٢٩ ١٩ ١٥ ٩

(مسئلة ٢١) اربعة رجال نزلوا الى السوق فوجدوا جوهرة تباع. فقالوا كم

ثمن الجوهرة فقيل اذا اخذ ما مع الاول منكم مع $\frac{1}{3}$ ما مع الثاني و $\frac{1}{4}$ ما

مع الثالث و $\frac{1}{5}$ ما مع الرابع كان المجتمع ثمن الجوهرة. واذا اخذ ما مع

الثاني و $\frac{1}{6}$ ما مع الاول و $\frac{1}{7}$ ما مع الثالث و $\frac{1}{8}$ ما مع الرابع كان المجتمع ثمن

الجوهرة. واذا اخذ ما مع الثالث مع $\frac{1}{8}$ ما مع الاول و $\frac{1}{9}$ ما مع الثاني

و $\frac{1}{10}$ ما مع الرابع كان المجتمع ثمن الجوهرة. واذا اخذ ما مع الرابع و $\frac{1}{11}$

مامع الاول و $\frac{1}{13}$ مامع الثاني و $\frac{1}{13}$ مامع الثالث كان المجتمع ثمن الجوهرة

مطلوب اصغر الاعداد الصحيحة التي تصع عليها شروط المسئلة

نرى من شروط المسئلة ان المحصة الصغرى للاول من الاربعة فلنفرض

الرجال ك وى ول ون وثمان الجوهرة ت فلنا

$$ك + \frac{ى}{2} + \frac{ل}{3} + \frac{ن}{4} = ت \quad \frac{١٢ ت - ١٢ ك - ٦ ى - ٤ ل}{٣}$$

$$ى + \frac{ك}{5} + \frac{ل}{6} + \frac{ن}{7} = ت \quad \frac{٢١٠ ت - ٤٢ ك - ٣٥ ل - ٢١٠ ن}{٣٠}$$

$$ل + \frac{ك}{8} + \frac{ى}{9} + \frac{ن}{10} = ت \quad \frac{٢٦٠ ت - ٤٥ ك - ٤٠ ى - ٢٦٠ ن}{٣٦}$$

$$ن + \frac{ك}{11} + \frac{ى}{12} + \frac{ل}{13} = ت \quad \frac{١٧١٦ ت - ١٥٦ ك - ١٤٢ ى - ١٢٢ ل}{١٧١٦}$$

ثم بالمساواة

$$\frac{١٢ ت - ١٢ ك - ٦ ى - ٤ ل}{٣} = \frac{٢١٠ ت - ٤٢ ك - ٣٥ ل - ٢١٠ ن}{٣٠}$$

$$\frac{٢١٠ ت - ٤٢ ك - ٣٥ ل - ٢١٠ ن}{٣٠} = \frac{٢٦٠ ت - ٤٥ ك - ٤٠ ى - ٢٦٠ ن}{٣٦}$$

$$\frac{٢٦٠ ت - ٤٥ ك - ٤٠ ى - ٢٦٠ ن}{٣٦} = \frac{١٧١٦ ت - ١٥٦ ك - ١٤٢ ى - ١٢٢ ل}{١٧١٦}$$

$$\frac{١٥٠ ى - ٧٨ ك - ٩٠ ت}{٥} = ل$$

$$\frac{٥٤٠ ت + ٢٧ ك + ١٠٦ ى}{١٥٩} = ل$$

$$\frac{٤٦٢٢٢ ت - ٥٩٦٧ ك - ٥٢٩١ ى}{٥١٠٨٤} = ل$$

بالمساواة ايضاً

$$\frac{١٥٠ ى - ٧٨ ك - ٩٠ ت}{٥} = \frac{٥٤٠ ت + ٢٧ ك + ١٠٦ ى}{١٥٩}$$

$$\frac{٥٤٠ ت + ٢٧ ك + ١٠٦ ى}{١٥٩} = \frac{٤٦٢٢٢ ت - ٥٩٦٧ ك - ٥٢٩١ ى}{٥١٠٨٤}$$

$$\frac{٢٩١٦ ت + ٢٤٨٢١ ك}{٤٦٦٤} = ى$$

$$\frac{٧٦٨.٤٢٠ \text{ ت} - ١٨١١١٢٣ \text{ ك}}{١.٤٢٦٩٥٥} = \text{ى}$$

بالمساواة ايضاً

$$\frac{٢٩١٦٠ \text{ ت} + ٢٤٨٢١ \text{ ك}}{٤٦٦٤.} = \frac{٧٦٨.٤٢٠ \text{ ت} - ١٨١١١٢٣ \text{ ك}}{١.٤٢٦٩٥٥}$$

$$\frac{٢٤.٧٢٢٢٦. \text{ ت}}{١٥٢٦١٤٦٥.١} = \text{ك}$$

فاذا ت قبل الانقسام على مخرج هذا الكسر. ولكي يكون لنا عدد صحيح يجب ان نفرض ت هذا المخرج ذاته. فلنا ت = ١٥٢٦١٤٦٥.١

$$١٠٨٢٢٢٢٩٨٨ = \text{ى} \quad ٢٤.٧٢٢٢٦. = \text{ك}$$

$$١٢١٨٢٧٨١٨. = \text{ن} \quad ١٢٤٢٩٥٧٨.٦ = \text{ل}$$

$$١٠٨٢٢٢٢٩٨٨ = \text{ى} \quad ٢٤.٧٢٢٢٦. = \text{ك}$$

$$٤٨١٤٦٤٧٢ = \frac{\text{ك}}{٥} \quad ٥٤١١٦٦٩٩٤ = \frac{\text{ى}}{٢}$$

$$٢.٧٢٢٦٢.١ = \frac{\text{ل}}{٦} \quad ٤١٤٦٥٢٦.٢ = \frac{\text{ل}}{٢}$$

$$١٨٨٢٢٩٧٤. = \frac{\text{ن}}{٧} \quad ٢٢٩٥٩٤٥٤٥ = \frac{\text{ن}}{٤}$$

$$\underline{١٥٢٦١٤٦٥.١} \quad \underline{١٥٢٦١٤٦٥.١ = \text{ت}}$$

$$١٢١٨٢٧٨١٨. = \text{ن}$$

$$١٢٤٢٩٥٧٨.٦ = \text{ل}$$

$$٢١٨٨٤٧٦. = \frac{\text{ك}}{١١}$$

$$٢٠٠٩١٥٤٥ = \frac{\text{ك}}{٨}$$

$$٩.١٩٤٤٩٩ = \frac{\text{ى}}{١٢}$$

$$١٢.٢٥٩٢٢٢ = \frac{\text{ى}}{٩}$$

$$٩٥٦٨٩.٦٢ = \frac{\text{ل}}{١٢}$$

$$١٢١٨٢٧٨١٨ = \frac{\text{ن}}{١٠}$$

$$\underline{١٥٢٦١٤٦٥.١}$$

$$\underline{١٥٢٦١٤٦٥.١ = \text{ت}}$$

(مسئلة ٢٢) مطلوب عدنان مربعان يكون مجموعهما مربعاً ايضاً

لنفرض العددين ك^٢ وت^٢ فيكون ك^٢ + ت^٢ مربعاً. وكبنة ك^٢ + ت^٢ هي اكبر من كبنة (ك - ت)^٢ لان هذه الاخيرة = ك^٢ - ٢ ك ت + ت^٢ فلنفرض ك^٢ + ت^٢ = (م - ك - ت)^٢ فلنا ك^٢ + ت^٢ = م^٢ - ٢ م ك + ت^٢ وبالمقابلة

$$ك^٢ = م^٢ - ٢ م ك + ت^٢ \quad م^٢ - ٢ م ك + ت^٢ = م^٢ - ٢ م ك + ت^٢ = م^٢ - ٢ م ك + ت^٢$$

$$ك = \frac{٢ م ت}{١ - ٢ م} \quad \text{فاذا العددان هما } ٢ \text{ و} \left(\frac{٢ م ت}{١ - ٢ م}\right)^٢ \text{ فيمكن ان نفرض } ت$$

وم اي عددين شئنا ولكن لكي يكون $\frac{٢ م ت}{١ - ٢ م}$ صحيحاً ينبغي للصورة ان

تقبل الانقسام على المخرج ويكون الخارج صحيحاً. فان فرض م = ٢ وت =

$$٢ = ٢ \text{ فلنا العددان } ١٦ \text{ و} ٩ \text{ ومجموعهما } ٢٥ \text{ واذا فرض م = ٢ وت =}$$

$$٥ = ٥ \text{ فلنا العددان } \frac{٢٢٥}{١٦} \text{ و} ٢٥ \text{ ومجموعهما } \frac{٦٢٥}{١٦} \text{ واذا فرض م = ٢ وت =}$$

$$\text{وت = } ٨ \text{ فلنا } ٢٦ \text{ و} ٦٤ \text{ ومجموعهما } ١٠٠ \text{ وهلم جرا}$$

(مسئلة ٢٢) مطلوب عددك بحيث يكون ك + ت وك - ت مرتعبن

$$\text{لنفرض } ك + ت = م^٢ \text{ ثم } ك - ت = م - ٢ م$$

$$\text{افرض } م - ٢ م = ت = (م - ت) = م - ٢ م = م - ٢ م = م - ٢ م = ت = ٢ - ٢ م$$

$$م + ت = ٢ \text{ او } ٢ م = ت + ٢ م = م + ٢ م = م + ٢ م = م + ٢ م = م + ٢ م = م + ٢ م$$

$$\text{وك} = م - ٢ م = ت = \frac{٢ + ت}{٢} = م \quad \frac{٢ + ت}{٢} = م \quad \frac{٢ + ت}{٢} = م \quad \frac{٢ + ت}{٢} = م$$

القضية العمومية هي اذا رُبع عدد و اضيف الى مربعه ٤ واقسم المجمع على ٤ يكون الخارج عدداً مجموعته مع العدد المفروض وفضلتها عددان مربعان. فاذا فرضنا

$$ت = ١ \text{ لنا } ك = \frac{٤ + ت}{٤} = \frac{٥}{٤} \quad ك + ت = ١ + \frac{٥}{٤} = \frac{٩}{٤}$$

$$ك - ت = ١ - \frac{٥}{٤} = \frac{١}{٤}$$

$$ت = ٢ = ٢ \text{ ثم } ك = \frac{٤ + ٢}{٤} = \frac{٦}{٤} = \frac{٣}{٢} \quad ك + ت = ٤ = ٤ \quad ك - ت = ٠ = ٠$$

$$\frac{٢٥}{٤} = ٣ + \frac{١٢}{٤} = ت + ك \quad \frac{١٢}{٤} = \frac{٤+٩}{٤} = ك \quad ت = ٢$$

$$ك - ت = \frac{١}{٤} = ٣ - \frac{١٢}{٤}$$

$$ت = ٤ = ك \quad ٥ = \frac{٤+١٦}{٤} = ك + ت = ٩ = ك - ت$$

ت = ١ وهلم جرّاً

(مسئلة ٢٤) لنا ان نجد ثلاثة اعداد مربعة على سلسلة حسابية

لنفرض الاعداد ك' وى' ول' ثم ك' + ل' = ٢ اى' افرض ك = ف + ق ول = ف - ق ثم ك' + ل' = ٢ ف' + ٢ ق' = ٢ اى'

ف' + ق' = ٢ اى' فنحول المسئلة الى نوع مسئلة ٢٢ فلنفرض ف =

$$\frac{٢٢}{١-٢} ت حيث ق = ت$$

$$ثم ك = ف + ق = ت + \frac{٢٢}{١-٢} ت$$

$$ل = ف - ق = ت - \frac{٢٢}{١-٢} ت$$

$$٢ = ٢ ف' + ٢ ق' = \frac{ت(٢+٢)}{١-٢}$$

فيمكن ان نفرض ت وم اى عدد شنا

لنفرض ت = ٢ و ٢ = ٢ ثم ك = ٧ و ٥ = ٢ اى' ول = ١ والاعداد

المطلوبة هي ٤٩ ٢٥ ١

افرض ت = ٨ م = ٢ ثم ك = ١٤ و ١٠ = ٢ اى' ول = ٢ والاعداد

هي ١٩٦ ١٠٠ ٤

(مسئلة ٢٥) مفروض ٢٤ = ك + ١٢ اى' ١٦ فاى قيمة ك وى صحيحة

الجواب ك = ٥ و ٨ = ١٦

(٢٦) مفروض ٨٧ ك + ٢٥٦ اى' ١٠٤١٠ مطلوب قيمة ك الصغرى

وقيمة كبرى في صحيح الجواب ك = ٢٠ و ١٢٨٠٠ = ١٠٤١٠

(٢٧) كم قيمة صحيحة للاحرف في $٥ ك + ٧ ي + ١١ ل = ٢٢٤$

الجواب ٦٠

(٢٨) رجل اشترى ٢٠ طائراً بعشرين غرشاً اي اوزاً بسعر الطير باربعة

غروش وحمائماً بسعر الطير نصف غرش وعصافير بسعر الطير $\frac{1}{4}$ غرش فكم اشترى

من كل جنس الجواب اوز ٢ حمام ١٥ عصافير ٢

(٢٩) ما هو العدد الاصغر الذي يقبل الانقسام على الاعداد الطبيعية من

١ الى ٩ بدون باقٍ الجواب ٢٥٢٠

تنبيه . هذا الباب واسع جداً ويمكن الامتداد فيه الى ما لا نهاية له . وقد اكتبنا

بما ذكرناه طلب الاختصار . ولا يمكن وضع قواعد خصوصية لكثير من مسائله وما

نقدم شرحه كافٍ للدلالة على الحيل التي يستعان بها في حل عتق




الفصل الرابع والعشرون

في استعمال الجبر في مسائل هندسية

٢٦٨ قد يمكن ان نكتب البراهين الهندسية في عبارات جبرية . مثاله في

ان الزوايا الثلاث من كل مثلث تعدل قائمتين



(١) حسب اقليدس (ق ٢٩ ك ١) $ي ب = د ب = ا س$

(٢) $و س ب ي = ا س ب$

(٣) بالجمع $ي ب د + د س ب ي = ا س ب + ا س ب$

(٤) اضع ا ب س للجانبين فتصير $س ب د + د ا ب س = ا س ب + ا س ب$


ا س ب + ا ب س

(٥) حسب اقليدس (ق ١٣ ك ١) $s \cdot b + d \cdot a = s^2$ غ ح ر


(٦) بمساواة (٤) و(٥) $b \cdot a + s + a \cdot s + b = s^2$ غ ح ر اي

قائمتين

٢٦٩ تُعرف مساحة معين بضرب القاعدة في العمود عليها. مثالة في شكل




اب ن م تكون مساحته $a \cdot b \times b \cdot s$ او $m \cdot a \times d$
 لان $a \cdot b \times b \cdot s =$ مساحة شكل س ا وحسب
 اقليدس (ق ٢٦ ك ١) اشكال متوازية الاضلاع على
 قواعد متساوية وبين خطين متوازيين هي متساوية اي
 $s = m$




٢٧٠ نعرف مساحة المربع بضرب احد اضلاعه في نفسه. مثالة مساحة المربع $a \cdot b = s \cdot d$ لانه $=$
 $a \cdot b \times s = b \cdot s = a \cdot b$

٢٧١ مساحة المثلث هي نصف حاصل القاعدة في علو المثلث. مثالة مساحة



مثلث ا ب غ = نصف $a \cdot b \times s$ او $\frac{1}{2} a \cdot b \times s$
 $\times b \cdot s$ او ح غ لان شكل ا ب س د = $a \cdot b \times d$
 ب س وحسب اقليدس ق ٤١ ك ١ ان كان مثلث
 وشكل متوازي الاضلاع على قاعدة واحدة وبين خطين

متوازيين فيكون المثلث نصف الشكل. وعلى هذا القياس لنا عبارة جبرية دالة على
 مساحة اي شكل فُرض اضلاعه مستقيمة. لان كل شكل نظير ذلك يمكن انقسامه




الى مثلثات. مثاله في شكل ا ب س د ي فيه
 مثلثات ا ب س ا س ي س د ومساحة ا ب س
 $= \frac{1}{2} a \cdot s \times b \cdot l$ ومساحة ا س ي = $\frac{1}{2} a \cdot s \times s$
 $ح ي و ي س د = \frac{1}{2} ي س \times د غ$ وكل الشكل

$$= (\frac{1}{2} اس \times بل) + (\frac{1}{2} اس \times ح ي) + (\frac{1}{2} ي س \times دغ)$$

٢٧٢ نحتاج أحياناً ان نعكس هذا العمل وان نستعمل اضلاع شكل من مساحته . فيعرف طول مستطيل من قسمة المساحة على عرضه . مثالة ان فرض


مساحة دب = ك فضع اد = $\frac{ك}{س}$ ويؤخذ
 ضلع مربع باخذ الجذر المالمى من مساحته .



وتعرف قاعدة مثلث بقسمة مساحته على نصف علوه

٢٧٣ رابن ان مساحة سطح يبدل عليه بمجاصل طولوه في عرضه فيبدل على مساحة الجسم بطولوه في عرضه في عمقه

عملية آ مفروض قاعدة مثلث قائم الزاوية اب س
 ومجموع الوتر والساق فلن ان نجد الساق



لفرض اب = ن ب س = ك مجموع الوتر والساق
 ك + اس = ت وبمقابلة ك نصبر اس = ت - ك


(١) حسب اقليدس ق ٤٧ ك ا $\overline{اس} = \overline{اب} + \overline{ب س}$

(٢) وحسب ما فرض ك + ن = (ت - ك) = ت - ت = ت - ت ك + ك

بالمقابلة ت ك = ت - ن وك = $\frac{ت - ن}{ت}$ ب س الضلع

المطلوب ابي في كل مثلث قائم الزاوية يعدل العمود مربع مجموع الوتر والعمود الآ
 مربع القاعدة مقسوم على مضاعف مجموع الوتر والعمود

ع ٢ مفروض قاعدة مثلث قائم الزاوية وفضله الوتر
 والعمود فلن ان نجد العمود



لفرض اب = ت = ٢٠ ب س = ك وفضلتها
 ف = ١٠ فيكون الوتر اس = ك + ف

(١) حسب اقليدس ق ٤٧ ك ا $\overline{اس} = \overline{اب} + \overline{ب س}$


(٢) وبالمفروض (ك + ف) = ت + ك

(٣) بالبسط ك + ٢ ك ف + ف = ت + ك

(٤) بالمقابلة والقسمة ك = $\frac{ت - ف}{٢}$ = ١٥

ع ٢٦ مفروض وتر مثلث قائم الزاوية ٣٠ ذراعاً، وفضلة الضلعين الآخرين اذرع. فاهو طول القاعدة الجواب ٢٤ ذراعاً

ع ٤٦ مفروض وتر مثلث قائم الزاوية ٥٠ ذراعاً، ونسبة القاعدة الى العمود كسبة ٤ : ٣ فاهو طول العمود. الجواب ٣٠ ذراعاً



ع ٥٥ مفروض محيط شكل متوازي الاضلاع وقطر مثل شكل ا ب س دفلنا ان نجد اضلاعه لنفرض القطر اس = ح = ١٠ و ضلع ا ب = ك


نصف المحيط ب س + ا ب = ب س + ك = د = ١٤ بمقابلة ك نصير ب س = د - ك

حسب اقليدس ق ٤٧ ك ١ ا ب + ب س = اس

وحسب المفروض ك = (د - ك) + ح

اذًا ك = $\frac{١}{٢} د + \frac{١}{٢} ح - \frac{١}{٢} د$ = ٨ = ا ب

وب س = د - ك = ٦ = ٨ - ١٤



ع ٦٦ مفروض مساحة مثلث قائم الزاوية ا ب س و اضلاع شكل متوازي الاضلاع مرسوم فيه. فلنا ان نجد الضلع ب س

لنفرض المساحة = ع و د ي = ف ب = ب س ي ب = د ف = د ب س = ك اذًا س ف = ب س - ب ف = ك - ب

(١) بمشابهة المثلثات س ف : د ف :: ب س : ا ب

(٢) او حسب المفروض ك - ب : د :: ك : ضلع اب


(٢) و $د ك = (ك - ب) \times اب$

(٤) حسب رقم ٢٧١ ع $اب \times ف = اب \times س = اب \times ك$

(٥) بالقسمة على $ف ك = \frac{ع}{ك} = اب$

(٦) $د ك = (ك + ب) \times \frac{ع}{ك} = ع \frac{ع}{ك} - \frac{ع ب}{ك}$

(٧) $وك = \frac{ع}{د} + \frac{ع}{د} - \frac{ع ب}{د} = \frac{ع}{د} = ب س$



ع ٧ مفروض ثلاثة اضلاع مثلث قائم الزاوية
 اب س فلنا ان نجد قسمة الوزر الحادتين من عمودي
 مرسوم من القائمة على الوزر حسب اقليدس (ق ٨
 ك ٦) يقسم المثلث الى اثنين كل واحد منها قائم
 الزاوية

(١) حسب اقليدس ق ٤٧ ك $ا ب د = د س + س د = ب س$

(٢) بالشكل $س د = اس - اد$

(٣) ربع الجانيين $س د = (اس - اد)$

(٤) اذا بالتعويض في (١) $ب د + (اس - اد) = ب س$

(٥) بالبسط $ب د + اس - اس \times اس - اد + اد = ب س$


(٦) بالمقابلة $ب د = ب س - اس + اس \times اد - اد$

(٧) حسب اقليدس (ق ٤٧ ك ١) $ب د = اب - اد$

(٨) بمساواة (٦) و (٧) $ب س - اس + اس \times اد = اب - اد$

(٩) بالمقابلة $اس \times اد = اب + اس - ب س$

(١٠) بالقسمة $اد = \frac{اب + اس - ب س}{اس}$



ع ٨ مفروض مساحة شكل دى ف غ
متوازي الاضلاع مرسوم في مثلث اب س فلنا
ان نجد اضلاعه

ارسم س ر عمودياً على اب وحسب المفروض
دغ بوازي اب اذا

مثلث س غ ح يشبه مثلث س ر ب

و . س د غ . . س اب

فلنفرض س ر = د و اب = ب و دغ = ك والمساحة =

(١) بمشابهة المثلثات س ب : س غ :: اب : دغ

(٢) و س ب : س غ :: س ر : س ح

(٣) وبساواة النسب اب : دغ :: س ر : س ح

(٤) اذا $\frac{دغ \times س ر}{اب} = س ح$

(٥) بالشكل س ر - س ح = ح ر = دى

(٦) بالتعويض س ر = $\frac{دغ \times س ر}{اب} = دى$

(٧) وبالمفروض د - $\frac{دك}{ب} = دى$

(٨) ع = دغ \times دى = ك \times (د - $\frac{دك}{ب}$)


(٩) اي ع = دك - $\frac{دك^2}{ب}$

(١٠) بالتحويل ك = $\frac{ب}{٢} \pm \frac{ب^2}{٤}$ $\frac{ع ب}{د} = دغ$

ثم يعرف دى بقسمة المساحة على دغ

ع ٩ لئان نرسم من نقطة مفروضة في دائرة مفروضة خطأ مستقيماً حتى يكون

بين جزئيه الواقعين بين النقطة والمحيط فضلة مفروضة



في دائرة اق ب ر لتكن ف نقطة مفروضة في القطر ا ب ثم لنفرض اف = ت وب ف = ب و ف ر = ك والفضلة المفروضة = د اذا ف ق = ك + د

(١) حسب اقليدس (ق ٢٥ ك ٢) $\overline{ف ر} \times \overline{ف ق} = \overline{ا ف} \times \overline{ب ف}$

(٢) وبالمفروض $\overline{ك} \times (د + ك) = ت \times ب$

(٣) اي $\overline{ك} + \overline{د ك} = ت ب$

(٤) باتمام التربيع $\overline{ك}^2 + \overline{د ك}^2 + \frac{1}{4} \overline{د}^2 = \overline{ت ب}^2 + \frac{1}{4} \overline{د}^2$

(٥) بالتجدير والمقابلة $\overline{ك} = \sqrt{\overline{ت ب}^2 + \frac{1}{4} \overline{د}^2} - \frac{1}{4} \overline{د}$

ع ١٠ مفروض مجموع ضلعي مثلث ١١٥٥ وطول العمود من الزاوية الواقعة بينهما على الضلع الثالث ٢٠٠ وفضلة قسي الضلع الثالث الحادتين من وقوع العمود عليه ٤٩٥ فاهو طول الاضلاع الثلاثة

الجواب ١٤٥ و ٢٧٥ و ٧٨٠

ع ١١ مفروض محيط مثلث قائم الزاوية ٧٢٠ وطول العمود الواقع من

القائمة على الوتر ١٤٤ فاهو طول الاضلاع الجواب ٣٠٠ و ٢٤٠ و ١٨٠

ع ١٢ مفروض فضلة قطر مربع واحد اضلاعه فلنا ان نجد الاضلاع ليكن

ك = الضلع المطلوب و ف = الفضلة بينه وبين القطر اذا $\overline{ك} = \overline{ف} + \overline{ف ك}$

ع ١٤ مفروض قاعدة مثلث مستوي وعلوه فلنا ان نجد ضلع مربع مرسوم

في المثلث قائم على القاعدة مثل شكل د ي ف غ في ع ٨ لنفرض ك = ضلع

المربع وق = قاعدة المثلث وع = علوه اذا $\overline{ك} = \frac{\overline{ق ع}}{\overline{ق} + \overline{ع}}$

ع ١٥ مفروض ضلعاً مثلث وطول خط ينصف الزاوية الواقعة بينهما.

فلنا ان نجد طول القاعدة اي الضلع الثالث الذي يقع عليه الخط المنصف للزاوية

لنفرض ك = القاعدة ت = احد الضلعين المفروضين وس = الآخر

وب = الخط المنصف إذا ك = (ت + س) $\times \sqrt{\frac{ت س - ب^2}{ت س}}$

١٦ ع مفروض وتر مثلث قائم الزاوية ٣٥ وضع مربع مرسوم فيه (مثل شكل دى ف ب فى ع ٦) = ١٢ مطلوب الضلعان الآخران من المثلث
الجواب ٢٨ و ٢١

١٧ ع فى مثلث قائم الزاوية كانت الازرع فى محيطه مساوية للاذرع المربعة فى مساحته ونسبة القاعدة الى العمود :: ٤ : ٣ مطلوب طول كل ضلع من اضلاعه
الجواب ٦ و ٨ و ١٠

١٨ ع دائر طولها ١٨ ذراعاً وعرضها ١٢ ذراعاً يحيط بها ممشي متساوي العرض ومساحته تساوي مساحة الدار. فا هو عرض الممشى

١٩ ع حقله زواياها قائمة نسبة ضلع منها الى آخر :: ٦ : ٥ وسُدس مساحتها ١٢٥ قسبة مربعة فا هو طول الاضلاع

٢٠ ع فى مثلث قائم الزاوية نسبة مساحته الى مساحة مستطيل مفروض :: ٥ : ٨ والضلع الاقصر من كل واحد منها ٦٠ قسبة. والضلع الاخر من المثلث المتوالي للقائمة مساو لقطر المستطيل فا هي مساحة المثلث والمستطيل
الجواب ٤٨٠٠ و ٣٠٠٠ قسبة مربعة

٢١ ع صندوقان زواياها قائمة اعظمها يسع ٢٠ قدماً مكعباً اكثر من اصغرها ومساحة الاصغر الى مساحة الاكبر :: ٤ : ٥ وقاعدتها مربعتان وضلع الواحد مساو لعنى الصندوق الآخر فا هو عنى الصندوقين
الجواب ٤ و ٥ اقدام

٢٢ ع مفروض طول ثلاثة خطوط عمودية مرسومة من نقطة داخل مثلث متساوي الاضلاع الى الاضلاع الثلاثة فا طول الاضلاع
لنفرض ت وب وس = الخطوط العمودية وك = نصف احد الاضلاع اذا

$$ك = \frac{ت + ب + س}{٣}$$

ع ٢٢ مساحة مربعة احاط بها سوق متساوي العرض وطول ضلع الساحة ثلاث قصبات اقل من تسعة اضعاف عرض السوق والقصبات المربعة في السوق اكثر من القصبات في محيط الساحة بمائتين وثمانية وعشرين فما هي مساحة الساحة الجواب ٥٧٦ قسبة مربعة

ع ٢٤ مفروض طول خطين مرسومين من الزاويتين الحادتين من مثلث قائم الزاوية الى نقطة انتصاف الضلعين المتقابلين. فلنا ان نجد طول الاضلاع لنفرض ك = نصف القاعة وى = نصف العمود وت وب = الخطبين المفروضين اذا

$$\sqrt{\frac{٤ ت - ٢ ب}{١٥}} = وى \quad \sqrt{\frac{٤ ب - ٢ ت}{١٥}} = ك$$




الفصل الخامس والعشرون

في تعديل المنحنيات

٢٧٤ قد نظرنا في ما تقدم الى استعمال الجبر في معرفة اشكال هندسية محاطة بخطوط مستقيمة. فلننظر الان الى مناسبة الجبر لمعرفة الخطوط المنحنية وكيفية الدلالة على خصائصها ونسبة بعضها الى بعض بواسطة معادلات


ان اوضاع نقط خطي منحني مرسوم على سطح مستوي نعين من بعد كل واحدة عن



خطين مستقيمين احدهما عمودي على الاخر
ليكن اغ اف عمودين احدهما على الاخر
ودب ودب ودب وعمدة على اف
وسد وسد وسد وعمدة على اغ
فيعرف د من طول خطي


ب د وسد ووضع د بطول خطي ب د وسد ووضع د من خطي ب د وسد وقد سمي الخطان المرسومان كما ذكر من نقطة ما في خط منحني معيني تلك

اذأى = ١ وان فرض ك = ٨ فاذاى = ٤ وان فرض ك = ١٠٠ فاذاى = ٥٠ الخ



٢٧٦ اذا اختلفت زاوية ح آف عما سبق في الرسم السابق كما يرى في هذا الرسم تبقى المعادلة على حالها الا في مسمى ك فلنفرض ت دالة على نسبة ي الى ك اي ي : ك :: ت : ا فتصير المعادلة ت ك = ي فيكون المسمى ت صحيحا او كسرا حسبما كانت ي اكبر من ك او اصغر منها


ثم لنستعمل ما قد اوضح في تحصيل معادلة دالة على خط منحنى. ولنفرض انه يراد معادلة دالة على شكل شلجي. فمن خصائص هذا الشكل كما يتضح في حساب قطع المخروط ان الفصالات مناسبة الى مربعات المعينات. فلنكن ت نسبة مربع احدى المعينات الى فصلتها. ولما كانت هذه النسبة هي هي بين كل زوج من معين وفصلة في الشكل كله مجدت من ذلك هذه المعادلة ي : ك :: ت : ا وت ك = ي وهي معادلة المنحنى وتصح في كل نقطة منه. ومهما تغيرت ك وي تبقى ت على حالها ثم ان كانت ك = ي فباالتجذير ي = ت ك وان كان ت = ٢ اذا ي = ٢ ك



وان فرض ك = ٤٠ = ا ب فاذاى = ٣ = ٩ ك = ٤٥٠ × ٢ ك = ٩٠٠
وان فرض ك = ٨ = ا ب فاذاى = ٤ = ١٦ ك = ٨ × ٢ ك = ١٦
وان فرض ك = ١٢٠ = ا ب فاذاى = ٥ = ٢٥ ك = ١٢٠ × ٢ ك = ٣٦٠


وان فرض ك = ١٨ = ا ب فاذاى = ٥ = ٢٥ ك = ١٢٥ × ٢ ك = ٣١٥
وان فرض ك = ٦ = ا ب فاذاى = ٤ = ١٦ ك = ٦ × ٢ ك = ٣٦

٢٧٧ متى رسمت المعينات على جانبي القطر تكون الواقعة فوقه ايجابية والواقعة تحته سلبية. مثالة في الرسم السابق ان حسب المعينات فوق آف ايجابية تكون التي تحته سلبية والفصالات الواقعة عن اليمين مثل ا ب ا ب الخ ان حسب



إيجابية فتكون الواقعة عن اليسار مثل
اس اس سلبية. وفي حل مسألة ان خرج
معين او فصلة سلبياً بوخذ على جانب المحور
المقابل للجانب المحسوب ايجابياً

٢٧٨ اننا في ما تقدم نرى الخط المستقيم او المنحني يقطع المحور في نقطة تقاطع
المحورين كما يرى من الرسوم السابقة ولكن ليس كذلك في كل حين. فيمكن ان
نحسب الفصالات على المحور ق ف من خط غ ن فلنفرض ك = احدى الفصالات



م ب او م ب ا ح وي =
معينها ولنفرض ل = ا ب
ود = م آ وت = نسبة
ب د : ا ب اذا ت ل =
ي ول = $\frac{ي}{ت}$ ولكن

بالشكل ا ب = م ب - م ا اي ل = ك - ب وبساواة المعادلتين ك - ب =
 $\frac{ي}{ت} وك = \frac{ي}{ت} + ب$


٢٧٩ يجب ان يعلم بالتدقيق متى تكون المعينات والفصالات ايجابية ومتى
تكون سلبية ومتى ينتهي احدها. فنرى ان الفصلة تنتهي وثلاثي في نقطة التقاء الخط
المنحني بالمحور الذي تقاس الفصالات عليه. والمعينة ثلاثي عند نقطة التقاء المنحني
بالمحور الذي تقاس المعينات عليه. مثالة في رسم الثلجي السابق نرى المعينات
تقاس على خط آ ف فيقل طولها شيئاً فشيئاً بتقريب المنحني الى المحور الى ان تزول
بالكلية في نقطة التقاءها. والفصالات تقاس على خط آ غ ونقل ايضاً كما سبق الى
ان ثلاثي عند آ

٢٨٠ الامر واضح انه اذا التقى المحوران بالمنحني في نقطة واحدة ثلاثي
المعينات والفصالات معاً كما في الرسم المشار اليه. ولكن (في رسم رقم ٢٧٨) نرى
المحور م ف يقطع خط ن د في آ و غ ن يقطعه في ن فالمعينات اي م ف ثلاثي
عند آ والفصالات اي غ ن ثلاثي عند م او ن

٢٨١ كل معين او فصلة بتغير من ايجاب الى سلب عند مرور في نقطة التلاشي اي النقطة التي فيها تكون قيمته صفراً. مثاله في رسم رقم ٢٧٧ نرى المعين $\overline{س}$ يقل شيئاً فشيئاً الى ان يتلاشى في $\overline{آ}$ ثم يصير سلباً لانه يقع تحت المحور $\overline{س}$ ف وكذلك الفصالات عن $\overline{بين}$ $\overline{آ}$ نقل شيئاً فشيئاً الى ان يتلاشى عند $\overline{آ}$ ثم يصير سلبية عن $\overline{يسار}$ $\overline{آ}$ ونرى هنا ان الاثنتين تغيرتا معاً في نقطة واحدة ولكن في رسم رقم ٢٧٨ نرى المعينات تتغير عند $\overline{آ}$ والفصالات تبقى ايجابية الى $\overline{ع}$ $\overline{ن}$ وبين $\overline{آ}$ $\overline{ع}$ $\overline{ن}$ تكون المعينات سلبية والفصالات ايجابية

٢٨٢ ان استعمال هذه القواعد وغيرها هو من متعلقات حساب قطع المخروط ومقصودنا الان انما هو ذكر بعض امثلة لايضاح ما قيل ولتسهيل ادراك بعض اشياء تقع تحت نظرنا قبل الوصول الى حساب قطع المخروط الذي هو الطبقة العليا من العلوم التعليمية

$\overline{ع}$ $\overline{آ}$ لنا ان نجد معادلة دائرية ما فلنفرض دائرة $\overline{ف}$ $\overline{ع}$ $\overline{م}$ ولنرسم القطرين $\overline{ع}$ $\overline{ن}$ $\overline{ف}$ $\overline{م}$ احدها عمودياً على الاخر ارس من اية نقطة شئت في المنحني اي محيط الدائرة المعين $\overline{د}$ $\overline{ب}$ عمودياً على $\overline{آ}$ $\overline{ف}$ فيكون $\overline{آ}$ $\overline{ب}$ الفصلة المناظرة للمعين $\overline{د}$ $\overline{ب}$



ثم لنفرض نصف القطر $\overline{آد}$ = $\overline{روآب}$ = $\overline{ك}$
 $\overline{وب}$ = $\overline{د}$ $\overline{س}$

حسب اقليدس (ق ٤٧ ك ١) $\overline{ب}$ $\overline{د}$ = $\overline{آب}$ $\overline{آد}$ - $\overline{آب}$

وبالمفروض $\overline{س}$ = $\overline{ر}$ - $\overline{ك}$

بالتجذير $\overline{س} \pm = \sqrt{\overline{ر} - \overline{ك}}$


وعلى هذا السبيل $\overline{ك} \pm = \sqrt{\overline{س} - \overline{ر}}$ اي ان الفصلة تسلوي الجذر المالمالي من فصلة مربع نصف القطر ومربع المعين. فان حسب نصف قطر الدائرة واحداً تصير المعادلتان $\overline{س} \pm = \sqrt{\overline{ر} - \overline{ك}}$ و $\overline{ك} \pm = \sqrt{\overline{س} - \overline{ر}}$ وتصل هذه المعادلة مها كانت النقطة المفروضة في المحيط لان المعين والفصلة يكونان ضلعي مثلث ذي قائمة واد المتزان لانه نصف قطر الدائرة ونرى للمعادلتين قيمة ملتبسة اي تكون ايجابية او سلبية فتحسب المعينات والفصالات في الربع الاول $\overline{ع}$ $\overline{ف}$ ايجابية وفي الربع الثاني $\overline{ع}$ $\overline{م}$ تبقى

المعينات ايجابية وتصهر الفصالات سلبية وفي الربع الثالث م ن تصيران سلبيتين وفي
الربع الرابع ن ف تبقى المعينات سلبية وتعود الفصالات ايجابية لحي


}	في ربع	ف غ	تكون ك +	وى +
		غ م	ك -	وى +
		م ن	ك -	وى -
		ن ف	ك +	وى -

٢٨٢ قد يحسب في الهندسة ان الخطوط حاصلة من حركة نقطة فان
تحركت الى جهة واحدة حصل خط مستقيم. ولان تغيرت الجهة في كل وقت حصل
خط منحن. وكيفية المنحنى وشكله متعلقان بكيفية تلك الحركة. فان تحركت النقطة
على بُعد واحد من نقطة اخرى ثابتة حصلت دائرة تكون الثابتة مركزها وعرفنا
معادلتها من معرفة كيفية هذه الحركة. وهكذا نحصل على معرفة معادلات جميع انواع
المنحنيات بمعرفة كيفية حركة النقطة في رسمها كما سنرى من الامثلة الآتية

ع ٢ لنا ان نجد معادلة المنحنى المسمى رديف ديوكليس وكيفية رسمه في ان



ناخذ نصف دائرة $\overline{ان ب}$ وفي القطر $\overline{اب}$
خذ نقطة $\overline{ر}$ وليكن بعد $\overline{ف}$ من $\overline{ا}$ مساوياً لبعد
 $\overline{ر م ب}$ ارسم $\overline{ر ن}$ عموداً على $\overline{اب}$ وليقطع
المحيط في $\overline{ن}$ اوصل بين $\overline{ا و ن}$ ومن $\overline{ف}$ ارسم
 $\overline{ف م}$ عموداً على $\overline{اب}$ يلاقى $\overline{ان}$ في $\overline{م}$ فالخط



المنحنى ماراً بنقطة $\overline{م}$ فان اخذ $\overline{ف}$ على ابعاد
مختلفة من $\overline{ا}$ نتعین اية عدة فرضت من نقط
المنحنى. اذ كلما تقدم خط $\overline{ف م}$ الى ناحية $\overline{ب}$
طال. ثم لكي نجد معادلة هذا المنحنى ليكن
اج و اب المحورين ولنفرض كل واحدة من
التصالات $\overline{اف}$ $\overline{اف}$ $\overline{ف م}$ $\overline{ف م}$

وكل واحدة من المعينات $\overline{ف م}$ $\overline{ف م}$ $\overline{ف م}$ $\overline{ف م}$

والقطراب - ب

اذا فب = اب - اف = ب - ك

ولان $\overline{م ر ن}$ عمودان على اب فثلك اف م يشبه ثلك ار ن اقليدس

(ق ٢٧ وق ٢٩ ك ١)

(١) بالثلثات المتشابهة اف : فم :: ار : رن

(٢) او بوضع فب عوض آر تصير اف : فم :: فب : رن

$$(٣) \text{ اذا } \frac{م \times فب}{اف} = \overline{رن}$$

$$(٤) \text{ بتربيع المجانبين } \frac{م^2 \times فب^2}{اف^2} = \overline{رن^2}$$

(٥) حسب اقليدس (ق ٣٥ ك ٢ وق ٣ ك ٣) ار × رب = $\overline{رن}$

(٦) بوضع فب عوض آر واف عوض رب تصير فب × اف = $\overline{رن}$

$$(٧) \text{ بمساواة (٤) و (٦) } \frac{م^2 \times فب^2}{اف^2} = فب \times اف$$


(٨) اذا اف = $\overline{م} \times فب$

(٩) او حسب فرض ك = $\overline{م} \times فب$ (ب - ك)

اي كعب النصلة يعدل مربع المعين في فضلة قطر الدائرة والنصلة . وهكذا في

كل زوج من معين وفضلة

ع ٢ لنا ان نجد معادلة المنحني المسمى بوق نكوميديس . وكيفية رسمه ان تاخذ



خطاً مفروضاً وضعاً مثل اب ولتكن س

نقطة خارجة عنه ويدور خط س ح

حول هذه النقطة وفي كل نقطة من مروره

بخط اب اجعل م وي م وي م

مساوياً لخط اد فيمر المنحني بنقط د وم

وم وم الخ . ثم لكي نجد معادلته ليكن س د و اب المورين ارم فم يوازي ار

ورم يوازي س ف وقد رسم م = اد

فلنفرض الفصلة $\overline{اف} = \overline{فم} = ك$

فلنفرض المعينة $\overline{رم} = \overline{اف} = ي$

فلنفرض الخط المفروض $\overline{سا} = ت$

و $\overline{اد} = \overline{يم} = ب$

فإذا $\overline{ساف} + \overline{ات} = \overline{ساف} + \overline{ات} = ي + ت$

لان $\overline{سم}$ يقطع المتوازيين $\overline{سدر}$ وايضاً يقطع $\overline{اروفم}$ فنلنا $\overline{سافم}$

و $\overline{ريم}$ متشابهان

(١) بالمثلثات المتشابهة $\overline{ساف} : \overline{فم} :: \overline{رم} : \overline{ري}$

(٢) و $\overline{ري} = \frac{\overline{فم} \times \overline{رم}}{\overline{ساف}}$

(٣) بتربيع الجانبين $\overline{ري}^2 = \frac{\overline{فم}^2 \times \overline{رم}^2}{\overline{ساف}^2}$

(٤) حسب اقليدس (ق ٤٧ ك ١) $\overline{ري}^2 = \overline{يم}^2 - \overline{رم}^2$

(٥) بمساواة (٣) و (٤) $\overline{ري}^2 = \overline{رم}^2 - \overline{يم}^2 = \frac{\overline{فم}^2 \times \overline{رم}^2}{\overline{ساف}^2}$

(٦) اي بالمفروض $\overline{ب} - \overline{ي} = \frac{\overline{ك}^2 \overline{ي}}{\overline{ت} + \overline{ي}}$

(٧) او $\overline{ت} + \overline{ي} = (\overline{ب} - \overline{ي}) \times \overline{ك}^2 \overline{ي}$

٢٨٤ نرى في الامثلة المتقدمة ان المعادلة اخذت من وصف كيفية المنحني وقد يعكس العمل اي تُفرض المعادلة ومنها يرسم المنحني بأخذ فصالات مختلفة وجعل

معينات لها فيمر المنحني باطراف هذه المعينات

٤ ع لنا ان نرسم منحنيًا بمعادلتها $\overline{ك} = \overline{ي} \text{ او } \overline{ي} = \overline{ب} - \overline{ك}$ (انظر رسم الشلبي)

خذ على خط $\overline{اف}$ فصالات مختلفة طولاً اي

$\overline{اب} = ٤$ فيكون المعين $\overline{ب} = ٣$

$\overline{اب} = ٨$ فيكون المعين $\overline{ب} = ٤$

ا ب = ١٢٥ فيكون المعين ب د = ٥

ا ب = ١٨ فيكون المعين ب د = ٦

ثم ركب هذه المعينات مع فصلاتها واوصل بين اطرافها بخط ا د د فيكون المنحني المطلوب. ولا ريب ان الخط يكون اقرب الى المطلوب كلما زاد عدد المعينات والفصالات الماخوذة

٢٨٥ اذا وُهمت حركة نقطة حتى تمر باطراف جميع المعينات المفروضة في معادلة يسمي الخط المحادث طريق النقطة ابي الطريق التي تتحرك فيها والتي توجد فيها ابدأ. ويسمى ايضاً طريق المعادلة التي منها تؤخذ مواضع النقطة في حركتها. مثالة ان الشلبي يسمي طريق نقط د د او طريق المعادلة ت ك = ي وقوس الدائرة هو طريق المعادلة ك = $\frac{+}{-} \sqrt{r_2 - r_1}$ فاذا معرفة طريق معادلة انما هي معرفة الخط المنحني او المستقيم التي هي له

ع لانا نجد طريق المعادلة ك = $\frac{ك}{ت}$ او ت ك = ي التي فيها تفرض ك وى معينات وفصالات مختلفة وكمية ثابتة معينة فان اخذ المعين ك على اطوال مختلفة فلا بد للفصلة ي ان تتغير بالنسبة الى ك حتى تبقى المعادلة ت ك = ي او بجل المعادلة الى نسبة ي : ك :: ت : ا اي لا تتغير نسبة ي : ك لان ت كمية معينة اي تكون نسبة فصلة الى معينها كنسبة فصلة اخرى الى معينها مها كان. فلنفرض

فصلتين ا ب ا ب (رسم رقم ٢٧٥) وب د وب د معينهما اذا ا ب : ب د :: ا ب : ب د فيكون خط ا د مستقيماً (اقليدس ق ٢٢ ك ٦) وهو طريق المعادلة

ثم ان كانت المعادلة المفروضة ك = $\frac{ك}{ت} + ب$ فزيادة ب لا تنسب تغييراً في الطريق. لان ب انما يزيد طول الفصالات فقط. وعوض ان نقاس من آ نقاس من نقطة اخرى مثل م في رسم رقم ٢٧٨ وتبقى نسبة ا ب او ا ب الى ب د او ب د كما كانت فيكون الخط مستقيماً

٢٨٦ يبرهن مما سبق ان كل معادلة تكون ك وى اي الفصالات والمعينات في اجزائها مختلفة منها. وليس لها الا القوة الاولى تكون طريقها خطأ مستقيماً لان كل

معادلة من هذا النوع يمكنها ان تتحول الى ك = $\frac{ك}{ت} + ب$ كما يتضح من هذه العملية

ع ٦ لنا ان نجد طريقة المعادلة

$$س ك - د + ح ك - ي م = ن$$

بالمقابلة س ك + ح ك = ي م + ن - د + د

$$\text{وبالقسمة على س + ح نصير ك} = \frac{ي م + ن - د}{س + ح}$$

فيمكن هنا ان يدل على الكميات الثابتة بالتعويض عنها بحرف واحد. فلنفرض

$$س + ح = ت \text{ و } \frac{د + م - ن}{س + ح} = ب \text{ فتصير المعادلة ك} = \frac{ت}{ب} + ب$$

التي طريقها خط مستقيم كما تقدم

٢٨٧ ثم انه متى كانت المعينات مناسبة لمربعات الفصالات او كعوبها او

للقوة الرابعة منها وهلم جراً يكون طريق المعادلة خطأً منجياً لان نسبة المعينات

الموضوعة على خط مستقيم تكون نسبة بعضها الى بعض ذات النسبة الكائنة بين

فصالاتها. ولكن لا تكون نسبة كميات بعضها الى بعض كنسبة مربعاتها او كعوبها او

قواتها الرابعة والخامسة وهلم جراً كما علم من باب النسبة. مثاله ان فرض ك^٢ =

ي فتريد المعينات اكثر من الفصالات فان اخذت الفصالات ١ و ٢ و ٣ و ٤ الخ

تكون المعينات مساوية لمربعاتها اي ١ و ٤ و ٩ و ١٦ الخ

٢٨٨ ان عدة المعادلات التي يمكن ان تتركب من قوات المعينات والفصالات

المختلفة هي غير متناهية. وكل معادلة لها طريق مخصوص بها. اذا تكون اشكال المنحنيات

غير متناهية ولكن يمكن ان تنحصر في انواع. وقد جرت العادة عند المولدين ان

يرتبوها في انواع حسب درجات معادلاتها فيدل على انواع المخطوط بالدليل

الاعظم او مجموع دلائل المعينات والفصالات في جزء من المعادلة. مثاله ت ك

= ي تخصص بخط من النوع الاول لان الدليل في كل معين وفصلة انما هو واحد

وليس في هذا النوع منحن كما راينا سابقاً

والمعادلة س ك^٢ - ت ك ي = ي^٢ مخصصة بالنوع الثاني من المخطوط والنوع

الاول من المنحنيات لان الدليل الاعظم هو ٢ وت ي + ك ي = ب ك تخصص

بالنوع الثاني ايضاً. لانه وان لم يكن فيها دليل اكبر من واحد لكن مجموع دلائل

ك و ي في الجزء الثاني اي ١ + ١ = ٢ و ي^٢ - ٣ ت ك ي = ب ك مخصصة

بالنوع الثالث من الخطوط والثاني من المنحنيات لان دليل \bar{C} الاعظم هو ٢٨٩ في منحنيات من الانواع العالية قد يمكن ان تكون لمعين فصلو ما قيمات مختلفة فيلنقي المعين بالمنحنى في نقط متعددة لان طول المعين متوقف على معادلة المنحنى. وان كانت المعادلة فوق الدرجة الاولى يكون لها قيمتان فاكثركا رابنا سابقا فتكون للمعين قيمات مختلفة

ان معادلة من الدرجة الاولى لها قيمة واحدة فقط وخطها يقطع المعين في نقطة واحدة فقط. مثاله معادلة خط $\bar{A}\bar{C}$ (رسم رقم ٢٧٥) هي $\bar{A}K = \bar{C}Y$ فنرى ان \bar{Y} لها قيمة واحدة فقط وك لا تتغير. فان اخذ الفصلة $\bar{K} = \bar{A}B$ يكون المعين $\bar{C}Y = \bar{B}D$ الذي يمكنه ان يلاقى $\bar{A}\bar{C}$ في \bar{D} فقط

ولكن معادلة الشلجي $\bar{C}Y = \bar{A}T$ ك لها قيمتان كما نرى من تجذير الجانبيين اي $\bar{Y} = \sqrt{\bar{A}T}$ احداها ايجابية والاخرى سلبية وذلك دليل على امكان اخراج المعين الى جهتيه من طرف الفصلة فيمكنه ان يلاقى جزءا آخر من المنحنى. مثاله معين الفصلة $\bar{A}B$ (رسم ١٨٥) الشلجي قد يمكنه ان يكون $\bar{B}D$ فوق الفصلة او $\bar{B}D$ تحنها

قد رابنا سابقا ان معادلة مكعبة لها ثلاثة جذور اي ثلاث قيمات فتكون لمعين منحني من نوعها ثلاث قيمات فيمكنه ان يلاقى المنحنى في ثلاث نقط. مثاله معين الفصلة $\bar{A}B$ قد يمكن ان يكون $\bar{B}D$ او $\bar{B}D$

٢٩٠ اذا التقى المنحنى بالمحور الذي تقاس عليه الفصالات نقل المعينات شيئا فشيئا الى ان تتلاشى كما تقدم. وقد يمكن ان يتقرب منحني الى خط ابدأ بدون

ان يلاقيه. فلنفرض على خط $\bar{A}\bar{F}$ ابعادا متساوية $\bar{A}B$ و $\bar{B}B'$ و $\bar{B}B''$ و $\bar{B}B'''$ ولنفرض شكل المنحنى $\bar{D}D'$ و $\bar{D}D''$ و $\bar{D}D'''$ على كيفية حتى يكون كل معين عند نقط $\bar{B}B'$ و $\bar{B}B''$ و $\bar{B}B'''$ الخ نصف الذي عن يساره اي $\bar{B}D'$ نصف $\bar{B}D$ و $\bar{B}D''$ نصف $\bar{B}D'$ الخ


فالامر واضح انه مها اخرج المنحنى على هذه الكيفية لا يلاقى $\bar{A}\bar{F}$ بل يبقى متقرا اليه ابدأ. وكل خط على هذه الكيفية اي الذي يتقرب ابدأ الى منحني بدون ان ياتي به

يسمى متقاربة فالمحور اف هو متقارب المنحني د د' فكما زادت الفصلة قل المعين .
 ومتى حسبت الفصلة غير متناهية حسبما ذكر في فصل الغير المتناهيات بصير المعين
 شبيهاً بالغير المتناهي فيدل عليه بصير والامتداد في هذا الباب من خصائص حساب
 قطع المخروط هذا ما اقتضى وضعه في علم الجبر والمقابلة
 والمحمد لله الذي لا يحاط به علماً
 انتهى

وكان الفراغ من تبييضه في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٨٥٢ مسجية

طبع في بيروت سنة ١٨٥٢ مسجية


اذاى = ١ وان فرض ك = ٨ فاذاى = ٤ وان فرض ك = ١٠٠ فاذاى = ٥٠ الخ



٢٧٦ اذا اختلفت زاوية ح آ ف عما سبق في الرسم السابق كما يرى في هذا الرسم تبقى المعادلة على حالها الا في مسمى ك فلنفرض ت دالة على نسبة ى الى ك اي ى : ك :: ت : ١ فتصير المعادلة ت ك = ى فيكون المسمى ت صحيحا او كسرا حسبما كانت ى اكبر من ك او اصغر منها

ثم لنستعمل ما قد اوضح في تحصيل معادلة دالة على خط منحني. ولنفرض انه يراد معادلة دالة على شكل شلحي. فمن خصائص هذا الشكل كما يتضح في حساب قطع المخروط ان النصلات مناسبة الى مربعات المعينات. فلنكن ت نسبة مربع احدى المعينات الى فصلتها. ولما كانت هذه النسبة هي في بين كل زوج من معين وفصلة في الشكل كذا وجدت من ذلك هذه المعادلة ى : ك :: ت : ١ وت ك = ى وهي معادلة المنحني وتصح في كل نقطة منه. ومهما تغيرت ك وى تبقى ت على حالها ثم ان


كانت ك = ى فبالجذير ى = ٢ ك وان كان ت = ٢ اذا ى = ٢ ك



وان فرض ك = ٤٠ = ا ب
فاذا ى = ٢ = ٢٦ = ٤٠٥ × ٢٦
ب د وان فرض ك = ٨ = ا ب فاذا ى = ٤ = ١٦٦ = ٨ × ٢٦
وان فرض ك = ١٢٠ = ا ب فاذا ى = ١٢٠


وان فرض ك = ١٨ = ا ب فاذا ى = ٥ = ٢٥٦ = ١٢٠٥ × ٢٦ =
ى = ٦ = ٣٦٦ = ١٨ × ٢٦

٢٧٧ متى رسمت المعينات على جانبي القطر تكون الواقعة فوقه ايجابية والواقعة تحته سلبية. مثالة في الرسم السابق ان حسب المعينات فوق آ ف ايجابية تكون التي تحته سلبية والنصلات الواقعة عن اليمين مثل ا ب ا ب الخ ان حسبت



إيجابية فتكون الواقعة عن اليسار مثل
 اس اس سلبية. وفي حل مسألة ان خرج
 معين او فصلة سلبياً بوخذ على جانب المحور
 المقابل للجانب المحسوب إيجابياً

٢٧٨ اننا في ما تقدم نرى الخط المستقيم او المنحني يقطع المحور في نقطة نقاط
 المحورين كما برى من الرسوم السابقة ولكن ليس كذلك في كل حين. فيمكن ان
 تحسب الفصالات على المحور ق ف من خط غ ن فلنفرس ك = احدى الفصالات



م ب او م ب الخ وي =
 معينها ولنفرس ل = اب
 ود = م آ وت = نسبة
 ب د : اب اذا ت ل =
 ي ول = $\frac{ي}{ت}$ ولكن

بالشكل اب = م ب - م ا اي ل = ك - ب وبساواة المعادلتين ك - ب =
 $\frac{ي}{ت} وك = \frac{ي}{ت} + ب$


٢٧٩ يجب ان يعلم بالتدقيق متى تكون المعينات والفصالات ايجابية ومتى
 تكون سلبية ومتى ينتهي احدها. فنرى ان الفصلة تنتهي وتنتلشى في نقطة التقاء الخط
 المنحني بالمحور الذي تقاس الفصالات عليه. والمعينة تنتلشى عند نقطة التقاء المنحني
 بالمحور الذي تقاس المعينات عليه. مثاله في رسم الشلجي السابق نرى المعينات
 تقاس على خط آ ف فيقل طولها شيئاً فشيئاً بتقريب المنحني الى المحور الى ان تزول
 بالكلية في نقطة التقاءها. والفصالات تقاس على خط آ غ وتقل ايضاً كما سبق الى
 ان تنتلشى عند آ

٢٨٠ الامر واضح انه اذا التقى المحوران بالمنحني في نقطة واحدة تنتلشى
 المعينات والفصالات معاً كما في الرسم المشار اليه. ولكن (في رسم رقم ٢٧٨) نرى
 المحور م ف يقطع خط ن د في آ و غ ن يقطعه في ن فالمعينات اي م ف تنتلشى
 عند آ والفصالات اي غ ن تنتلشى عند م او ن

٢٨١ كل معين او فصلة بتغير من ايجاب الى سلب عند مروره في نقطة التلاشي اي النقطة التي فيها تكون قيمته صفراً. مثاله في رسم رقم ٢٧٧ نرى المعين $\overline{ي}$ يقل شيئاً فشيئاً الى ان يتلاشى في $\overline{آ}$ ثم يصير سلباً لانه يقع تحت المحور $\overline{س ف}$ وكذلك الفصالات عن $\overline{ي}$ بين $\overline{آ غ}$ نقل شيئاً فشيئاً الى ان تتلاشى عند $\overline{آ}$ ثم تصير سلبية عن $\overline{يسار آ غ}$ ونرى هنا ان الاثنتين تغيرتا معاً في نقطة واحدة ولكن في رسم رقم ٢٧٨ نرى المعينات تتغير عند $\overline{آ}$ والفصالات تبقى ايجابية الى $\overline{غ}$ وبين $\overline{آ غ}$ تكون المعينات سلبية والفصالات ايجابية

٢٨٢ ان استعمال هذه القواعد وغيرها هو من متعلقات حساب قطع المخروط ومقصودنا الان انما هو ذكر بعض امثلة لايضاح ما قيل ولتسهيل ادراك بعض اشياء تقع تحت نظرنا قبل الوصول الى حساب قطع المخروط الذي هو الطبقة العليا من العلوم التعليمية

$\overline{ع}$ لنا ان نجد معادلة دائرية ما فلنفرض دائرة $\overline{ف غ م}$ ولنرسم القطرين $\overline{غ ن}$ $\overline{ف م}$ احدهما عمودياً على الاخر ارسماً من اية نقطة شئت في المنحني اي محيط الدائرة المعين $\overline{د ب}$ عمودياً على $\overline{آ ف}$ فيكون $\overline{آ ب}$ الفصلة المناظرة للمعين $\overline{د ب}$



ثم لنفرض نصف القطر $\overline{آ د} = \overline{ر آ ب} = \overline{ك}$
 $\overline{و ب} = \overline{د ي}$

حسب اقليدس (ق ٤٧ ك ١) $\overline{ب د}^2 = \overline{آ ب}^2 + \overline{آ د}^2$
 $\overline{آ د}^2 - \overline{آ ب}^2$

وبالمفروض $\overline{ي}^2 = \overline{ر}^2 - \overline{ك}^2$

بالتجدير $\overline{ي}^2 = \overline{ر}^2 - \overline{آ ب}^2$


وعلى هذا السبيل $\overline{ك}^2 = \overline{ر}^2 - \overline{ي}^2$ اي ان الفصلة تسلوي الجذر المالمالي من فصلة مربع نصف القطر ومربع المعين. فان حسب نصف قطر الدائرة واحداً تصير المعادلتان $\overline{ي}^2 = \overline{ر}^2 - \overline{آ ب}^2$ و $\overline{ك}^2 = \overline{ر}^2 - \overline{آ ب}^2$ وتحصل هذه المعادلة مهما كانت النقطة المفروضة في المحيط لان المعين والفصلة يكونان ضلعي مثلث ذي قائمة و $\overline{آ د}$ الوتر لانه نصف قطر الدائرة ونرى للمعادلتين قيمة ملتبسة اي تكون ايجابية او سلبية فتحسب المعينات والفصالات في الربع الاول $\overline{غ}$ $\overline{ف}$ ايجابية وفي الربع الثاني $\overline{غ}$ $\overline{م}$ تبقى

المعينات ايجابية وتصهر الفصالات سلبية وفي الربع الثالث م ن تصيران سلبيتين وفي
الربع الرابع ن ف تبقى المعينات سلبية وتعود الفصالات ايجابية اي


ف غ	تكون ك + وى +	} في ربع
غ م	ك - وى +	
م ن	ك - وى -	
ن ف	ك + وى -	

٢٨٢ قد بحسب في الهندسة ان الخطوط حاصلة من حركة نقطة . فان
تحركت الى جهة واحدة حصل خط مستقيم . وان تغيرت الجهة في كل وقت حصل
خطاً منحني . وكيفية المنحني وشكله متعلقان بكيفية تلك الحركة . فان تحركت النقطة
على بُعد واحد من نقطة اخرى ثابتة حصلت دائرة تكون الثابتة مركزها وعرفنا
معادلتها من معرفة كيفية هذه الحركة . وهكذا نحصل على معرفة معادلات جميع انواع
المنحنيات بمعرفة كيفية حركة النقطة في رسمها كما سنرى من الامثلة الآتية

ع ٢ لنا ان نجد معادلة المنحني المسمى رديف ديوكليس وكيفية رسمه هي ان



ناخذ نصف دائرة ان ب وفي القطر ا ب
خذ نقطة ر وليكن بعد ف من ا مساوياً لبعد
ر من ب ارسم ر ن عموداً على ا ب وليقطع
المحيط في ن ا وصل بين ا ون ومن ف ارسم
ف م عموداً على ا ب يلاقي ان في م فالخط



المنحني ماراً بنقطة م فان اخذ ف على ابعاد
مختلفة من ا نتعين اية عدة فرضت من نقط
المنحني . اذ كلما تقدم خط ف م الى ناحية ب
طال . ثم لكي نجد معادلة هذا المنحني ليكن
اح و اب المحورين ولنفرض كل واحدة من
التصالات آ ف ا ف' اف' = ك

وكل واحدة من المعينات ف م ف م' ف م' = وى

فترض $\overline{ق} = \overline{ف} = \overline{ك}$

فترض $\overline{تجته} = \overline{م} = \overline{ق} = \overline{ي}$

فترض $\overline{مخض} = \overline{مفروض} = \overline{س} = \overline{ت}$

و $\overline{أد} = \overline{ي} = \overline{ب}$

فذاً $\overline{س} = \overline{ف} = \overline{س} = \overline{أ} - \overline{ق} = \overline{ت} + \overline{ي}$

لأن $\overline{س}$ يقطع الثوريين $\overline{س}$ و $\overline{دورم}$ و $\overline{أض}$ يقطع $\overline{أرؤف}$ و $\overline{مفتناس}$ و $\overline{ف}$ و $\overline{م}$ و $\overline{ري}$ متشابهين

(١) $\overline{بأشنت} = \overline{اشباهة} \overline{س} = \overline{ف} = \overline{ق} = \overline{م} = \overline{ري}$

(٢) و $\frac{\overline{ق} \times \overline{م}}{\overline{س}} = \overline{ري}$

(٣) بتربيع الجانين $\overline{ري} = \frac{\overline{ق} \times \overline{م}}{\overline{س}}$

(٤) حسب اقليدس (ق ٤٧ ك ١) $\overline{ري} = \overline{ق} - \overline{م} = \overline{ري} - \overline{م}$

(٥) بمساواة (٣) و (٤) $\overline{ري} = \overline{ق} - \overline{م} = \frac{\overline{ق} \times \overline{م}}{\overline{س}}$

(٦) اي بالمفروض $\overline{ب} - \overline{ق} = \frac{\overline{ك} \overline{ق}}{\overline{ت} + \overline{ق}}$

(٧) او $\overline{ت} + \overline{ق} = (\overline{ب} - \overline{ق}) \times \overline{ك} = \overline{ك} \overline{ق}$

٢٨٤ نرى في الامثلة المتقدمة ان المعادلة اخذت من وصف كيفية المنحني وقد بعكس العمل اي تُرَضُ المعادلة ومنها يرسم المنحني بأخذ فصلات مختلفة وجعل معينات لها قيمه المنحني باطراف هذه المعينات

ع ٤ لنا ان نرم منحنياً معادلته $\overline{ك} = \overline{ق} - \overline{م} = \overline{ك} - \overline{م}$ (انظر رسم المنحني)

خذ على خط اف فصلات مختلفة طولاً اي

$\overline{اب} = \overline{ه} = ٤$ فيكون المعين $\overline{ب} - \overline{د} = ٢$

$\overline{اب} = ٨$ فيكون المعين $\overline{ب} - \overline{د} = ٤$

اب = ١٢٠٥ فيكون المعين ب = د = ٥

اب = ١٨ فيكون المعين ب = د = ٦

ثم ركب هذه المعينات مع فصلاتها وواصل بين اطرافها بخط ا د د فيكون المنحني المطلوب. ولا ريب ان الخط يكون اقرب الى المطلوب كلما زاد عدد المعينات والفصلات الماخوذة

٢٨٥ اذا وُهمت حركة نقطة حتى تمر باطراف جميع المعينات المفروضة في معادلة يسمى المنحني الحادث طريق النقطة اي الطريق التي تتحرك فيها والتي توجد فيها ابداً. ويسمى ايضاً طريق المعادلة التي منها تؤخذ مواضع النقطة في حركتها. مثالة ان الشئ يسمى طريق نقط د د او طريق المعادلة ت ك = ي و قوس الدائرة هو طريق المعادلة ك = $\frac{1}{2} \sqrt{r_2^2 - y^2}$ فاذا معرفة طريق معادلة انما هي معرفة المنحني او المستقيم التي هي له

ع ٥ لنا ان نجد طريق المعادلة ك = $\frac{y}{t}$ او ت ك = ي التي فيها تفرص ك

وي معينات وفصلات مختلفة وت كمية ثابتة معينة فان اخذ المعين ك على اطوال مختلفة فلا بد للفصلة ي ان تتغير بالنسبة الى ك حتى تبقى المعادلة ت ك = ي او بجل المعادلة الى نسبة ي : ك :: ت : ا اي لا تتغير نسبة ي : ك لان ت كمية معينة اي تكون نسبة فصلة الى معينها كنسبة فصلة اخرى الى معينها مهما كان. فلنفرض

فصلتين ا ب ا ب (رسم رقم ٢٧٥) وب د وب د معينهما اذا ا ب : ب د :: ا ب : ب د فيكون خط ا د مستقيماً (اقليدس ق ٢٢ ك ٦) وهو طريق المعادلة

ثم ان كانت المعادلة المفروضة ك = $\frac{y}{t} + b$ ب فزيادة ب لا تنسب تغييراً في الطريق. لان ب انما يزيد طول الفصلات فقط. و عوض ان نفاس من آ نفاس من نقطة اخرى مثل م في رسم رقم ٢٧٨ وتبقى نسبة ا ب او ا ب الى ب د او ب د كما كانت فيكون المنحني مستقيماً

٢٨٦ يبرهن مما سبق ان كل معادلة تكون ك و ي اي الفصلات والمعينات في اجزاء مختلفة منها. وليس لها الا القوة الاولى تكون طريقها خطاً مستقيماً لان كل

معادلة من هذا النوع يمكنها ان تتحول الى ك = $\frac{y}{t} + b$ كما يتضح من هذه العملية

ع ٦ لنا ان نجد طريقة المعادلة

$$س ك - د + ح - ك = م + ن$$

بالمقابلة س ك + ح = م + ن

$$\frac{س ك + ح}{س + ح} = \frac{م + ن}{س + ح}$$

فيمكن هنا ان يدل على الكميات الثابتة بالتعويض عنها بحرف واحد. فلنفرض

$$س + ح = ت \text{ و } \frac{س ك + ح}{س + ح} = ب \text{ فتصير المعادلة } ك = \frac{ت ب}{ت} + ب$$

التي طريقها خط مستقيم كما تقدم

٢٨٧ ثم انه متى كانت المعينات مناسبة لمربعات الفصالات او كعوبها او للقوة الرابعة منها وهلم جرا يكون طريق المعادلة خطأ منجماً لان نسبة المعينات الموضوعة على خط مستقيم تكون نسبة بعضها الى بعض ذات النسبة الكائنة بين فصالاتها. ولكن لا تكون نسبة كميات بعضها الى بعض كنسبة مربعاتها او كعوبها او قوائمها الرابعة والخامسة وهلم جرا كما علم من باب النسبة. مثالة ان فرض ك^٢ = س ي فتريد المعينات اكثر من الفصالات فان اخذت الفصالات ١ و ٢ و ٣ و ٤ الخ تكون المعينات مساوية لمربعاتها اي ١ و ٤ و ٩ و ١٦ الخ

٢٨٨ ان عدة المعادلات التي يمكن ان تتركب من قوات المعينات والفصالات المختلفة هي غير متناهية. وكل معادلة لها طريق مختصة بها. اذا تكون اشكال المنحنيات غير متناهية ولكن يمكن ان تنحصر في انواع. وقد جرت العادة عند المولدين ان يرتبوا في انواع حسب درجات معادلاتها فيدل على انواع المخطوط بالدليل الاعظم او بمجموع دلائل المعينات والفصالات في جزء من المعادلة. مثالة ت ك = س ي تختص بخط من النوع الاول لان الدليل في كل معين وفصلة انما هو واحد وليس في هذا النوع مخن كما راينا سابقاً

والمعادلة س ك - ت ك = س ي مختصة بالنوع الثاني من المخطوط والنوع الاول من المنحنيات لان الدليل الاعظم هو ٢ وت ي + ك ي = ب ك تختص بالنوع الثاني ايضاً. لانه وان لم يكن فيها دليل اكبر من واحد لكن مجموع دلائل ك و ي في الجزء الثاني اي ١ + ١ = ٢ و ي^٢ - ٣ ت ك ي = ب ك مختصة

بالنوع الثالث من الخطوط والثاني من المنحنيات لان دليل \bar{C} الاعظم هو ٢
 ٢٨٩ في منحنيات من الانواع العالية قد يمكن ان تكون لمعين فصلاً ما
 قيمات مختلفة فيلتي المعين بالمنحني في نقط متعددة لان طول المعين متوقف على
 معادلة المنحني. وان كانت المعادلة فوق الدرجة الاولى يكون لها قيمتان فاكثر كما راينا
 سابقاً فتكون للمعين قيمات مختلفة

ان معادلة من الدرجة الاولى لها قيمة واحدة فقط وخطها يقطع المعين في نقطة
 واحدة فقط. مثاله معادلة خط $\bar{A}\bar{C}$ (رسم رقم ٢٧٥) هي $k = C$ فيرى ان C لها
 قيمة واحدة فقط وك لا تتغير. فان اخذ الفصلة $k = ab$ يكون المعين $C = b = d$
 الذي يمكنه ان يلاقى $\bar{A}\bar{C}$ في \bar{D} فقط

ولكن معادلة الشلجي $C^2 = k$ لها قيمتان كما نرى من تجذير الجانبيين اي $C = \pm \sqrt{k}$
 احدها ايجابية والاخرى سلبية وذلك دليل على امكان اخراج المعين
 الى جهتيه من طرف الفصلة فيمكنه ان يلاقى جزءاً آخر من المنحني. مثاله معين
 الفصلة $\bar{A}\bar{B}$ (رسم ١٨٥) الشلجي قد يمكنه ان يكون \bar{B} فوق الفصلة او \bar{B} تحتها

قد راينا سابقاً ان معادلة مكعبة لها ثلاثة جذور اي ثلاث قيمات
 فتكون لمعين منحني من نوعها ثلاث قيمات فيمكنه ان يلاقى المنحني في
 ثلاث نقط. مثاله معين الفصلة $\bar{A}\bar{B}$ قد يمكن ان يكون \bar{B} د او
 \bar{B} د او \bar{B} د

٢٩٠ اذا التقى المنحني بالمحور الذي تقاس عليه الفصالات نقل المعينات
 شيئاً فشيئاً الى ان تتلاشى كما تقدم. وقد يمكن ان يتقرب منحني الى خط ابدأ بدون

ان يلاقيه. فلنفرض على خط $\bar{A}\bar{F}$ ابعاداً متساوية
 ab و $b'b'$ و $b''b''$ و $b'''b'''$ ولنفرض شكل
 المنحني $d'd'd'd'$ على كيفية حتى يكون كل معين
 عند نقط $b'b'b'b'$ الخ نصف الذي عن
 يساره اي $b'd'$ نصف $b'd'$ و $b''d''$ نصف $b'd'$ الخ

فالامر واضح انه مما اخرج المنحني على هذه الكيفية لا يلاقى $\bar{A}\bar{F}$ بل يبقى متقرباً اليه
 ابدأ. وكل خط على هذه الكيفية اي الذي يتقرب ابدأ الى منحني بدون ان يلتقي به

يسمى متقاربة فالمحور اف هو متقارب المنحني د د' فكما زادت الفصلة قل المعين .
 ومتى حسبت الفصلة غير متناهية حسبما ذكر في فصل الغير المتناهيات بصير المعين
 شبيهاً بالغير المتناهي فيدل عليه بصفر والامتداد في هذا الباب من خصائص حساب
 قطع المخروط هذا ما اقتضى وضعه في علم الجبر والمقابلة
 والمحمد لله الذي لا يحاط به علماً
 انتهى

وكان الفراغ من تبييضه في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٨٥٣ مسيحية

طبع في بيروت سنة ١٨٥٣ مسيحية

893.7195

V28

JAN 20 1937



CU58981063

V28

Kitab al-rawdah al-z